

## **Prospect: informații pentru pacient**

### **GYNACOHEEL, picături orale, soluție** *Medicament homeopat*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă peste 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Gynacoheel și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Gynacoheel
3. Cum să utilizați Gynacoheel
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Gynacoheel
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. CE ESTE GYNACOHEEL ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Gynacoheel este un medicament homeopat, care se utilizează în tratamentul complex al bolilor inflamatorii ale organelor genitale feminine: adnexită (inflamația trompelor uterine), ooforită (inflamație a ovarelor), endometrită (inflamație a mucoasei uterine), parametrită (inflamația țesuturilor din jurul uterului), colpită (inflamație a colului uterin) și tulburări ale ciclului menstrual, inclusiv la fetițele tinere.

#### **2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI GYNACOHEEL**

##### **Nu utilizați Gynacoheel:**

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament, menționate la pct. 6.1.

##### **Atenționări și precauții**

Dacă suferiți de dureri abdominale severe sau de intensitate moderată, este necesar de a consulta în prealabil medicul.

Dacă simptomele persistă sau se înrăutățesc, este necesar de a consulta medicul.

##### **Copii**

Consultați medicul sau farmacistul înainte de a administra acest produs copiilor.

##### **Gynacoheel împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu sunt cunoscute interacțiuni cu alte medicamente. Acestea sunt puțin probabile, din cauza concentrațiilor foarte mici a medicamentului.

### **Gynacoheel împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Ca și orice medicament homeopat, Gynacoheel nu trebuie administrat în timpul meselor.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deoarece concentrația substanțelor în acest medicament este foarte mică, acest medicament nu este cunoscut de a fi toxic în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Gynacoheel nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Gynacoheel conține alcool**

Acest medicament conține etanol (alcool etilic), până la 150,2 mg per doză (10 picături), echivalentul a 3 ml de bere, 1,27 ml de vin sau 49,73 ml de suc de mere. Este necesară prudență la administrarea preparatului femeilor însărcinate sau care alăptează, copiilor, persoanelor care suferă de alcoolism și pacienților cu boli ale ficatului sau epilepsie.

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI GYNACOHEEL**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medical sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată reprezintă:

#### Doza standard:

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: 10 picături de 3 ori pe zi.

Copii cu vârsta sub 12 ani: Nu există informații relevante privitor la utilizarea Gynacoheel la copiii sub 12 ani.

#### Doza în caz de debut acut al maladiei sau doza inițială:

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: câte 10 picături la fiecare 0,5 – 1 ore, până la 12 ori pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Copii cu vârsta sub 12 ani: Nu există informații relevante privitor la utilizarea Gynacoheel la copiii sub 12 ani.

Durata curei de tratament alcătuiește 3 – 5 săptămâni.

#### Mod de administrare

Preparatul trebuie administrat cu 15-20 minute înainte de luarea mesei sau cu oră după aceasta.

Preparatul trebuie menținut câteva minute în gură, fiind dizolvat prealabil într-o cantitate de apă, sau administrat sub limbă (sublingual) sub formă nedizolvată.

Pentru a fi administrat copiilor, preparatul poate fi diluat într-o mică cantitate de apă.

În funcțiile de derularea maladiei și starea pacientului, medicul poate modifica modul de administrare și durata curei de tratament.

### **Dacă utilizați mai mult Gynacoheel decât trebuie**

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

### **Dacă uitați să utilizați Gynacoheel**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Gynacoheel**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Gynacoheel

- reacții alergice

Frecvența acestor reacții adverse nu poate fi estimată din informațiile cunoscute.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amed.md](http://www.amed.md) sau e-mail: [farmacovigelenta@amed.md](mailto:farmacovigelenta@amed.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. CUM SE PĂSTREAZĂ GYNACOHEEL**

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

### **Ce conține Gynacoheel**

100 ml soluție conține:

#### *Substanțe active:*

Ammonium bromatum	D 4	10 g
Apis mellifica	D 4	10 g
Aurum jodatam	D 12	10 g
Crabro vespa	D 4	10 g
Helonias dioica	D 4	10 g
Lilium tigrinum	D 4	10 g
Melilotus officinalis	D 3	5 g
Naja naja	D 12	10 g
Palladium metallicum	D 12	10 g

Platinum metallicum	D 12	10 g
Viburnum opulus	D 2	5 g

*celelalte componente sunt:* etanol, apă purificată.

**Cum arată Gynacoheel și conținutul ambalajului**

Gynacoheel se prezintă sub formă de picături orale, soluție transparentă, de culoare de la incolor la slab gălbui, cu miros caracteristic de etanol.

**Conținutul ambalajului**

Câte 30 ml de soluție în flacon-picurător. Câte 1 flacon, împreună cu prospectul pentru pacient în cutie de carton.

**Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon: 0049 7221 501 00

Fax: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.com

**Acest prospect a fost revizuit în August 2019**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>