

Pepsane, gel oral
Dimeticonă, guaiazulen

Compoziție

Un plic cu gel oral conține dimeticonă 3 g și guaiazulen 0,004 g și excipienți: sorbitol, caraghenati, ciclamat de sodiu, parahidroxibenzoat de metil (E 218), ulei volatil de mentă, apă purificată.

Grupa farmacoterapeutică

Antiacide și antiflatulente, combinații, cod ATC: A02AFN1.

Indicații terapeutice

Acest medicament este indicat în tratamentul durerilor de stomac.

Contraindicații

Hipersensibilitate la dimeticonă și guaiazulen sau la oricare dintre excipienții produsului.

Precauții

Pe perioada tratamentului, trebuie evitate stresul, consumul de tutun și băuturi alcoolice, alimentele prea picante și anumite medicamente (aspirina, antiinflamatoarele) care pot produce arsuri la stomac sau hiperaciditate.

Pepsane conține sorbitol. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Pepsane conține parahidroxibenzoat de metil. Acesta poate provoca reacții alergice (chiar întârziate). Dacă aveți nelămuriri, trebuie să consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Interacțiuni

Pentru a preveni orice interacțiune cu alte medicamente, medicul dumneavoastră sau farmacistul trebuie informat despre toate celelalte tratamente în curs.

Atenționări speciale*Sarcina și alăptarea*

Dimeticonă poate fi administrată în timpul sarcinii și alăptării.

Nu există date clinice asupra guaiazulenei la femeile gravide. Totuși, până în prezent, nu au fost raportate malformații cauzate de acest produs.

În consecință, acest medicament poate fi administrat pe perioada sarcinii și a alăptării.

Se recomandă ca pe perioada sarcinii și alăptării să fie solicitat sfatul medicului sau al farmacistului înainte de administrarea oricărui medicament.

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Pepsane nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze și mod de administrare

Se administrează pe cale orală.

Se înghite direct conținutul a 1-2 plicuri, de 2-3 ori pe zi, înaintea meselor sau când apare durerea.

Acest medicament v-a fost prescris personal, pentru o anumită indicație. El nu poate fi folosit într-o altă situație și nu trebuie recomandat unei terțe persoane.

Reacții adverse

Ca orice produs activ, acest medicament poate produce mai multe sau mai puține efecte secundare nedorite la unele persoane.
Informați medicul dumneavoastră sau farmacistul despre apariția oricăror efecte nedorite nemenționate în acest prospect.

Supradozaj

Nu a fost raportat niciun caz de supradozaj.

Păstrare

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după **EXP.**). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A se feri de surse de căldură.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere.

Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

Ambalaj

Cutie cu 30 plicuri din hârtie/PEJD/Al/PEJD a câte 10 g gel oral

Producător

Laboratories Rosa-PhytoPharma

2 Avenue du Traite de Rome, F-78401, Chatou, Franța

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Laboratoires Rosa-PhytoPharma

68 rue Jean-Jacques Rousseau, F-75001 Paris, Franța

Data ultimei verificări a prospectului

Decembrie 2006