

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Furasol 100 mg pulbere pentru soluție cutanată/gargarisme

Furazidinum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Furasol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Furasol
3. Cum să utilizați Furasol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Furasol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Furasol și pentru ce se utilizează

Furasol conține ca substanță activă furagina (furazidina) solubilă – un medicament antibacterian (derivat de nitrofuran).

Furasol se utilizează pentru prepararea soluției cutanate/gargarisme în tratamentul afecțiunilor inflamatoare ale cavității bucale și faringelui, plăgilor infectate, arsurilor și afecțiunilor purulente.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Furasol

Nu utilizați Furasol:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la furagină (furazidină) solubilă, la alți derivați de nitrofuran (de asemenea în anamneză) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă suferiți de dermatită alergică (boală cutanată, care apare la contactul nemijlocit cu pielea a substanțelor, capabile să provoace o reacție alergică).

A nu se utiliza pentru gargarisme ale cavității bucale și faringelui la copii cu vârsta sub 4 ani (copilul încă nu poate clăti gura și gâtul).

Atenționări și precauții speciale de utilizare

Înainte să utilizați Furasol adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Soluția de Furasol colorează pielea în galben.

Furasol împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau intenționați să luați alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Furasol intensifică acțiunea antibioticelor (medicamente, utilizate în tratamentul infecțiilor).

Furasol împreună cu alcool

Riscul apariției reacțiilor alergice cutanate în perioada tratamentului crește în cazul consumului băuturilor alcoolice (intern).

Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu se recomandată utilizarea Furasol în sarcină și perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Furasol nu influențează asupra capacității de conducere a vehiculelor și de folosire a utilajelor.

3. Cum să utilizați Furasol

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Administrare bucofaringiană și cutanată.

Soluția se prepară înainte de utilizare. Soluția preparată nu trebuie păstrată!

Afecțiuni inflamatorii ale cavității bucale și faringelui

Conținutul plicului se dizolvă într-un pahar (200 ml) de apă fierbinte. Soluția caldă se utilizează pentru gargarisme de 2-3 ori pe zi.

Plăgi infectate, arsuri și afecțiuni purulente

Conținutul plicului se dizolvă într-un pahar (200 ml) de apă fierbinte. Soluția se utilizează pentru prelucrarea plăgilor infectate, arsurilor și afecțiunilor purulente de 1-2 ori pe zi.

Dacă ați utilizat mai mult Furasol decât trebuie

Cazuri de supradozare nu sunt descrise.

Dacă ați uitat să utilizați Furasol

Continuați să utilizați medicamentul ca de obicei. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă ați încetat să luați Furasol

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca și toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 utilizator din 10 000):

- reacții alergice cutanate (vezi «Furasol împreună cu alcool»).

În acest caz opriți utilizarea medicamentului și consultați de urgență medicul dumneavoastră.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Puteți raporta, de asemenea, reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Furasol

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Furasol

- *Substanța activă* este furagina (furazidina) solubilă.

Fiecare plic conține furagină (furazidină) solubilă – 100 mg, echivalent cu 87,4 mg furagină.

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu.

Cum arată Furasol și conținutul ambalajului

Furasol se prezintă sub formă de pulbere de culoare oranj-cafenie.

Furasol este disponibil în cutii cu 5 sau 15 plicuri din folie de laminat.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SA Olpha,

str. Rupnicu 5, Olaine,

District Olaine, LV-2114, Letonia.

Fabricantul

SA Olpha,

str. Rupnicu 5, Olaine,

District Olaine, LV-2114, Letonia.

Acest prospect a fost revizuit în Octombrie 2025.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>