

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Maalox 35 mg/40 mg/ml suspensie orală *Hidroxid de aluminiu / Hidroxid de magneziu*

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 10 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Maalox și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Maalox
3. Cum să luați Maalox
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Maalox
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Maalox și pentru ce se utilizează

Maalox conține în calitate de substanțe active hidroxidul de aluminiu și hidroxid de magneziu. Acest medicament este un antiacid. El neutralizează excesul de aciditate din stomac.

Acest medicament este indicat la adulți și adolescenți peste 15 ani pentru durerile de stomac cu caracter de arsură și regurgitațiile acide.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Maalox

Nu luați Maalox:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la hidroxidul de aluminiu, hidroxidul de magneziu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă aveți o afecțiune gravă a rinichilor (insuficiență renală severă).

Dacă nu sunteți sigur, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Atenționări și precauții

Înainte să luați Maalox, adresați-vă medicului dumneavoastră:

- dacă tulburările manifestate se asociază cu scădere în greutate,
- dacă aveți dificultate la înghițire sau jenă abdominală persistentă,
- dacă aveți tulburări ale digestiei, nou instalate sau recent modificate,
- dacă aveți o afecțiune a rinichilor (insuficiență renală) sau efectuați ședințe de dializă, deoarece conține aluminiu și magneziu. Acumularea aluminiului și magneziului în sânge în cazul administrării de lungă durată și la doze mari poate determina afectarea gravă a creierului (encefalopatie).

Acest medicament poate provoca sau agrava constipația la pacienții cu risc, cum sunt pacienții cu insuficiență renală sau vârstnici.

Utilizarea acestui medicament timp îndelungat trebuie evitată la pacienții cu insuficiență renală.

În cazul utilizării prelungite sau dacă prezentați risc de deficit de fosfat (de exemplu alimentație cu conținut scăzut de fosfat), se recomandă să vă adresați unui medic.

Copii

Nu este cazul.

Maalox împreună cu alte medicamente

Maalox interacționează cu alte medicamente care sunt administrate pe cale orală.

Nu luați simultan Maalox cu un alt medicament.

Acest medicament conține antiacide (hidroxid de aluminiu și hidroxid de magneziu). Și alte medicamente pot să le conțină. Nu asociați astfel de medicamente, pentru a nu depăși doza maximă recomandată (vezi pct. 3 Cum să luați Maalox).

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv orice medicamente obținute fără prescripție medicală din lista următoare, deoarece unele medicamente pot fi influențate de Maalox sau pot influența eficacitatea Maalox.

În special:

- Medicamente utilizate pentru tratarea:
 - inimii, cum ar fi digitalele, chinidina, metoprolol, atenolol și propranolol;
 - anemiei, cum ar fi sărurile de fier;
 - ulcerului și acidității gastrice așa ca ranitidina sau cimetidina (antagoniștii H₂receptorilor);
 - malariei, așa ca cloroquina;
 - bolilor de oase, cum ar fi bifosfonații;
 - anumitor reacții anormale alergice, inflamatorii sau imune, cum ar fi glucocorticoizii sau fexofenadina;
 - tulburărilor renale, cum ar fi citrații.
 - tuberculozei, cum ar fi etambutolul sau izoniazida;
 - infecțiilor, așa ca fluorochinolonele, lincosamida, ketoconazolul, ciclilinele, cefalosporinele (cefpodoxim), dolutegravirul, elvitegravirul, raltegravirul și combinațiile de tratamente antivirale tenofovir alafenamidă/emtricitabina/bictegravir, rilpivirina.
 - bolilor mintale (psihozelor), cum ar fi neurolepticele fenotiazidice sau sulpirida;
 - concentrațiilor crescute de potasiu, cum ar fi polistirenul sulfonat;
 - durerii sau febrei, cum ar fi indometacina sau acidul acetilsalicilic (aspirina);
 - insuficienței glandei tiroide, așa ca levotiroxina;
 - durerilor articulare și reacțiilor chimice anormale, cum ar fi penicilamina;
 - cancerului, cum ar fi nilotinibilul sau dasatinibilul monohidrat;
 - tulburărilor de sânge, cum ar fi eltrombopag olamina;
 - tensiunii arteriale crescute în plămâni (hipertensiune pulmonară), cum ar fi riociguatul;
 - fibromului uterin sau contracepție de urgență, cum ar fi ulipristalul.
- Medicamente utilizate în tratamentul dentar, așa ca fluorul.
- Medicamentele utilizate pentru reducerea colesterolului precum rosuvastatina.

Ca măsură de precauție, respectați un interval de cel puțin 2 ore între administrarea oricărui medicament pe cale orală și antiacidele (4 ore pentru fluorochinolone).

Maalox împreună cu alimente, băuturi și alcool

Nu este cazul.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu se recomandă administrarea acestui medicament în cursul sarcinii, decât dacă este absolut necesar, la indicația medicului.

Alăptarea este posibilă în timpul tratamentului cu acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Maalox nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Maalox conține sorbitol (E420).

Acest medicament conține 0,15 g sorbitol (E420) în 15 ml (o lingură de masă) suspensie orală.

Sorbitolul este o sursă de fructoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că dumneavoastră (sau copilul dumneavoastră) aveți intoleranță la unele categorii de glucide sau dacă ați fost diagnosticat cu intoleranță ereditară la fructoză, o boală genetică rară caracterizată prin incapacitatea de a descompune fructoza, discutați cu medicul dumneavoastră înainte ca dumneavoastră (sau copilul dumneavoastră) să vi se administreze sau să utilizați acest medicament.

3. Cum să luați Maalox

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Se administrează pe cale orală.

Maalox este recomandat adulților și adolescenților cu vârsta peste 15 ani.

Doze

Doza uzuală este de 1 lingură Maalox în momentul apariției arsurilor la stomac sau refluxului acid, fără a depăși 6 linguri pe zi.

Durata tratamentului

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 10 zile.

Dacă simptomele se agravează sau persistă după 10 zile de tratament, nu creșteți doza, dar adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă luați mai mult Maalox decât trebuie

Adresați-vă imediat unui medic sau farmacist.

Dacă rinichii dumneavoastră funcționează normal, supradozajul cu magneziu administrat pe cale orală nu va provoca, în general, reacții toxice.

Dacă însă funcția rinichilor este afectată, se poate instala intoxicație cu magneziu.

Dacă uitați să utilizați Maalox

Nu se aplică.

Dacă încetați să utilizați Maalox

Nu se aplică.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse pot apărea cu frecvențele definite mai jos:

Foarte rare (pot apărea până la 1 din 10.000 persoane):

- hiperмагниезиemia. A fost observată după administrarea prelungită la pacienții cu

insuficiență renală.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

- diaree sau constipație,
- dureri abdominale,
- scăderea cantității de fosfor din sânge, în caz de administrare de lungă durată sau în doze mari,
- creșterea valorilor aluminiului din sânge,
- reacții alergice:
 - erupție pe piele, însoțită de umflături și/sau roșeață,
 - urticarie,
 - umflarea bruscă a feței și gâtului, însoțită de dificultăți la respirație (edemul Quincke),
 - stare generală de rău, survenită brusc, cu scăderea tensiunii arteriale (șoc anafilactic).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Maalox

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

După prima deschidere a flaconului, medicamentul nu trebuie păstrat mai mult de 6 luni.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Maalox

- *Substanțele active sunt:* hidroxidul de magneziu și hidroxidul de aluminiu.
100 ml suspensie orală conțin 3,5 g hidroxid de aluminiu și 4 g hidroxid de magneziu.
1 lingură de masă (15 ml) conține 525 mg hidroxid de aluminiu și 600 mg hidroxid de magneziu.
- *Celelalte componente sunt:* acid clorhidric (10%), acid citric monohidrat, ulei esențial de mentă, manitol, bromură de domifen, zaharină sodică, sorbitol lichid (necristalizabil) (E420), peroxid de hidrogen, apă purificată.

Cum arată Maalox și conținutul ambalajului

Maalox se prezintă sub formă de suspensie de culoare albă, omogenă la agitare.

Maalox este disponibil în cutie cu 1 flacon din tereftalat de polietilenă, conținând 250 ml suspensie orală.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricanții

Deținătorul certificatului de înregistrare

Opella Healthcare France SAS,
157 avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly sur Seine, Franța

Fabricanții

Opella Healthcare Italy S.r.l
Viale Europa 11, 21040 Origgio (VA), Italia

A.Nattermann & Cie. GmbH,
Nattermannalle 1,
50829 Köln, Germania

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2024.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>