

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

BIOVERDE FORTE 3,0 mg/ml spray bucofaringian, soluție *Clorhidrat de benzidamină*

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este BIOVERDE FORTE și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați BIOVERDE FORTE
3. Cum să utilizați BIOVERDE FORTE
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează BIOVERDE FORTE
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este BIOVERDE FORTE și pentru ce se utilizează

BIOVERDE FORTE este un medicament antiinflamator nesteroidian cu proprietăți analgezice, iar când este administrat local are de asemenea și acțiune antiinflamatoare și anestezică.

BIOVERDE FORTE conține ca substanță activă benzidamina, care inhibă inflamația și reduce durerea prin absorbție și acumulare locală în țesuturile inflamate.

BIOVERDE FORTE este utilizat local în afecțiunile inflamatorii ale mucoasei gurii și gâtului datorate unor infecții (de exemplu faringite și stomatite) precum și celor datorate tratamentului sau extracțiilor dentare.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați BIOVERDE FORTE

Nu utilizați BIOVERDE FORTE

- dacă sunteți alergic la clorhidratul de benzidamină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6);
- dacă sunteți alergic la acid acetilsalicilic și/sau alte antiinflamatoare nesteroidiene;
- dacă aveți sau ați avut vreodată astm bronșic sau afecțiuni alergice, întrucât este posibil să aveți un risc crescut de apariție a bronhospasmului sau alergiei;
- la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

Atenționări și precauții

Utilizarea îndelungată poate produce fenomene de sensibilizare. În acest caz, trebuie să întrerupeți tratamentul cu BIOVERDE FORTE și să vă adresați medicului.

BIOVERDE FORTE împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu au fost semnalate interacțiuni cu alte medicamente utilizate concomitent pentru aceleași indicații.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza acest medicament.

Nu trebuie să utilizați BIOVERDE FORTE în timpul sarcinii, decât dacă este absolut necesar și la recomandarea medicului dumneavoastră. Dacă tratamentul este necesar, trebuie utilizată cea mai mică doză posibilă pentru cea mai scurtă perioadă de timp.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Preparatul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

BIOVERDE FORTE conține parahidroxibenzoat

Parahidroxibenzoat de metil, care provoacă reacții alergice (chiar întârziate) și în mod excepțional, bronhospasm. Preparatul conține o cantitate mică de etanol 17,0 mg/doză, făcând posibilă detectarea acestuia în aerul expirat din plămâni prin gură.

3. Cum să utilizați BIOVERDE FORTE

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Mod de administrare: bucofaringian.

Doza recomandată la adulți și vârstnici este de 2 - 4 doze, administrate de 2-6 ori pe zi.

Nu depășiți doza recomandată.

Dacă simptomele de inflamație persistă sau se înrăutățesc după 7 zile, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă utilizați mai mult BIOVERDE FORTE decât trebuie

În cazul înghițirii accidentale a unor cantități mari din BIOVERDE FORTE pot să apară următoarele simptome gastro-intestinale: greață, vărsături, dureri abdominale și iritație esofagiană și următoarele simptome la nivelul sistemului nervos central: amețeli, halucinații, agitație, anxietate și iritabilitate.

Dacă apar astfel de simptome, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă înghițiți prea mult sau înghițiți accidental cantități mari din medicament, adresați-vă imediat medicului sau farmacistului pentru recomandări.

Dacă uitați să utilizați BIOVERDE FORTE

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați BIOVERDE FORTE

Întreruperea tratamentului înaintea duratei recomandate poate duce la neatingerea efectului dorit.

Nu întrerupeți tratamentul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de întreruperea tratamentului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Foarte rare (care pot afecta mai puțin de 1 din 10000 pacienți):

- laringospasm sau bronhospasm (dificultăți de respirație);
- prurit;
- urticarie;
- reacție de fotosensibilitate;
- erupții cutanate.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- senzație de arsură la nivelul gurii sau uscăciunea gurii;
- șoc anafilactic (reacție alergică gravă);
- reacții de hipersensibilitate;
- angioedem (umflarea bruscă a gurii/gâtului și mucoaselor).

Imediat după utilizare poate apărea în gură sau gât o senzație de amorțire. Acest efect apare datorită mecanismului de acțiune al medicamentului și dispare în scurt timp.

Dacă apare vreuna dintre aceste reacții adverse, tratamentul trebuie întrerupt și trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <https://amd.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amd.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează BIOVERDE FORTE

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

Nu utilizați BIOVERDE FORTE după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu administrați BIOVERDE FORTE mai mult de 6 luni după prima utilizare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține BIOVERDE FORTE

- Substanța activă: clorhidrat de benzydamină. 1 ml soluție conține clorhidrat de benzydamină 3,0 mg.
- Celelalte componente sunt: glicerol, etanol 96%, zaharină, hidrogenocarbonat de sodiu, metilparahidroxibenzoat, ulei de mentă, polisorbit 20, apă purificată.

Cum arată BIOVERDE FORTE și conținutul ambalajului

Medicamentul se prezintă sub formă de lichid transparent, incolor, cu miros caracteristic de mentă. BIOVERDE FORTE este disponibil în 30 ml în flacoane din sticlă etanșate ermetic prin intermediul unui ajustaj cu valvă de pulverizare și căpăcel transparent. Câte 1 flacon împreună cu prospectul pentru pacient în cutii de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**Deținătorul certificatului de înregistrare**

SC „Flumed-Farm” SRL, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 176
tel. (+373 22) 52 14 52
e-mail: flumed-farm@hushmail.com

Fabricantul

SC „Flumed-Farm” SRL, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 176

Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2025

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>