

## Prospect: Informații pentru consumator/pacient

### Torasemida STADA 5 mg comprimate

*Torasemidă*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Torasemida STADA 5 mg comprimate și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Torasemida STADA 5 mg comprimate
3. Cum să utilizați Torasemida STADA 5 mg comprimate
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Torasemida STADA 5 mg comprimate
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Torasemida STADA 5 mg comprimate și pentru ce se utilizează**

Torasemida STADA este un medicament diuretic (crește eliminarea urinei) care aparține unui grup de medicamente numite „Diuretice cu efect puternic: sulfonamide, monocomponente”.

Torasemida STADA este utilizat pentru tratamentul:

- edemelor (retenție de lichide) cauzate de insuficiența cardiacă congestivă, boli renale sau hepatice,
- hipertensiunii arteriale.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să luați Torasemida STADA 5 mg comprimate**

##### **Nu luați Torasemida STADA:**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la torasemidă sau la oricare dintre celelalte componente Torasemida STADA, enumerate la pct. 6;
- dacă sunteți alergic la sulfoniluree;
- dacă aveți anurie (nu produceți deloc urină).

##### **Atenționări și precauții**

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua Torasemida STADA:

- dacă aveți o boală hepatică severă, deoarece utilizarea torasemidei poate duce la comă hepatică;
- dacă aveți niveluri scăzute de sodiu sau potasiu în sânge sau un volum scăzut de sânge;
- dacă aveți probleme cu inima, în special dacă sunteți tratat cu glicozide digitale, deoarece acestea cresc riscul de tulburări de ritm cardiac;
- dacă aveți gută sau diabet zaharat;
- dacă aveți insuficiență renală sau probleme la urinare;

- dacă aveți tensiune arterială mică (hipotensiune arterială).

### **Torasemida STADA împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripție medicală.

De asemenea, trebuie să informați medicul dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele medicamente cu care torasemida poate interacționa:

- glicozide cardiace cum ar fi digoxina (medicamente pentru inimă), medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale mari (mai ales inhibitori ai ECA), teofilină (medicament pentru tratamentul astmului bronșic): efectul acestor medicamente poate fi crescut;
- mineralocorticoizi, glucocorticoizi sau laxative: excreția de potasiu produsă de aceste medicamente poate fi crescută;
- antibiotice din grupul aminoglicozidelor: pot crește riscul de toxicitate renală sau a auzului;
- cisplatină (medicament împotriva cancerului), litiu (medicament antidepresiv), salicilați, acid etacrinic: poate crește toxicitatea acestora;
- medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (de exemplu, ibuprofen, indometacină), probenecid (medicament pentru tratamentul gutei), colestiramină (medicament pentru scăderea nivelului colesterolului din sânge): pot reduce eficacitatea torasemidei;
- medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat: efectul lor poate fi diminuat.

### **Torasemida STADA cu alimente și băuturi**

Torasemida STADA poate fi administrat cu sau fără alimente.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului înainte de a lua acest medicament.

Torasemida nu este recomandată în timpul sarcinii.

Nu se cunoaște dacă torasemida trece în laptele matern, astfel nu se recomandă utilizarea în timpul alăptării.

### *Copii și adolescenți*

Torasemida STADA nu se recomandă la copii și adolescenți, deoarece siguranța și eficacitatea nu au fost stabilite în această grupă de vârstă.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Torasemida STADA poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, în special la începutul tratamentului sau dacă este luat concomitent cu alcool.

### **Torasemida STADA conține lactoză**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

### **Torasemida STADA conține sodiu**

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 23 mg (1 mmol) per comprimat, adică practic „nu conține sodiu”.

### **3. Cum să luați Torasemida STADA 5 mg comprimate**

Luțați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

#### **Doza**

*Adulți (inclusiv vârstnici):*

Tratamentul edemelor asociate insuficienței cardiace congestive, afecțiunilor renale sau hepatice

Doza inițială variază de la 5 mg până la 20 mg o dată pe zi, dar medicul dumneavoastră poate crește doza, dacă este necesar, până la aproximativ dublul acesteia.

#### Hipertensiune arterială

Doza inițială uzuală este de 2,5 mg până la 5 mg o dată pe zi, dar medicul dumneavoastră poate crește doza până la 10 mg pe zi sau poate adăuga un medicament antihipertensiv suplimentar.

#### **Mod de administrare**

Torasemida STADA se administrează oral.

Înghițiți comprimatele fără a le mesteca, cu o cantitate suficientă de lichid, preferabil dimineața. Comprimatele pot fi administrate cu sau fără alimente.

#### **Dacă luați mai mult Torasemida STADA decât trebuie**

Dacă ați luat o doză mai mare de Torasemida STADA decât cea recomandată, este posibil să urinați excesiv și să aveți simptome precum: somnolență, confuzie, slăbiciune generală și amețeli.

În caz de supradozaj sau ingerare accidentală, consultați imediat medicul sau farmacistul.

#### **Dacă uitați să luați Torasemida STADA**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Luțați doza uitată imediat ce vă amintiți și a doua zi continuați administrarea conform programului obișnuit.

#### **Dacă încetați să luați Torasemida STADA**

Medicul dumneavoastră vă va spune cât timp va dura tratamentul cu Torasemida STADA. Nu încetați să luați acest medicament fără să discutați mai întâi cu medicul dumneavoastră, deoarece stoparea bruscă a tratamentului poate duce la agravarea afecțiunii dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, Torasemida STADA poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Au fost raportate următoarele reacții adverse:

- În cazul tratamentului de durată pot apărea tulburări ale echilibrului hidro-salin.
- Ocazional, în special la începutul tratamentului, pot apărea dureri de cap, amețeli, oboseală, slăbiciune generală, crampe musculare și tulburări gastrointestinale (de exemplu, pierderea poftei de mâncare, dureri abdominale, greață, vărsături, diaree sau constipație).

- În cazuri rare, pot apărea uscăciunea gurii, senzații neplăcute la nivelul extremităților, în cazuri individuale pot apărea tulburări de vedere și reacții alergice (de exemplu, mâncărime, roșeață, sensibilitate la lumină).
- La pacienții cu dificultăți la urinare (de exemplu, din cauza hipertrofiei de prostată), creșterea fluxului urinar poate duce la retenție urinară.
- Datorită creșterii producției de urină, pot apărea scăderea tensiunii arteriale, stări confuzionale, în mod excepțional tromboze, tulburări ale ritmului cardiac, angină pectorală, infarct miocardic acut, pierderea bruscă a cunoștinței (sincopă) și colaps circulator, în special în cazurile cu pierderi semnificative de lichide și săruri.
- Ocazional au fost observate creșteri ale nivelului de acid uric, zahăr, trigliceride și colesterol în sânge.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Torasemida STADA 5 mg comprimate**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține Torasemida STADA 5 mg comprimate**

- *Substanța activă este torasemida.*  
Fiecare comprimat conține torasemidă 5 mg.
- *Celelalte componente sunt:* lactoză monohidrat, amidon de porumb, carboximetilamidon de sodiu (tip A) (din cartofi), dioxid de siliciu coloidal anhidru și stearat de magneziu.

#### **Cum arată Torasemida STADA 5 mg comprimate și conținutul ambalajului**

Torasemida STADA 5 mg se prezintă sub formă de comprimate biconvexe, rotunde, de culoare albă sau aproape albă, cu o linie mediană pe una dintre fețe și marcate cu 915 pe cealaltă.

Torasemida STADA este disponibil în cutii cu 3 blistere din PVC-PVDC/Aluminiu a câte 10 comprimate.

**Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

**Deținătorul certificatului de înregistrare**

Laboratorio STADA, S.L.  
Frederic Mompou, 5  
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)  
Spania

**Fabricantul**

STADA ARZNEIMITTEL AG  
Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel  
D-61118 Germania

**Acest prospect a fost aprobat în iulie 2025.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>