

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/ PACIENT

Sinupret sirop

Comparație

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului Dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.

- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului Dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

- Dacă după 7-14 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Sinupret sirop și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Sinupret sirop
3. Cum să utilizați Sinupret sirop
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Sinupret sirop
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Sinupret sirop și pentru ce se utilizează

Sinupret sirop este un fitopreparat indicat în tratamentul inflamațiilor acute ale sinusurilor paranazale.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Sinupret sirop

Nu utilizați Sinupret sirop

Dacă sunteți hipersensibil (alergic) la substanțele active (Părți aeriene de Verbină, rădăcini de Gențiană, părți aeriene de Măcriș, flori de Soc, flori de Ciuboțica-Cucului) sau oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament excipienți (enumerare la pct. 6).

Atenționări și precauții:

La pacienții cu gastrită cunoscută și stomac sensibil acest medicament se administrează cu precauție. Se recomandă administrarea Sinupret sirop după mese și cu un pahar de apă.

Dacă simptomele persistă mai mult de 7 - 14 zile, se agravează sau se repetă periodic și / sau pacientul prezintă febră, sângerări nazale, durere severă, secreții nazale purulente, afectarea vederii sau amorțeală facială, este necesară consultația medicului, deoarece aceste simptome sunt considerate semne grave ale rinosinusitei, și necesită consultația medicului specialist și tratament de urgență.

Administrarea la copii

Nu se recomandă utilizarea de către copii mai mici de 2 ani.

Nu există date suficiente privind utilizarea Sinupret sirop la copii mai mici de 2 ani.

Sinupret sirop împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului Dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent oricare alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală. La moment nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Sarcină, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Administrarea Sinupret sirop în perioada de sarcină și alăptare este posibilă numai după evaluarea minuțioasă de către medic a raportului dintre beneficiul scontat pentru mamă și riscul potențial pentru făt.

Sinupret sirop conține alcool, se recomandă administrarea lui doar în cazul când nu este posibilă administrarea Sinupret drajeuri.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Preparatul, administrat în dozele recomandate, nu influențează capacitatea de conducere a autovehiculelor și de manevrare a utilajului.

Acest medicament conține 450 mg alcool (etanol) în 7,0 ml, care este echivalent cu 64 mg / ml (8% v / v). Cantitatea din 7,0 ml din acest medicament este echivalentă cu 11 ml bere sau 4 ml vin. Cantitatea mică de alcool din acest medicament nu va avea efecte vizibile.

Acest medicament conține maltitol lichid. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

7 ml Sinupret Sirop conțin 5,5 g de maltitol lichid, echivalent a aproximativ 0,35 unități glucidice de carbohidrați. Trebuie să luați aceasta în considerare dacă respectați un regim alimentar indicat în diabet. Valoarea calorică a maltitolului este de 2,3 kcal/g. Maltitolul poate avea un ușor efect laxativ.

3. Cum să utilizați Sinupret sirop

Întotdeauna administrați acest medicament cum este descris în acest prospect. Consultați medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur .

Dacă nu a fost prescris altfel, doza recomandată este:

<i>Vârsta</i>	<i>Doza unică</i>	<i>Doza zilnică</i>
Copii cu vârsta sub 2 ani	<i>Nu se aplică</i>	
Copii cu vârsta 2-5 ani	2.1 ml, echivalent a 2.5 g	6.3 ml echivalent a 7.5 g (3 ori, câte 2.1 ml)
Copii cu vârsta 6-11 ani	3.5 ml, echivalent a 4.2 g	10.5 ml echivalent a 12.6 g

		(3 ori, câte 3.5 ml)
Adulți și adolescenți de la 12 ani	7.0 ml, echivalent a 8.4 g	21.0 ml echivalent a 25.2 g (3 ori, câte 7.0 ml)

Nu sunt disponibile date suficiente privind dozajul recomandat în cazul unei insuficiențe renale / hepatice.

Mod de administrare

Sinupret sirop se administrează de 3 ori pe zi (dimineața, la prânz și seara), folosind măsura dozatoare, nediluat sau diluat cu puțină apă.

La necesitate poate fi administrat cu lichid (nu alcool) preferabil un pahar cu apă. Sinupret sirop poate fi administrat cu băuturi, alimente sau între mese.

Dacă prezentați sensibilitate a tractului gastro-intestinal, administrați Sinupret sirop după masă.

Agitați bine înainte de fiecare utilizare!

Durata de administrare

Dacă nu a fost prescris altfel, durata tratamentului este de 7-14 zile.

Dacă simptomele persistă după utilizarea preparatului, consultați un medic.

Dacă ați utilizat mai mult Sinupret sirop decât trebuie

Dacă ați luat Sinupret sirop în cantități mari, anunțați medicul. El va decide ce măsuri necesare trebuie întreprinse. Este posibil ca efectele adverse descrise mai jos să se intensifice.

Dacă ați uitat să utilizați Sinupret sirop

Dacă ați luat prea puțin sirop, sau ați uitat să îl administrați, nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuați să administrați preparatul așa cum a prescris medicul, sau cum e descris în acest prospect.

Dacă încetați să utilizați Sinupret sirop

Stoparea administrării preparatului Sinupret sirop de obicei este inofensivă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Sinupret sirop poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Efecte adverse sau semne, care trebuie observate și acțiunile care trebuie întreprinse:

Reacții adverse mai puțin frecvente

- tulburări gastro-intestinale (dureri de stomac, greață).
- reacții de hipersensibilitate (erupții pe piele, înroșirea pielii, mâncărime).

Reacții adverse cu frecvență necunoscută

- reacții alergice sistemice (umflarea buzelor, limbii, gâtului și/sau laringelui cu îngustarea căilor respiratorii (angioedem), umflarea feței, dificultăți la respirație).

La apariția primelor reacții adverse, administrarea preparatului Sinupret sirop trebuie sistată.

Dacă manifestați reacții adverse, nu mai administrați preparatul Sinupret sirop. Consultați un medic care va determina severitatea și va recomanda anumite acțiuni, dacă e necesar.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului Dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web -site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Sinupret sirop

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați Sinupret sirop după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

După prima deschidere, preparatul este valabil 6 luni.

În procesul păstrării este posibilă apariția unei opalescențe ușoare sau floclulare care nu influențează eficacitatea preparatului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Sinupret sirop

- Substanțele active sunt: extract din gențiană (rădăcină), verbină (iarbă), măcriș (iarbă), soc (floare), ciuboțica-cucului (floare cu caliciu).

Un ml sirop conține:

416,8 mg extract (proportia medicament/extract 1:38,5) din rădăcină de gențiană (*Gentianae radix*), tăiată; iarbă de verbină (*Verbenae herba*), tăiată; iarbă de măcriș (*Rumicis herba*), tăiată; flori de soc (*Sambuci flos*), măcinate; flori de ciuboțica-cucului cu caliciu (*Primulae flos cum calycibus*), tăiate; (1:3:3:3:3).

1. solvent de extracție: alcool etilic 59% (V/V);

2.- 4. solvent de extracție: apă purificată.

Acest medicament conține: alcool etilic 8% (V/V), adică 62,9 mg alcool pentru un ml sirop, și maltitol lichid 787,6 mg pentru un ml sirop.

- *Celelalte componente sunt:* maltitol lichid, aromă de cireșe, apă purificată.

Cum arată Sinupret sirop și conținutul ambalajului

Sinupret sirop este un lichid vâcos, transparent de culoare brun deschis, cu aromă de cireșe.

Sirop câte 100 ml în flacoane. Câte 1 flacon împreună cu măsura dozatoare și prospectul

pentru utilizare în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

BIONORICA SE Kerschensteinerstrasse 11-15 92318 Neumarkt
Germania

Telefon: +49 (0)9181 / 231-90

Telefax: +49 (0)9181 / 231-265 E-mail: info@bionorica.de

Fabricantul

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Germania

Acest prospect a fost revizuit în Mai 2022.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>