

**Prospect: Informații pentru utilizator****Strepsils Lemon fără zahăr pastile**  
Amilmetacrezol/alcool 2,4 diclorbenzolic

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Strepsils Lemon fără zahăr și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Strepsils Lemon fără zahăr
3. Cum să utilizați Strepsils Lemon fără zahăr
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Strepsils Lemon fără zahăr
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Strepsils Lemon fără zahăr și pentru ce se utilizează**

Strepsils Lemon fără zahăr aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.

Strepsils Lemon fără zahăr se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.

Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.

Efect antibacterian, antifungic și antiviral.

Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Strepsils Lemon fără zahăr****Nu utilizați Strepsils Lemon fără zahăr**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la amilmetacrezol și alcool 2,4-diclorbenzolic sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

**Atenționări și precauții**

Înainte să luați Strepsils Lemon fără zahăr pastile, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

**Strepsils Lemon fără zahăr împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu se cunosc interacțiunile cu alte medicamente.

### **Strepsils lemon fără zahăr împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Strepsils Lemon fără zahăr nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi, ci între mese.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Strepsils Lemon fără zahăr nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

**Strepsils Lemon fără zahăr conține maltitol lichid (E 965) și izomalt (E953).** Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. Poate avea efect ușor laxativ. Conținutul caloric este de 2,3 kcal/g. Acest medicament conține arome cu alcool benzilic, citral, citronelol, d-limonen, geraniol și linalool. Alcool benzilic, citral, citronelol, d-limonen, geraniol și linalool pot determina reacții alergice.

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conține sodiu”.

## **3. Cum să utilizați Strepsils Lemon fără zahăr**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### **Doze**

Reacțiile adverse pot fi minimizate prin utilizarea celei mai mici doze eficiente necesare pentru a controla simptomele, pentru cea mai scurtă durată posibilă.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile deoarece pot apărea dezechilibre ale florei microbiene de la nivelul cavității bucale cu risc de producere a unor infecții bacteriene sau fungice

### *Adulți*

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Lemon fără zahăr la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un interval de 24 de ore.

### *Populația pediatrică*

*Copii cu vârsta peste 6 ani:* doza recomandată este similară cu cea pentru adulți.

### *Copii cu vârsta sub 6 ani*

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

### *Vârstnici*

Nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de pacienți.

## **Mod de administrare**

Pentru administrare bucofaringiană.

Pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.

La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariției iritațiilor locale, trebuie să schimbați poziția pastilei în gură până la dizolvare.

Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils Lemon fără zahăr va fi administrat numai copiilor care pot păstra pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheați.

### **Dacă utilizați mai mult Strepsils Lemon fără zahăr decât trebuie**

Poate apărea disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul și se iau măsurile de tratament simptomatic pentru aceasta adresați-vă medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgențe.

### **Dacă uitați să utilizați Strepsils Lemon fără zahăr**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

**Dacă încetați să luați Strepsils Lemon fără zahăr**  
Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacții adverse au fost raportate:

Cu frecvență necunoscută ( nu poate fi estimată din datele disponibile)

- reacții de hipersensibilitate (se pot manifesta sub formă de erupții cutanate, angioedem, urticarie, bronhospasm și hipotensiune cu sincopă), greață, senzație de disconfort la nivelul gurii, diaree.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează Strepsils Lemon fără zahăr**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține Strepsils Lemon fără zahăr**

- Substanțele active sunt amilmetacrezol și alcool 2,4-diclorbenzilic.  
Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4 diclorbenzilic 1,2 mg.
- Celelalte componente sunt: acid tartric, aromă de lămâie (Flav P Lemon Flavour 74940-74Giv), zaharină sodică, izomalt (E 953), maltitol lichid (E 965).

##### **Cum arată Strepsils Lemon fără zahăr și conținutul ambalajului**

Strepsils Lemon fără zahăr se prezintă sub formă de pastile rotunde de culoare albă spre galben deschis, cu gust caracteristic de lămâie, având ștanțată pe ambele fețe sigla Strepsils „S”.

Ambalaj

Cutie cu 1 blister din PVC-PVdC/Al cu 8 pastile

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 8 pastile

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 12 pastile

**Cutie cu 3 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 12 pastile**

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

**Deținătorul Autorizației de punere pe piață și fabricantul**

**Deținătorul Autorizației de punere pe piață**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr.48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11,  
Sectorul 1, București, România

**Fabricantul**

RB NL Brands B.V.

Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Olanda

**Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2023**