

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Piracetam-Zdorovie 200 mg/ml soluție injectabilă

Piracetam

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Piracetam-Zdorovie și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Piracetam-Zdorovie
3. Cum să luați Piracetam-Zdorovie
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Piracetam-Zdorovie
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Piracetam-Zdorovie și pentru ce se utilizează

Piracetamul, substanța activă din Piracetam-Zdorovie este o substanță care are un efect benefic asupra proceselor de studiere, memoriei, atenției și a stării de conștiință, atât la subiecții sănătoși cât și la cei cu afecțiuni neuropsihice. Piracetamul are efecte terapeutice benefice asupra circulației cerebrale și metabolismului cerebral.

Piracetam-Zdorovie este indicat în următoarele situații:

La adulți:

- tratament simptomatic al stărilor patologice, însoțite de scăderea memorie, tulburări cognitive, cu excepția demenței diagnosticate;
- în contracții musculare bruște involuntare de origine centrală (mioclonii corticale), putând fi administrat singur sau în asociere cu alte medicamente.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Piracetam-Zdorovie

Nu utilizați Piracetam-Zdorovie:

- dacă sunteți alergic la piracetam, la alți derivați de piroolidonă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6.1)
- dacă aveți sângerare la nivelul creierului;
- dacă aveți funcția renală sever afectată;
- dacă aveți o boală ereditară care determină distrugerea selectivă a unor celule nervoase ale creierului (coree Huntington);

Atenționări și precauții

Înainte să luați Piracetam-Zdorovie, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Aveți grijă deosebită când luați Piracetam-Zdorovie :

- dacă aveți ulcer gastro-duodenal;

- dacă aveți probleme ale coagulării sângelui, sângerări severe, dacă ați suferit în trecut un atac vascular cerebral hemoragic (spargerea unui vas de sânge în interiorul creierului, declanșând o sângerare în creier), dacă urmează să vi se efectueze o intervenție chirurgicală majoră, incluzând intervenții chirurgicale stomatologice, deoarece acest medicament vă poate afecta coagularea sângelui;
- dacă aveți insuficiență renală, deoarece excreția acestui medicament poate să scadă, crescându-i efectele. Dacă sunteți vârstnic, medicul trebuie să vă evalueze funcția rinichilor dumneavoastră, înainte începerii tratamentului cu acest medicament;
- dacă aveți mioclonii, deoarece întreruperea bruscă a acestui medicament poate determina reapariția convulsiilor.

Copii

Acest medicament nu se administrează la copii.

Piracetam-Zdorovie împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, deoarece Piracetam-Zdorovie poate influența modul în care acționează alte medicamente. De asemenea, alte medicamente pot influența modul în care acționează Piracetam-Zdorovie.

În special, spuneți medicului dumneavoastră dacă luați:

- hormoni tiroidieni;
- anticoagulante precum acenocumarol sau doze mici de acid acetilsalicilic.
- medicamente utilizate în tratamentul epilepsiei

Piracetam-Zdorovie împreună cu alcool

Administrarea concomitentă cu etanol nu a influențat asupra concentrației piracetamului în serul sanguin, iar concentrația etanolului nu s-a modificat la administrarea a 1,6 g piracetam.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu utilizați acest medicament dacă sunteți gravidă, ați putea să rămâneți gravidă sau credeți că ați putea fi gravidă sau dacă alăptați sau intenționați să alăptați.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Prin reacțiile adverse pe care le poate produce, Piracetam-Zdorovie poate influența capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Acest medicament **conține sodiu**. 1 ml de soluție conține 0,169 mg (0,00735 mmol) de sodiu.

3. Cum să luați Piracetam-Zdorovie

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Doza trebuie stabilită individual în funcție de severitatea afecțiunii și de răspunsul la tratament.

Adulți

În *tratamentul simptomatic al stărilor patologice, însoțite de scăderea de memorie, tulburări cognitive*

Doza zilnică recomandată este de 2,4-4,8 g, divizată în două sau trei prize.

În *miocloniile de origine corticală*

Doza zilnică inițială recomandată este de 7,2 g, care poate fi crescută cu câte 4,8 g la intervale de 3-4 zile, până la o doză maximă zilnică de 24 g, divizată în două sau trei prize. Terapia concomitentă cu alte medicamente anti-mioclonice trebuie menținută la aceeași doză zilnică. În funcție de efectul terapeutic obținut, se va reduce, dacă este posibil, doza zilnică a altor medicamente anti-mioclonice. Tratamentul cu piracetam trebuie continuat până la dispariția simptomelor afecțiunii cerebrale inițiale. La pacienții care prezintă un episod acut, ameliorarea spontană poate apărea în timp, de aceea, la fiecare 6 luni se va încerca reducerea dozei sau întreruperea tratamentului. În acest scop, doza de piracetam se va reduce cu 1,2 g la fiecare două zile (la fiecare 3-4 zile în cazul sindromului Lance-Adams pentru a preveni reapariția bruscă a stării sau reluarea crizelor epileptice asociate cu întreruperea tratamentului).

Vârstnici

La pacienții vârstnici cu insuficiență renală se recomandă ajustarea dozei. Pentru tratamentul de lungă durată, este necesară evaluarea periodică a clearance-ului creatininei pentru ajustarea la nevoie a dozei.

Pacienți cu insuficiență renală

Medicul dumneavoastră s-ar putea să decidă scăderea dozelor.

Pacienți cu insuficiență hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență hepatică izolată.

În cazul prezenței concomitente a insuficienței hepatice și renale, medicul dumneavoastră vă va scădea dozele.

Mod de administrare

Piracetam-Zdorovie se administrează intravenos, lent, timp de câteva minute sau sub formă de perfuzie intravenoasă (în primele 24 ore, continuu).

Doza și durata tratamentului se va determina de către medicul dumneavoastră având în vedere starea dumneavoastră, vârsta și alte maladii.

Utilizarea la copii

Acest medicament nu trebuie administrat la copii.

Dacă luați mai mult Piracetam-Zdorovie decât trebuie

Dacă ați utilizat mai mult Piracetam-Zdorovie decât trebuie, adresați-vă cu medicul dumneavoastră sau farmacistului.

În caz de supradozaj, se pot intensifica simptomele reacțiilor adverse ale medicamentului (vezi punctul 4).

Dacă uitați să luați Piracetam-Zdorovie

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Piracetam-Zdorovie

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Opriiți tratamentul și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă în timp ce luați acest medicament prezentați unul dintre următoarele semne:

- umflarea mâinilor, buzelor, gurii sau gâtului, cu dificultăți la înghițire sau la respirație. Aceste reacții apar datorită unui edem alergic sever și necesită intervenția medicului sau spitalizare. Aceste reacții sunt foarte grave, dar apar foarte rar.
- urticaria este tot un simptom alergic. Se întrerupe administrarea medicamentului și medicul va decide tratamentul ulterior. În cazul apariției acesteia pe toată suprafața corpului trebuie anunțat de urgență medicul.

Alte reacții adverse care pot apărea:

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

- nervozitate
- mișcări violente care apar brusc (hiperkinezie)
- creșterea greutateii corporale

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

- depresie
- somnolență
- oboseală

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

- tensiune arterială scăzută
- inflamația venelor însoțită de formarea cheagurilor de sânge (tromboflebită)
- febră
- dureri la locul de administrare.

Reacții adverse cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

- tulburări hemoragice
- reacție de hipersensibilitate, inclusiv reacție anafilactoidă
- excitabilitate, neliniște, confuzie mintală, halucinații
- tulburări de coordonare a mișcărilor (ataxie), tulburări de echilibru, agravarea epilepsiei, dureri de cap, insomnie, tremor
- vertij
- dureri abdominale, dureri în capul pieptului
- greață, vomă, diaree
- dermatită, mâncărimi
- creșterea activității sexuale

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Piracetam-Zdorovie

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Piracetam-Zdorovie

- Substanța activă este piracetam. 1 ml soluție injectabilă conține 200 mg piracetam.
- Celelalte componente sunt: acetat de sodiu trihidrat, acid acetic glacial diluat, apă pentru injecții.

Cum arată Piracetam-Zdorovie și conținutul ambalajului

Soluție transparentă ușor colorată.

Câte 5 ml în fiole de sticlă, câte 10 fiole în cutie de carton cu compartimente despărțitoare; câte 10 (5x2) în blistere din folie PVC sau din folie PVC și folie de aluminiu în cutie de carton.

Câte 10 ml în fiole de sticlă câte 5 sau 10 fiole în cutie de carton cu compartimente despărțitoare.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Compania farmaceutică «Zdorovie» S.R.L.,
61013, or. Harkov, str. Șevcenko, 22. Ucraina.

Fabricantul

Compania farmaceutică «Zdorovie» S.R.L.,
61013, or. Harkov, str. Șevcenko, 22. Ucraina.

Acest prospect a fost aprobat în mai 2025

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>