

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/ PACIENT

Mastodynon picături orale, soluție Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului Dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului Dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 6-8 săptămâni nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Mastodynon picături orale, soluție și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Mastodynon picături orale, soluție
3. Cum să luați Mastodynon picături orale, soluție
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Mastodynon picături orale, soluție
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE MASTODYNON PICĂTURI ORALE, SOLUȚIE ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Mastodynon picături orale, soluție este un medicament homeopatic indicat în următoarele afecțiuni ginecologice:

- sindrom premenstrual cu dureri și disconfort la nivelul sânilor; mastopatie
- dureri în timpul menstruației și ciclu menstrual neregulat (tulburări ale ciclului menstrual).

În cazul durerilor continue, neclare care reapar periodic, consultați medicul. Astfel de simptome pot fi asociate cu o boală gravă și ar putea necesita o supraveghere medicală.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE..SĂ..LUAȚI..MASTODYNON..PICĂTURI ORALE, SOLUȚIE

Nu utilizați Mastodynon picături orale, soluție:

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerați la pct. 6).

Atenționări și precauții:

Dacă suferiți sau ați suferit de tumoare malignă dependentă de estrogeni trebuie să consultați medicul înainte de a administra Mastodynon picături orale, soluție.

Dacă administrați agonști sau antagonști ai receptorilor dopaminergici, estrogeni sau antiestrogeni, trebuie să consultați medicul înainte de a lua acest medicament.

Dacă aveți antecedente de boli ale glandei pituitare trebuie să consultați medicul înainte de administrarea acestui medicament.

Adresați-vă medicului sau farmacistului, în cazul în care se atestă semne de agravare a bolii în timpul tratamentului cu picături orale Mastodynon.

Mastodynon trebuie administrat nu mai puțin de 3 luni, inclusiv în timpul menstruației. Ameliorarea stării pacientelor survine de regulă peste 6 săptămâni de tratament.

Dacă simptomele revin după întreruperea administrării, tratamentul poate fi continuat după consultația medicului.

Similar altor medicamente, preparatele homeopatice nu trebuie administrate o perioadă îndelungată de timp fără supravegherea medicului.

Administrarea la copii

Nu există date suficiente privind utilizarea acestui medicament la copii.

Nu se recomandă utilizarea de către copii și adolescenți mai mici de 18 ani.

Mastodynon picături orale, soluție împreună cu alte medicamente

Nu poate fi exclusă interacțiunea medicamentului cu agoniști și antagoniști dopaminergici, estrogeni și antiestrogeni.

Spuneți medicului sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Mastodynon picături orale, soluție împreună cu alimente și băuturi

Notă:

Eficacitatea unor medicamente homeopatice poate fi afectată negativ de un mod de viață nesănătos și de consumul de substanțe iritante și stimulente (de ex. cafea).

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există indicații pentru utilizarea acestui medicament în timpul sarcinii. Prin urmare Mastodynon nu trebuie utilizate în timpul sarcinii.

Folosirea acestui medicament în timpul alăptării, nu este recomandată deoarece studiile pe animale indică o reducere a cantității de lapte.

Vitex agnus castus poate influența fertilitatea feminină prin reglarea ciclului menstrual. ex. ar putea mări probabilitatea de a deveni însărcinată.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu au fost efectuate studii privind efectele asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Mastodynon picături orale, soluție conține alcool – 390 mg alcool (etanol) în 30 de picături, care este echivalent cu 420 mg/ml (53% v/v). Cantitatea de alcool din 30 de picături este echivalentă cu 10 ml bere sau 4 ml vin. Poate fi dăunător persoanelor cu etilism. Acest lucru trebuie avut în vedere la gravide sau la femeile care alăptează, copii și la grupuri cu risc crescut cum sunt pacienții cu boli hepatice sau epilepsie.

3. CUM SĂ LUAȚI MASTODYNON PICĂTURI ORALE, SOLUȚIE

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul Dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.


Dacă nu a fost prescris altfel de către medicul dvs., doza recomandată este:

Vârsta	Doza unică	Doza zilnică
Adulți	30 picături	30 picături de 2 ori pe zi

Nu există date suficiente pentru recomandări specifice de dozare în cazul insuficienței renale / hepatice.

Metoda de administrare

Luăți picăturile dimineața și seara, cu o cantitate suficientă de apă (de ex., un pahar cu apă). Acest medicament poate fi administrat împreună cu alte lichide. Țineți flaconul-picurator în poziție verticală (vezi imaginea).



Consultați medicul dacă aveți impresia că efectele preparatului sunt prea puternice sau prea slabe.

Dacă utilizați mai mult Mastodynon picături orale, soluție decât trebuie
Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Mastodynon picături orale, soluție
Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Mastodynon picături orale, soluție

Stoparea administrării preparatului Mastodynon picături orale, soluție de obicei este inofensivă. Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile)

- reacții alergice severe cu umflare a feței, dificultăți la respirație și înghițire
- reacții (alergice) pe piele (erupții trecătoare, urticarie), acnee
- dureri de cap, amețeli
- tulburări gastro-intestinale (cum sunt greață, dureri abdominale)
- tulburări ale ciclului menstrual

La apariția primelor reacții adverse, administrarea preparatului Mastodynon picături orale, soluție trebuie sistată.

Dacă oricare reacții adverse devin grave, sau dacă observați reacții adverse care nu sunt menționate în acest prospect, trebuie să spuneți medicului sau farmacistului.

Notă :

Administrarea medicamentelor homeopatice poate determina o agravare temporară a simptomelor preexistente (agravare inițială). În acest caz, întrerupeți tratamentul și adresați-vă la medic.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului Dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți

raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigelenta@amdm.gov.md. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ MASTODYNON PICĂTURI ORALE, SOLUȚIE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor!

După prima deschidere a flaconului produsul este valabil timp de 6 luni.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

În procesul păstrării este posibilă apariția unei opalescențe ușoare sau floculări, care nu influențează eficacitatea preparatului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Mastodynon picături orale, soluție

100 g picături orale, soluție conține:

Vitex agnus castus Ø	20 g
Caulophyllum thalictroides D4	10 g
Cyclamen purpurascens D4	10 g
Strychnos ignatii D6	10 g
Iris versicolor D2	20 g
Lilium tigrinum D3	10 g

Celelalte componente sunt:

Alcool

Cum arată Mastodynon picături orale, soluție și conținutul ambalajului

Picături orale, soluție este lichid transparent de culoare gălbuie, cu miros aromat.

Câte 50 ml în flacon-picurător. Câte 1 flacon împreună cu prospectul pentru pacient plasate în cutie de carton.

Acest medicament este disponibil și în comprimate (Mastodynon comprimate).

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

BIONORICA SE,
Kerschensteinerstrasse 11-15,
92318, Neumarkt, Germania.
Tel: 09181/231-90
Fax: 09181/231-265
Email: info@bionorica.de

Fabricantul

BIONORICA SE,
Kerschensteinerstrasse 11-15,

92318, Neumarkt, Germania.

Acest prospect a fost revizuit în iunie 2022

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>