

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Adenoprosin 150 mg supozitoare complexul activ Adenoprosin

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Adenoprosin și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Adenoprosin
3. Cum să utilizați Adenoprosin
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Adenoprosin
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Adenoprosin și pentru ce se utilizează

Adenoprosin se recomandă bărbaților în tratamentul următoarelor afecțiuni:

- hiperplazia benignă a prostatei;
- prostatita cronică (în cadrul tratamentului complex);
- sindromul cronic dureros pelvin;
- stări după intervenții chirurgicale asupra prostatei.

Hiperplazia benignă de prostată și/sau prostatita cronică poate determina probleme urinare, cum sunt eliminarea cu dificultate a urinei și necesitatea de a merge frecvent la toaletă. De asemenea, poate determina ca jetul urinar să fie mai lent și mai slab. Dacă afecțiunea rămâne netratată, există riscul unui blocaj complet al fluxului urinar (retenție acută de urină).

Preparatul Adenoprosin diminuează permeabilitatea vasculară și edemul prostatei, reglează tonusul și peristaltismul segmentelor inferioare ale căilor urinare, micțiunile devenind mai eficiente cu diminuarea frecvenței, îndeosebi a celor nocturne, cu reducerea disuriei, senzației de golire incompletă a vezicii și tensiune în timpul urinării.

Prin mecanisme patogenetice și nespecifice, Adenoprosin ameliorează parametrii urodinamici (crește rata maximă a debitului volumic de urină, reduce timpul de urinare, reduce cantitatea de urină reziduală) și starea generală a pacienților cu hiperplazie benignă de prostată (HBP) și prostatită cronică (reduce indicele de prostatită cronică, reduce conținutul de leucocite în secrețiile prostatice, îmbunătățește uniformitatea ecostructurii prostatei).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Adenoprosin

Nu utilizați Adenoprosin:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la excipient;
- dacă aveți retenție urinară acută (blocaj complet al fluxului urinar);

- dacă sunteți o femeie (deoarece acest medicament este indicat doar pentru bărbați);
- dacă ești un copil sau un adolescent cu vârsta mai mică de 18 ani.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă credeți că vreuna dintre afirmațiile de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Adenoprosin, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Asigurați-vă că medicul dumneavoastră știe dacă aveți afecțiuni severe la rinichi.

Nu trebuie utilizat la copii și adolescenți cu vârsta mai mică de 18 ani.

A se utiliza exclusiv rectal.

Poate provoca prurit anal.

Adresați-vă medicului sau farmacistului dacă aveți orice nelămuriri despre cum să luați Adenoprosin.

Adenoprosin împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Adenoprosin împreună cu alimente, băuturi și alcool

Nu este cazul.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Adenoprosin nu trebuie luat de către femei.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Adenoprosin nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Adenoprosin

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Mod de administrare

Rectal.

Doza recomandată este de un supozitor pe zi, preferabil seara la una și aceeași oră, după actul de defecație sau clismă. După administrarea supozitorului se recomandă să vă aflați în poziție culcat pe o perioadă de 30-40 minute.

Dacă utilizați mai mult Adenoprosin decât trebuie

În cazul în care v-ați administrat o doză mai mare decât cea recomandată, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați Adenoprosin

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luați următoarea doză la timpul stabilit.

Dacă încetați să utilizați Adenoprosin

Nu întrerupeți tratamentul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a întrerupe tratamentul.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Pe durata tratamentului pot apărea reacții adverse rare – diaree sau scaun frecvent, cu frecvență necunoscută – prurit anal.

În cazul apariției unor astfel de reacții adresați-vă medicului dumneavoastră.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Adenoprosin

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Adenoprosin după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Adenoprosin

- Substanța activă este complexul activ Adenoprosin Fiecare supozitor conține 150 mg substanță activă.
- Celelalte componente sunt: ulei de mușețel, gliceride solide de semisinteză.

Cum arată Adenoprosin și conținutul ambalajului

Medicamentul se prezintă sub formă de supozitoare de formă cilindrico-conică, de culoare de la galben până la brun.

Adenoprosin este disponibil în cutii de carton cu 2 blistere a câte 5 supozitoare în blister împreună cu prospectul.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SC Biotehnos SA

Str. Gorunului, nr. 3-5, Otopeni, jud. Ilfov, România

Telefon: +4(031) 710 24 02

Telefax: +4(031) 710 24 00

E-mail: office@biotehnos.com

Fabricantul

Farmaprim, Republica Moldova
str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni,
MD-4829

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2024.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului certificatului de înregistrare:

Biotehnos S.R.L.

str. Maria Cebotari, 20, mun. Chisinau, MD-2012

Republica Moldova

Telefon: (+373) 22 10 50 68

E-mail: office@biotehnos.md

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>