

**Prospect: Informații pentru utilizator****Aciclovir Terapia 200 mg comprimate**  
Aciclovir

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Aciclovir Terapia și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Aciclovir Terapia
3. Cum să luați Aciclovir Terapia
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Aciclovir Terapia
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Aciclovir Terapia și pentru ce se utilizează**

Aciclovir Terapia este un antiviral de uz sistemic. Acesta acționează prin distrugerea sau oprirea creșterii virusurilor.

Aciclovir Terapia este utilizat pentru:

- tratamentul infecțiilor herpetice cutaneo-mucoase (inclusiv cu localizare genitală) primare sau recurente, determinate de virusul herpes simplex (VHS) (excluzând VHS neonatal și infecții severe cu VHS la copii imunodeprimați);
- prevenirea infecțiilor recurente determinate de VHS la pacienți imunocompetenți;
- prevenirea infecțiilor determinate de VHS la pacienți imunodeprimați;
- tratamentul infecțiilor cu virus varicelo-zosterian (VVZ).

**2. Ce trebuie să știți înainte să luați Aciclovir Terapia****Nu luați Aciclovir Terapia**

- dacă sunteți alergic la aciclovir, valaciclovir sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

**Atenționări și precauții**

Înainte să luați Aciclovir Terapia, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- dacă aveți probleme cu rinichii (în acest caz doza trebuie modificată);
- dacă sunteți în vârstă, mai mult de 65 de ani, deoarece poate fi necesară scăderea dozei;
- dacă folosiți doze mari (de exemplu pentru infecția cu herpes zoster), deoarece trebuie să vă hidratați corespunzător;
- dacă aveți imunitatea foarte scăzută, în cazul în care utilizați medicamentul timp îndelungat sau în cure repetate unele tulpini de virus pot deveni rezistente;

- utilizarea medicamentului nu reduce complicațiile asociate varicelei, dacă aveți imunitatea foarte scăzută.

Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a utiliza Aciclovir Terapia.

Este important să consumați multă apă în timp ce luați Aciclovir Terapia.

### **Aciclovir Terapia împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Spuneți întotdeauna medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați unul din următoarele medicamente împreună cu Aciclovir Terapia:

- probenecid (poate prelungi eliminarea aciclovirului și crește concentrația lui în sânge);
- cimetidină sau alte medicamente care pot influența eliminarea aciclovirului;
- micofenolat mofetil (folosit pentru a opri organismul dumneavoastră să respingă organele transplantate);
- teofilină (utilizată pentru problemele de respirație).

### **Aciclovir Terapia împreună cu alimente și bauturi**

Aciclovir Terapia poate fi administrat înainte, în timpul sau după masă.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă adresati-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Aciclovir Terapia se poate utiliza în timpul sarcinii și alăptării numai dacă medicul vă recomandă acest lucru.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu se cunosc efectele aciclovirului asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

## **3. Cum să luați Aciclovir Terapia**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

*Tratamentul infecțiilor determinate de virusul herpes simplex (VHS) (herpes cutaneo-mucos și herpes genital)*

- Doza uzuală este de 200 mg aciclovir, administrat oral de 5 ori pe zi.
- Veți lua doza la intervale de aproximativ 4 ore. Se recomandă administrarea la orele: 7, 11, 15, 19 și 23, cu pauză în timpul nopții.
- Durata tratamentului este de 5 zile; în infecțiile severe, tratamentul poate fi prelungit de către medicul dumneavoastră.

*Prevenirea infecțiilor care reapar cu virusul herpes simplex (VHS) (herpes cutaneo-mucos și herpes genital)*

- Doza recomandată este de 200 mg aciclovir administrat oral de 4 ori pe zi.
- Veți lua doza la intervale de aproximativ 6 ore.
- Trebuie să luați Aciclovir Terapia până când medicul dumneavoastră vă spune să vă opriți.

*Prevenirea infecțiilor care reapar cu virusul herpes simplex (VHS) (herpes cutaneo-mucos și herpes genital) la pacienții a căror sistem imunitar nu funcționează bine și sunt mai puțin capabili să lupte împotriva infecțiilor*

- Doza recomandată este de 200 mg aciclovir, administrat oral de 4 ori pe zi.
- Veți lua doza la intervale de aproximativ 6 ore.
- Trebuie să luați Aciclovir Terapia până când medicul dumneavoastră vă spune să vă opriți.

*Tratamentul infecțiilor cu virusul varicelo-zosterian (VVZ) (varicelă și zona zoster)*

- Doza recomandată este de 800 mg aciclovir, administrat oral de 5 ori pe zi.

- Veți lua doza la intervale de 4 ore. Se recomandă administrarea la orele: 7, 11, 15, 19 și 23 cu pauză în timpul nopții.
- Durata tratamentului este de 7 zile.

**Medicul dumneavoastră poate modifica doza de Aciclovir Terapie:**

- **dacă** este pentru un copil
- **dacă** aveți vârsta peste 65 de ani
- **dacă** aveți probleme cu rinichii. Dacă aveți probleme cu rinichii, este important să consumați multă apă în timp ce sunteți tratat cu Aciclovir Terapie.

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Aciclovir Terapie dacă sunteți în oricare dintre situațiile de mai sus.

**Dacă luați mai mult decât trebuie din Aciclovir Terapie**

Dacă luați accidental mai multe comprimate, puteți prezenta: greață, vărsături, dureri de cap, confuzie. În acest caz, anunțați de urgență medicul sau mergeți la cel mai apropiat spital.

**Dacă uitați să luați Aciclovir Terapie**

Dacă uitați să luați medicamentul, dar vă amintiți la scurt timp, luați imediat comprimatul uitat. Dacă a trecut mai mult timp, nu mai luați doza uitată și luați următoarea doză, conform schemei de administrare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

**4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

**Reacții alergice rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)**

Dacă aveți o reacție alergică, încetați să utilizați Aciclovir Terapie și consultați imediat un medic. Simptomele pot include:

- erupții cutanate, mâncărime sau urticarie pe piele
- umflarea feței, buzelor, limbii sau a altor părți ale corpului dumneavoastră
- respirație dificilă, respirație șuierătoare sau probleme de respirație
- febră inexplicabilă și senzație de leșin, în special la ridicarea în picioare.

Alte reacții adverse includ:

*Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):*

- durere de cap;
- amețelă;
- greață;
- vărsături;
- diaree;
- dureri abdominale;
- erupții trecătoare pe piele;
- mâncărime;
- erupții trecătoare pe piele după expunere la soare;
- oboseală;
- febră.

*Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):*

- urticarie;
- căderea părului.

*Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):*

- dispnee (lipsă de aer);
- creșterea reversibilă a valorilor serice a bilirubinemiei și a enzimelor hepatice;

- creșterea a ureei sanguine și creatininemiei;
- umflarea feței, buzelor, gurii, limbii sau gâtului (anafilaxie).

*Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane):*

- anemie (scăderea numărului celulelor roșii);
- leucopenie (scăderea numărului celulelor albe);
- trombocitopenie (scăderea numărului plachetelor sanguine);
- agitație;
- confuzie;
- tremor;
- instabilitate la mers și lipsă de coordonare;
- dificultăți de vorbire;
- halucinații (vederea și auzirea unor lucruri care nu există);
- simptome psihotice;
- incapacitate de a gândi în mod clar;
- somnolență;
- convulsii;
- tulburări de comportament, de vorbire și ale mișcărilor ochilor (encefalopatie);
- inconstiență (comă);
- inflamația ficatului (hepatită);
- îngălbenirea pielii și a albului ochilor (icter);
- probleme cu rinichii, cu producerea de urină în cantitate mică sau deloc (insuficiență renală acută);
- dureri de spate, în zona rinichilor sau chiar deasupra șoldului (durere renală).

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Aciclovir Terapia**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Aciclovir Terapia**

- Substanța activă este aciclovir. Un comprimat conține aciclovir 200 mg
- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, povidonă K 30, amidon de porumb, talc, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru, amidonglicolat de sodiu.

### **Cum arată Aciclovir Terapia și conținutul ambalajului**

Comprimate plate, de formă cilindrică, de culoare albă, cu diametrul de 10 mm, inscripționate pe una din fețe cu „Av”.

Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate

### **Deținătorul autorizației de punere de piață și fabricantul**

Terapia S.A.  
Str. Fabricii, nr. 124, Cluj-Napoca, România

**Acest prospect a fost revizuit în ianuarie 2022.**