

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Kagocel® 12 mg comprimate

Kagocel

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Kagocel® și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Kagocel®
3. Cum să utilizați Kagocel®
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Kagocel®
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Kagocel® și pentru ce se utilizează

Kagocel® este un medicament antiviral. El își manifestă acțiunea prin inducerea producerii unei substanțe proteice (interferoni), care împiedică dezvoltarea virusurilor.

Kagocel® se utilizează la adulți și copii cu vârsta peste 3 ani în tratamentul și profilaxia gripei și altor infecții respiratorii virale acute (IRVA), de asemenea în tratamentul herpesului la adulți.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați

Kagocel®

Nu utilizați Kagocel®

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului (enumerată la pct. 6);
- dacă sunteți gravidă sau alăptați la sân;
- la copii cu vârsta sub 3 ani;
- dacă aveți intoleranță la lactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Kagocel®, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Pentru obținerea efectului terapeutic trebuie să începeți să utilizați Kagocel® nu mai târziu de ziua a4-a de la debutul bolii.

Copii și adolescenți

Kagocel® se administrează la copii cu vârsta de la 3 ani și peste.

Kagocel® împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați oricare medicamente, inclusiv eliberate fără prescripție medicală.

Kagocel® se poate utiliza împreună cu alte medicamente antivirale (utilizate în infecții provocate de virusuri), imunomodulatoare (medicamente, care cresc imunitatea) și antibiotice (medicamente, utilizate în tratamentul infecțiilor cu bacterii).

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-va medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Din cauza lipsei datelor clinice Kagocel® este contraindicat în sarcină și perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu s-au efectuat studii privind influența utilizării medicamentului asupra capacității de a conduce vehicule sau de a manevra utilaje.

Kagocel® conține lactoză

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizați Kagocel®

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Administrare orală, independent de aportul alimentelor.

Tratamentul gripei și IRVA la adulți: în primele 2 zile se utilizează câte 2 comprimate de 3 ori pe zi, în următoarele 2 zile - câte 1 comprimat de 3 ori pe zi. La o cură de tratament se administrează 18 comprimate. Durata tratamentului - 4 zile.

Profilaxia gripei și IRVA la adulți se efectuează sub formă de cicluri cu durata de 7 zile: în primele 2 zile se utilizează câte 2 comprimate o dată pe zi, urmează o întrerupere de 5 zile, apoi ciclul se repetă. Durata ciclului profilactic - de la 1 săptămână până la câteva luni.

Tratamentului herpesului la adulți: câte 2 comprimate de 3 ori pe zi timp de 5 zile. La o cură de tratament se administrează 30 comprimate. Durata tratamentului - 5 zile.

Tratamentul gripei și IRVA la copii cu vârsta de la 3 până la 6 ani: în primele 2 zile se utilizează câte 1 comprimat de 2 ori pe zi, în următoarele 2 zile - câte 1 comprimat o dată pe zi. La o cură de tratament se administrează 6 comprimate. Durata tratamentului - 4 zile.

Tratamentul gripei și IRVA la copii cu vârsta peste 6 ani: în primele 2 zile se utilizează câte 1 comprimat de 3 ori pe zi, în următoarele 2 zile - câte 1 comprimat de 2 ori pe zi. La o cură de tratament se administrează 10 comprimate. Durata tratamentului - 4 zile.

Profilaxia gripei și IRVA la copii cu vârsta peste 3 ani se efectuează sub formă de cicluri cu durata de 7 zile: în primele 2 zile se utilizează câte 1 comprimat o dată pe zi, urmează o întrerupere de 5 zile, apoi ciclul se repetă. Durata ciclului profilactic - de la 1 săptămână până la câteva luni.

Pentru a obține efect maxim, începeți să luați Kagocel® nu mai târziu de a 4-a zi de la debutul bolii. În scop profilactic puteți lua Kagocel® oricând, inclusiv imediat după contactul cu agentul patogen alinfecției.

Dacă utilizați mai mult Kagocel® decât trebuie

În caz de supradozare contactați medicul dumneavoastră.

E necesar de provocat vomă și de consumat lichide în cantități mari.

Dacă uitați să utilizați Kagocel®

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată, luați numai doza următoare la ora obișnuită.

Dacă ați omis mai multe doze, adresați-vă la medicul dumneavoastră și urmați recomandările date.

Dacă încetați să utilizați Kagocel®

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca și toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse posibile la utilizarea medicamentului sunt prezentate în funcție de frecvența apariției (conform clasificării OMS):

Foarte frecvente ($\geq 1/10$) Frecvente ($\geq 1/100$, $< 1/10$), mai puțin frecvente ($\geq 1/1000$, $< 1/100$), rare ($\geq 1/10000$, $< 1/1000$), foarte rare ($< 1/10000$), cu frecvența necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Cu frecvența necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

- inclusiv erupții cutanate, urticarie, mâncărimea pielii, edem Quincke (umflaredureroasă a buzelor, limbii, feței sau gâtului și dificultate bruscă în respirație);
- greață, diaree, dureri de stomac.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse indicate în Prospect se agravează sau observați orice alte reacții adverse care nu sunt enumerate în Prospect, spuneți medicului dumneavoastră.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Kagocel®

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în cutia originală, la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați medicamentul dacă observați defecte ale produsului și/sau ale ambalajului.

Vă rugăm să contactați compania și să informați despre defectele observate.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare

se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Kagocel®

- *Substanța activă* este kagocel. Un comprimat conține kagocel (în recalcul la substanță uscată) – 12 mg.

Celelalte componente sunt: amidon de cartofi, stearat de calciu, excipient complex (lactoză monohidrat, povidonă, crosopovidonă sau lactoză monohidrat, povidonă, crosopovidonă.

Cum arată Kagocel® și conținutul ambalajului

Kagocel® se prezintă sub formă de comprimate rotunde, biconvexe, de culoare de la alb cu nuanță maronie până la maro deschis, cu incluziuni de culoare maro.

Ambalajul

Câte 10 comprimate într-un blister cu perforare sau câte 10, 15 sau 20 comprimate într-un blister fără perforare.

1, 2 sau 3 blistere a câte 10 comprimate fiecare sau 1 blister cu 20 comprimate sau 2 blistere a câte 15 comprimate fiecare, împreună cu prospectul, sunt plasate într-o cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

„NEARMEDIC PLUS” SRL, Rusia

115114, or. Moscova, st. Kozhevniceskaya 14, clădirea 5, etaj 3, încăperea 17.

Tel.: +7 (495) 646-28-68

e-mail: info@binnopharmgroup.ru

Fabricantul responsabil de eliberarea seriei

NEARMEDIC PHARMA SRL,

șos. Kiev, 120, bl. 7 or. Obninsk,

sectorul "Orașul Obninsk"

reg. Kaluga, Rusia.

Acest prospect a fost revizuit în

Octombrie 2024

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>