

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Dimexol-MC 99% soluție cutanată *Dimethylsulfoxidum*

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct.4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este **Dimexol-MC** și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați **Dimexol-MC**
3. Cum să luați **Dimexol-MC**
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează **Dimexol-MC**
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Dimexol-MC și pentru ce se utilizează

Dimexol-MC - dimetilsulfoxidul manifestă acțiune antiinflamatoare, analgezică, antiseptică și fibrinolică. Are capacitatea de a pătrunde prin membranele biologice, inclusiv prin piele, facilitând absorbția prin piele intactă și mucoase a medicamentelor. Există date că preparatul este capabil să restabilească activitatea antimicrobiană a antibioticelor față de tulpinile microorganismelor rezistente sau moderat sens.

Dimexol-MC se utilizează pentru tratamentul afecțiunilor inflamatorii ale aparatului locomotor (artrită reumatoidă, boala Behterev, osteoartroză deformantă, artropatii, entorse), în contuzii, infiltrate traumatiche, edeme inflamatorii, răni purulente, abcese, osteomielite acute și cronice, tratamentul eritemului nodos, streptodermie. **Dimexol-MC** poate fi utilizat în asociere cu antiinflamatoare nesteroidiene în tratamentul complex al osteoartrozei deformante și artritei reumatoide, în asociere cu antibacteriene cu acțiune locală (de exemplu, liniment de sintomicină) - în tratamentul sclerodermiei, acneei, erizipelului, furunculozei, foliculitelor și a altor boli de piele; în asociere cu heparina - în inflamația venelor însoțită de formarea cheagurilor de sânge (tromboflebite).

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Dimexol-MC

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la dimetilsulfoxid
- dacă aveți insuficiență severă a funcției inimii și a vaselor de sânge
- dacă aveți ateroscleroză avansată
- dacă suferiți de dureri în regiunea inimii (angină pectorală)
- dacă ați suportat un accident vascular cerebral
- dacă pacientul se află în stare de comă
- dacă aveți dereglări ale funcției rinichilor și ficatului
- dacă suferiți de cataractă
- dacă suferiți de glaucom

- dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Atenționări și precauții

A se evita contactul cu mucoasele, inclusiv cea oculară.

Se va aplica numai pe suprafețe limitate ale pielii.

Medicul dumneavoastră vă poate efectua un test de sensibilitate înainte de utilizarea medicamentului. La temperatura sub 18 °C este posibilă cristalizarea dimetilsulfoxidului. Acest fapt nu influențează calitatea și proprietățile medicamentului. Topirea cristalelor poate fi efectuată prin încălzirea ușoară a flaconului pe baia de apă (temperatura apei circa 60 °C).

Nu se recomandă de utilizat la copii cu vârsta sub 12 ani.

Dimexol-MC împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Efectul tratamentului poate fi modificat dacă dimetilsulfoxidul este utilizat în același timp cu alte medicamente.

Vă rugăm să comunicați medicului dumneavoastră sau farmacistului că luați:

- insulină - pentru diabet zaharat
- acid acetilsalicilic, butadionă - pentru boli reumatice, dureri
- digitale - pentru stimularea lucrului inimii
- chinidină - pentru tulburări de ritm a inimii
- nitroglicerină - pentru dureri în regiunea inimii
- antibiotice (streptomycină, monomicină, etc.)
- pentru boli infecțioase.

Înainte de o intervenție chirurgicală vă rugăm să comunicați medicului dumneavoastră că utilizați Dimexol-MC, deoarece acest medicament poate mări efectul anestezicelor generale.

Dimexol-MC împreună cu alimente și băuturi

Dimexol-MC se utilizează cutanat.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Acest medicament este contraindicat în sarcină și în perioada de alăptare

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Preparatul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să luați Dimexol-MC

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Se utilizează cutanat, sub formă de soluții apoase (cu concentrația 30-50%) pentru comprese, tampoane și irigații.

Compresele se aplică pe porțiunile lezate și pe suprafețele sănătoase adiacente. Meșele de tifon umezite cu soluție de dimetilsulfoxid se aplică pe porțiunile lezate pentru o perioadă de 20-30 minute, o dată pe zi. De-asupra meșei de tifon se aplică o peliculă de polietilenă și țesătură de bumbac sau in.

Pentru tratamentul erizipelului și ulcerelor trofice se utilizează soluția apoasă 30-50%, câte 50-100 ml de 2-3 ori pe zi. În eczemă, streptodermii difuze se recomandă comprese cu soluție 40-90% dimetilsulfoxid, în furunculoze - cu soluție 40%. Pentru efect anestezic local se recomandă soluția 25-50% pentru comprese, câte 100-150 ml, de 2-3 ori pe zi. În tratamentul arsurilor profunde se utilizează pansamente cu soluție 20-30% dimetilsulfoxid (la necesitate - până la 500 ml). Soluțiile de 10-20-30% se utilizează pentru irigarea plăgilor purulentnecrotice, cavităților și focarelor inflamatoare. În chirurgia plastică se utilizează pansamente cu soluție 20-30% dimetilsulfoxid pe auto- și homotranspalante nemijlocit după intervenție și în următoarele zile până la prinderea completă a grefei. Ca mediu pentru conservare a homotranspalantelor cutanate se utilizează soluția 5% dimetilsulfoxid în soluție Ringer.

Se recomandă următoarele concentrații pentru prepararea soluțiilor apoase:

Concentrația soluției, %	Cantitatea medicamentului, în părți de volum	Cantitatea de apă, în părți de volum
10	1	9
20	1	4
30	3	7
40	2	3
50	1	1
90	9	1

Copii și adolescenți

Nu se recomandă de utilizat la copii cu vârsta sub 12 ani.

La copii și adolescenți cu vârsta 12-18 ani se recomandă de folosit dimetilsulfoxid sub formă de soluții apoase cu concentrația 20-30%.

Durata tratamentului

Regimul de dozare și durata tratamentului se stabilesc individual, în funcție de starea și vârsta pacientului.

Durata uzuală a tratamentului este de 10-15 zile

Dacă luați mai mult Dimexol-MC decât trebuie

Dacă ați utilizat mai mult Dimexol-MC decât vi s-a indicat pot apărea reacții alergice și agravarea reacțiilor adverse. În acest caz se recomandă întreruperea utilizării medicamentului și adresarea la medic.

Dacă uitați să luați Dimexol-MC

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 utilizatori)

Reacții alergice, inclusiv inflamația pielii (dermatite), erupții pe piele, inflamarea pielii la nivelul feței, gâtului, buzelor, cu dificultăți de respirație și înghițire (edem angioneurotic - o reacție alergică gravă), mâncărime, bronhospasm, senzație de arsură, înroșirea pielii, uscăciunea pielii.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 utilizatori) Amețeli, dureri de cap, insomnie, stare de inhibare (adinamie), greață, vărsături, diaree.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.amdm.gov.md/> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Dimexol-MC

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați Dimexol-MC după data de expirare înscrisă pe cutie după “Exp.:”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Dimexol-MC

Substanța activă este dimetilsulfoxidul. Un flacon conține dimetilsulfoxid 99 % 50 g sau 100 g.

Cum arată Dimexol-MC

Lichid transparent incolor. Higroscopic.

Câte 50 g sau 100 g în flacoane din sticlă de culoare brună.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

«MC PHARMACEUTICALS» SRL

R. Moldova, Chișinău, str. Industrială 59/3

Fabricantul

«MC PHARMACEUTICALS» SRL

R. Moldova, Chișinău, str. Industrială 59/3

Acest prospect a fost aprobat în decembrie 2024

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>