

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Novocain-Zdorovie 5 mg/ml soluție injectabilă

Clorhidrat de procaină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este Novocain-Zdorovie soluție injectabilă și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Novocain-Zdorovie soluție injectabilă
3. Cum să utilizați Novocain-Zdorovie soluție injectabilă
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Novocain-Zdorovie soluție injectabilă
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Novocain-Zdorovie soluție injectabilă și pentru ce se utilizează

Novocain-Zdorovie este un medicament care aparține unui grup de medicamente numite anestezice locale.

Este utilizat la adulți pentru anestezia (amortirea) anumitor regiuni ale corpului prin infiltrație sau pentru efectuarea blocului nervos cu scop de tratament.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Novocain-Zdorovie soluție injectabilă

Nu utilizați Novocain-Zdorovie:

- dacă sunteți alergic la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componentele ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă aveți slăbiciune musculară severă;
- dacă aveți tensiunea arterială scăzută;
- dacă aveți procese purulente la locul administrării;
- dacă aveți intervenții chirurgicale de urgență, însoțite de sângerări acute;
- dacă aveți modificări fibroase pronunțate în țesuturi (pentru anestezia prin infiltrație). Acest medicament nu se administrează la copii.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Novocain-Zdorovie, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- Dacă aveți o boală de inimă, ficat sau rinichi. Spuneți medicului dacă aveți oricare din aceste probleme deoarece este posibil ca doza de Novocain-Zdorovie să necesite o ajustare;

- Dacă ați avut reacții alergice severe;
- Dacă apar semne de toxicitate, administrarea medicamentului trebuie întreruptă;
- Dacă aveți afecțiuni inflamatorii;
- Dacă aveți un nivel scăzut de pseudocolinesterază (o proteină plasmatică);
- Dacă sunteți vârstnic (cu vârsta peste 65 ani);
- Dacă vă aflați în stare gravă;
- Dacă aveți o stare de slăbiciune;
- Dacă sunteți gravidă, vă aflați în travaliu sau alăptați;

Copii și adolescenți

Este contraindicată administrarea medicamentului la acest grup de pacienți.

Novocain-Zdorovie împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Acest lucru este important mai ales dacă luați unul dintre următoarele medicamente:

- Alte remedii anestezice, inclusiv suxametoniu;
- Inhibitori MAO (inclusiv furazolidonă, procarbazină, selegilină)
- Remedii anticolinesterazice, utilizate în slăbiciune musculară severă.
- Anticoagulante orale, utilizate în formarea cheagurilor de sânge.

La prelucrarea locului administrării Novocain-Zdorovie cu soluție dezinfectantă care conține unele metale grele, se mărește riscul dezvoltării reacțiilor locale sub formă de durere și edem.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Administrarea în sarcină este posibilă cu condiția unei toleranțe bune a medicamentului. În perioada alăptării, medicamentul se va administra după evaluarea preliminară riguroasă a beneficiului scontat al terapiei pentru mamă și riscului potențial pentru sugar.

La administrarea în timpul travaliului, este posibilă apariția bradicardiei (scăderea ritmului inimii), apneei (oprirea respirației), convulsiilor la nou-născut.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

În timpul tratamentului se recomandă prudență la conducerea autovehiculelor și exercitarea altor activități, ce necesită concentrare sporită a atenției și reacții psihomotorii rapide.

3. Cum să utilizați Novocain-Zdorovie

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Soluția Novocain-Zdorovie trebuie să vi se administreze doar în medii spitalicești adecvate și de către medici specialiști cu experiență. Medicul dumneavoastră va alege doza și concentrația minimă eficace.

Dacă ați utilizat mai mult Novocain-Zdorovie decât trebuie

Dacă ați utilizat mai mult Novocain-Zdorovie decât trebuie, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Simptome: paliditatea tegumentelor și mucoaselor, vertij, greață, vomă, hiperexcitabilitate nervoasă, transpirații reci, ritm crescut al inimii, tensiune arterială scăzută până la leșin, tremor, convulsii, methemoglobinemie (creșterea anormală a concentrației methemoglobinei în sânge), depresia respirației până la oprirea respirației, stop cardiac.

Acțiunea asupra sistemului nervos central se manifestă prin neliniște, halucinații, convulsii, excitație motorie.

Dacă ați uitat să utilizați Novocain-Zdorovie

Acest medicament nu se administrează regulat, ci numai în caz de nevoie. Obișnuit, Novocain-Zdorovie vi se va administra de un personal medical cu experiență. Nu vi se va administra o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Novocain-Zdorovie

Novocain-Zdorovie se utilizează numai la nevoie. Medicul dumneavoastră va decide durata tratamentului cu procaină. Urmați strict recomandările medicului.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele reacții adverse au o frecvență necunoscută (care nu poate fi determinată în baza informațiilor disponibile)

- Mâncărime, erupții ale pielii, dermatită (inflamarea pielii), descuamarea pielii, urticarie, alte reacții alergice, inclusiv grave, precum edem angioneurotic (umflarea feței, umflarea buzelor și gâtului), șoc anafilactic;
- Methemoglobinemie (creșterea anormală a concentrației methemoglobinei în sânge);
- Dureri de cap, amețeli, somnolență, slăbiciune, excitabilitate motorie, pierderea conștiinței, convulsii, trismus (contractia involuntară a mușchilor mandibulei), tremor, tulburări de auz și de vedere, nistagmus (mișcări involuntare ale ochilor), sindrom de „coadă de cal” (paralizia membrelor inferioare, parestezii), paralizia mușchilor respiratorii, bloc motor și senzitiv;
- reparația durerii, anestezie persistentă, temperatura corpului scăzută, reacții la locul injectării;
- Leșin, scăderea sau dereglarea ritmului cardiac, dureri în cutia toracică;
- Tensiune arterială crescută sau scăzută, dilatarea vaselor periferice;
- Greață, vomă, encoprezis (defecație involuntară);
- Urinare involuntară;

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Novocain-Zdorovie

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra în ambalajul original, la temperatura 25 °C.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații Ce conține Novocain-Zdorovie

- Substanța activă este: clorhidratul de procaină.

1 ml soluție injectabilă conține clorhidratul de procaină 5 mg.

- Celelalte componente sunt: acid clorhidric, apă pentru injecții

Cum arată Novocain-Zdorovie și conținutul ambalajului

Soluție injectabilă.

Soluție incoloră transparentă.

Câte 2 ml în fiole din sticlă. Câte 10 fiole de 2 ml în cutie de carton; sau câte 5 fiole sau 10 fiole în blister din PVC sau PVC-Al și câte 1 blister (N10x1) sau 2 blistere (N5x2) în cutie din carton.

Câte 5 ml în fiole din sticlă. Câte 10 fiole de 5 ml în cutie de carton; sau câte 5 fiole în blister din PVC sau PVC-Al și câte 2 blistere (N5x2) în cutie din carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Compania farmaceutică «Zdorovie» S.R.L., Ucraina 61013, or. Harkov, str. Șevcenko, 22.

Fabricantul

Compania farmaceutică «Zdorovie» S.R.L., Ucraina 61013, or. Harkov, str. Șevcenko, 22.

Acest prospect a fost aprobat în iulie 2024.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md> .

Următoarele informații sunt destinate numai profesioniștilor din domeniul sănătății:

Doze și mod de administrare

Pentru anestezia locală doza preparatului depinde de concentrație, caracterul intervenției chirurgicale, modul de administrare, starea și vârsta pacientului.

Adulți

În blocajul paraneural în țesutul celulo-adipos, se administrează 50-70 ml soluție Novocain-Zdorovie 0,5% (5 mg/ml).

Pentru anestezia prin infiltrație se utilizează următoarele doze maxime: doza pentru prima administrare la debutul intervenției chirurgicale – nu mai mult de 0,75 g (150 ml soluție procaină 0,5%). Ulterior - nu mai mult de 2 g (400 ml soluție procaină 0,5%) pe parcursul fiecărei ore a intervenției chirurgicale.

Copii și adolescenți Este contraindicat.

Atenționări și precauții speciale de utilizare

La efectuarea anesteziei locale, pentru reducerea absorbției și prelungirea duratei de acțiune, la soluția Novocain-Zdorovie se adaugă soluție epinefrină clorhidrat (0,1%) - câte 1 picătură la 2, la 5 sau la 10 ml preparat.

Pentru prevenirea reacțiilor adverse se recomandă efectuarea preliminară a probei la sensibilitate la preparat. Edemul și hiperemia la locul administrării denotă o reacție pozitivă. În acest caz soluția de procaină nu se administrează.

La administrarea preparatului este necesară monitorizarea funcției sistemului cardiovascular, respirator și sistemului nervos central. Se recomandă administrarea cu precauție la pacienții cu maladii cardiace severe (bloc cardiac, tulburarea ritmului cardiac, în special bradicardie), maladii hepatice și renale severe, anamneză alergologică agravată.

În anestezie locală la administrarea în aceeași doză toxicitatea preparatului crește odată cu majorarea concentrației. Odată cu majorarea concentrației preparatului se recomandă reducerea dozei generale sau diluarea până la concentrații mai mici (cu soluție sterilă clorură de sodiu 0,9%). Se recomandă administrarea cu precauție în stările însoțite de reducerea fluxului sanguin renal, în insuficiența cardiacă progresivă (de obicei după bloc cardiac și șoc), în afecțiuni inflamatorii, deficit de pseudocolinesterază, în insuficiență renală, la pacienții vârstnici (cu vârsta peste 65 ani), pacienții aflați în stare gravă, astenizați, în timpul sarcinii, travaliului și în perioada de lactație.

Supradozaj

Supradozajul este posibil numai la administrarea soluției Novocain-Zdorovie în doze mari.

Simptome: paliditatea tegumentelor și mucoaselor, vertij, greață, vomă, hiperexcitabilitate nervoasă, transpirații reci, tahicardie, hipotensiune arterială până la colaps, tremor, convulsii, apnee, methemoglobinemie, deprimarea respirației, colaps cardiovascular. Acțiunea asupra sistemului nervos central se manifestă prin anxietate, halucinații, convulsii, excitație motorie. În caz de supradozaj, este necesară sistarea imediată a administrării preparatului. În caz de supradozaj, la efectuarea anesteziei locale se recomandă injectarea adrenalinei în locul administrării preparatului.

Tratament:

Se efectuează măsuri generale de resuscitare, care includ oxigenoterapie, la necesitate - ventilație pulmonară artificială. Dacă convulsiile durează mai mult de 15-20 secunde, se administrează intravenos tiopental (100-150 mg) sau diazepam (5-20 mg). În hipotensiune arterială și/sau depresia

miocardului se administrează intravenos efedrină (15-30 mg), în cazuri grave – terapie simptomatică și de dezintoxicare.

În cazul dezvoltării intoxicației după administrarea preparatului în mușchii membrelor superioare sau inferioare se recomandă aplicarea imediată a garoului în scopul reducerii absorbției preparatului în circuitul sistemic.