

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

TIVORTIN ASPARTAT 200 mg/ml soluție orală

Aspartat de L-arginină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacție adversă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este TIVORTIN ASPARTAT și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați TIVORTIN ASPARTAT
3. Cum să utilizați TIVORTIN ASPARTAT
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează TIVORTIN ASPARTAT
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este TIVORTIN ASPARTAT și pentru ce se utilizează

TIVORTIN ASPARTAT conține aspartat de L-arginină, care este un aminoacid (component, folosit pentru formarea proteinelor). Medicamentul în organism se transformă într-o substanță activă, numită oxid nitric. Ca donator al oxidului nitric, TIVORTIN ASPARTAT participă la procesele de asigurare cu energie a organismului, contribuie la dilatarea vaselor sanguine pentru îmbunătățirea circulației sanguine, protejează celulele, are un rol important în procesele de neutralizare a amoniacului și stimularea eliminării lui din organism, intensifică funcția dezintoxicantă a ficatului, stimulează activitatea timusului (glandă endocrină, așezată în partea superioară a toracelui, care influențează creșterea organismului în primii ani ai copilăriei și imunitatea), contribuie la sinteza insulinei și reglează conținutul glucozei în sânge în timpul efortului fizic.

TIVORTIN ASPARTAT este utilizat în tratamentul complex al:

- afecțiunilor vaselor sanguine (ateroscleroză vasculară cerebrală, hipertensiune arterială, ateroscleroza vaselor periferice,);
- afecțiunilor plămânilor (afecțiuni pulmonare obstructive cronice, hipertensiune pulmonară);
- stărilor de oboseală pronunțată (stări astenice);
- nivelului crescut de colesterol (hipercolesterolemie).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați TIVORTIN ASPARTAT

Nu utilizați TIVORTIN ASPARTAT:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la aspartat de L-arginină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- dacă aveți probleme grave cu rinichii;
- dacă ați suportat un atac de cord (infarct miocardic).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Spuneți medicului dumneavoastră, dacă:

- aveți probleme cu rinichii;
- aveți probleme cu inima (angină pectorală).

Pe durata utilizării medicamentului trebuie să mențineți un regim echilibrat al somnului și odihnei, să vă abțineți de la consumul alcoolului, nicotinei și psihostimulamentelor.

Dacă în timpul utilizării medicamentului se intensifică simptomele oboselii, întrerupeți tratamentul și adresați-vă la medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră poate să vă efectueze teste sanguine pentru a verifica lucrul rinichilor sau a altor indici.

Copii

Nu se utilizează la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

TIVORTIN ASPARTAT împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv eliberate fără prescripție medicală.

Spuneți medicului dumneavoastră în special dacă utilizați:

- aminofilină (medicament utilizat în caz de afecțiuni ale bronhiilor și plămânilor cu dificultăți de respirație), deoarece la utilizarea împreună cu TIVORTIN ASPARTAT poate crește concentrația insulinei în sânge;
- spironolactonă (medicament utilizat pentru intensificarea eliminării lichidului din organism), deoarece poate creșterea nivelului de potasiu în sânge.

TIVORTIN ASPARTAT împreună cu alimente și băuturi

TIVORTIN ASPARTAT se utilizează în timpul mesei.

Pe durata tratamentului cu TIVORTIN ASPARTAT se va evita consumul de băuturi alcoolice.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a vi se administra acest medicament.

Utilizarea TIVORTIN ASPARTAT în sarcină se va efectua numai la indicarea medicului, dacă el consideră că beneficiul scontat pentru mamă prevalează riscul potențial pentru făt.

Date privind administrarea medicamentului în perioada de alăptare lipsesc.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu influențează asupra capacității de conducere a autovehiculelor sau de manevrare a utilajului.

Informație importantă privind unele componente ale TIVORTIN ASPARTAT:

TIVORTIN ASPARTAT conține sorbitol (E420). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

TIVORTIN ASPARTAT conține metilhidroxibenzoat (E218) și propilhidroxibenzoat (E216). Poate provoca reacții alergice (chiar întârziate).

TIVORTIN ASPARTAT conține mai puțin de 0,02 mmol (0,45 mg)/doză (5 ml) sodiu, adică practic „nu conține sodiu”.

3. Cum să utilizați TIVORTIN ASPARTAT

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Administrare orală, în timpul mesei.

Adulților în ateroscleroză vasculară cerebrală, ateroscleroza vaselor periferice se indică câte 5 ml (1 linguriță dozatoare – 1 g medicament) de 3-8 ori pe zi.

În hipercolesterolemie, hipertensiune arterială – câte 5 ml de 3-6 ori pe zi.

În afecțiuni pulmonare obstructive cronice, hipertensiune pulmonară – câte 5 ml de 3-6 ori pe zi.

În stări astenice – câte 5 ml de 4-8 ori pe zi.

Doza zilnică maximă – 8 g.

Durata curei de tratament – 8-15 zile; la necesitate cura de tratament se repetă.

Copii

Nu se utilizează la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

Dacă utilizați mai mult TIVORTIN ASPARTAT decât trebuie

Dacă utilizați TIVORTIN ASPARTAT mai mult decât trebuie, apar reacții de hipersensibilitate, stări hipoglicemice (scăderea valorii zahărului în sânge cu senzație puternică de foame, amețeli, dureri de cap, somnolență, tremor). Dacă apar astfel de simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați TIVORTIN ASPARTAT

Dacă ați uitat să luați o doză, luați medicamentul imediat ce vă amintiți. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, luați-o doar pe aceasta.

Este important să nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați TIVORTIN ASPARTAT

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apar aceste reacții adverse, opriți utilizarea medicamentului și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:

- reacții alergice, manifestate prin febră, erupții cutanate, dificultăți de respirație (bronhospasm), transpirație, dureri de cap, scăderea tensiunii arteriale.

Alte reacții adverse, care pot apărea pe durata tratamentului:

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 pacienți):

- senzație de disconfort ușor în stomac și intestin, greață nemijlocit după utilizarea medicamentului, care dispare de sine stătător.

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

- dureri articulare;
- valori crescute ale potasiului în sânge (hiperkaliemie).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează TIVORTIN ASPARTAT

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 30 °C, în ambalajul original.

A nu se congela.

După prima deschidere a flaconului a se consuma timp de cel mult 14 zile.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține TIVORTIN ASPARTAT

Substanța activă este aspartat de L-arginină. 1 ml soluție orală conține aspartat de L-arginină 200 mg.

Celelalte componente sunt: sorbitol (E420), zaharină sodică (E954), metilhidroxibenzoat (E218), propilhidroxibenzoat (E216), aromă alimentară Caramel, apă pentru injecții.

Cum arată TIVORTIN ASPARTAT și conținutul ambalajului

TIVORTIN ASPARTAT se prezintă sub formă de soluție transparentă, ușor opalescentă, gălbuie, cu aromă de caramelă.

TIVORTIN ASPARTAT este disponibil în cutii cu 1 flacon a câte 100 ml și 200 ml soluție orală în set cu linguriță dozatoare.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SRL „Iuria-Farm”, Ucraina.

str. N. Amosov, 10, 03680, Kiev.

Fabricantul

SRL „Iuria-Farm”, Ucraina.

str. Kobzarskaya 108, 18030, Cerhassy, reg. Cerhassy.

Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2025.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>