

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Zeloxim Fort 15 mg comprimate

Meloxicam

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Zeloxim Fort și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zeloxim Fort
3. Cum să utilizați Zeloxim Fort
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Zeloxim Fort
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Zeloxim Fort și pentru ce se utilizează

Zeloxim Fort, conține ca substanță activă, meloxicam. Meloxicamul aparține grupului de medicamente denumite antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), care sunt utilizate pentru reducerea inflamației și a durerii de la nivelul articulațiilor și mușchilor.

Zeloxim Fort, este utilizat în:

- tratamentul simptomatic pe termen scurt al crizelor acute de osteoartrită,
- tratamentul simptomatic pe termen lung al poliartritei reumatoide,
- tratamentul simptomatic pe termen lung al spondilitei anchilozante (cunoscută ca boala Bechterew).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Zeloxim Fort

Nu utilizați Zeloxim Fort în următoarele situații:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la meloxicam sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă sunteți copil sau adolescent și aveți vârsta sub 16 ani;
- dacă sunteți gravidă, planificați să rămâneți gravidă sau alăptați;
- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la acid acetilsalicilic sau la alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS);
- dacă după utilizarea acidului acetilsalicilic sau a altor medicamente antiinflamatoare nesteroidiene ați avut vreunul dintre următoarele semne:
 - respirație șuierătoare, apăsare în piept, senzație de lipsă de aer (astm bronșic);
 - obstrucție la nivelul nasului datorită inflamației mucoasei nazale (polipi nazali);
 - erupții trecătoare pe piele sau urticarie;
 - apariția bruscă a tumefacțiilor la nivelul pielii sau mucoaselor, cum este tumefacția din jurul ochilor, feței, buzelor, gurii și gâtului, putând determina dificultăți în respirație (edem angioneurotic);

- dacă după un tratament anterior cu AINS sau dacă ați avut recent:
- sângerări la nivelul stomacului sau intestinului
- perforații la nivelul stomacului sau intestinului.
- ulcer sau sângerări la nivelul stomacului sau intestinului;
- dacă ați avut sângerări recente la nivelul creierului (sângerări cerebrovasculare);
- dacă aveți insuficiență hepatică gravă;
- dacă aveți insuficiență renală gravă netratată prin dializă;
- dacă aveți insuficiență cardiacă gravă;
- dacă aveți intoleranță la unele categorii de glucide, deoarece acest produs conține lactoză (vezi și „Zeloxim Fort conține lactoză”).

Vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur că vreuna dintre aceste situații vi se potrivește dumneavoastră.

Atenționări și precauții

Atenționări

Medicamente precum Zeloxim Fort se pot asocia cu un risc ușor crescut de apariție a atacului de cord („infarct miocardic”) sau a accidentului vascular cerebral (apoplexie). Riscurile de orice tip sunt mai probabile la doze mari și în cazul tratamentului de lungă durată. Nu depășiți doza și durata recomandate pentru tratament. Nu luați Zeloxim Fort mai mult timp decât vă este recomandat (vezi pct. 3 „Cum să luați Zeloxim Fort”).

Dacă aveți probleme cardiace, accident vascular cerebral în antecedente sau considerați că ați putea fi în situație de risc din cauza acestor afecțiuni, trebuie să discutați despre tratament cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul. De exemplu:

- dacă aveți tensiunea sanguină crescută (hipertensiune arterială),
- dacă aveți valori crescute ale zahărului în sânge (diabet zaharat),
- dacă aveți valori crescute ale colesterolului (hipercolesterolemie),
- sunteți fumător.

Întrerupeți tratamentul cu Zeloxim Fort imediat ce observați sângerări (care determină scaune de culoare neagră) sau ulceratii la nivel digestiv (determinând dureri abdominale).

La administrarea de Zeloxim Fort au fost raportate erupții cutanate (sindromul Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică) care pot pune viața în pericol, inițial sub forma apariției de pete-țintă roșii sau a apariției pe trunchi de pete circulare cu vezicule centrale. Apariția de ulcere/ulcerații în gură, în gât, nas în regiunea genitală sau de conjunctivite (ochi roșii și umflați) sunt semne suplimentare pentru includere.

Aceste erupții cutanate care pot pune viața în pericol sunt adesea însoțite de simptome asemănătoare gripei. Erupția poate progresa până la apariția de bășici pe scară largă sau descuamarea pielii.

Cel mai mare risc de apariție a reacțiilor cutanate grave este în primele săptămâni de tratament.

Dacă ați dezvoltat sindrom Stevens-Johnson sau necroliză epidermică toxică, la utilizarea de Zeloxim Fort, nu mai trebuie reluat tratamentul cu Zeloxim Fort în niciun moment/caz.

Dacă vă apare o erupție cutanată sau astfel de simptome cutanate, întrerupeți administrarea Zeloxim Fort, cereți urgent sfatul unui medic și spuneți-i că luați acest medicament.

Zeloxim Fort nu este indicat dacă aveți nevoie de un tratament imediat pentru o durere acută.

Zeloxim Fort poate masca simptomele unei infecții (de exemplu febra). Dacă aveți impresia că ați putea avea o infecție, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

Precauții pentru utilizare

Deoarece este posibil să fie necesară modificarea tratamentului, este important să cereți sfatul medicului dumneavoastră înainte de a lua Zeloxim Fort comprimate:

- dacă ați avut vreo inflamație a faringelui (faringită), a stomacului (gastrită) sau vreo altă afecțiune a tractului digestiv în antecedente, de exemplu, boala Crohn sau colită ulcerativă,
- dacă aveți tensiune crescută (hipertensiune arterială),
- dacă sunteți în vârstă,
- dacă aveți boli de inimă, ficat sau rinichi,
- dacă aveți valori crescute de zahăr în sânge (diabet zaharat),
- dacă aveți volumul sanguin redus (hipovolemie), situație care poate să apară dacă aveți o pierdere importantă de sânge, o arsură, o operație chirurgicală sau consumați puține lichide,
- dacă aveți intoleranță la unele categorii de glucide, diagnosticată de medicul dumneavoastră, deoarece acest produs conține lactoză,
- dacă aveți valori crescute ale potasiului în sânge, diagnosticate anterior de către medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră va trebui să monitorizeze evoluția dumneavoastră pe durata tratamentului.

Zeloxim Fort împreună cu alte medicamente

Deoarece Zeloxim Fort poate influența sau poate fi influențat de utilizarea altor medicamente, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

În special, trebuie să-l informați pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist dacă ați utilizat sau utilizați vreunul dintre următoarele medicamente:

- alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), inclusiv acid acetilsalicilic,
- medicamente care previn formarea cheagurilor de sânge (anticoagulante), cum ar fi warfarina,
- medicamente care dizolvă cheagurile de sânge (tromboliticele),
- medicamente care tratează afecțiunile inimii și ale rinichilor,
- corticosteroizi (de exemplu care tratează o inflamație sau reacțiile alergice),
- ciclosporina - medicament utilizat după transplantul de organ sau pentru afecțiuni grave ale pielii, poliartrită reumatoidă sau sindrom nefrotic,
- oricare dintre medicamentele diuretice (utilizate pentru eliminarea apei din organism)

Medicul dumneavoastră s-ar putea să vă efectueze teste pentru urmărirea funcției rinichiului în cazul în care utilizați diuretice.

- medicamente utilizate pentru tratamentul hipertensiunii arteriale,
 - litiu - medicament utilizat pentru tratamentul tulburărilor de dispoziție,
 - inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS) - medicamente utilizate pentru tratamentul depresiei,
 - metotrexat - medicament utilizat pentru tratamentul cancerului sau afecțiunilor severe ale pielii necontrolate terapeutic și acutizărilor poliartritei reumatoide,
 - pemetrexed – medicament utilizat pentru tratamentul cancerului,
 - colestiramina - medicament utilizat pentru scăderea valorilor colesterolului din sânge,
 - antidiabetice orale (sulfonilureice, nateglinidă) – utilizate pentru tratamentul diabetului.
- Medicul dumneavoastră s-ar putea să vă efectueze teste ale glicemiei pentru a monitoriza riscul hipoglicemiei.

Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți nelămuriri legate de utilizarea medicamentelor.

Sarcina

Dacă rămâneți însărcinată în timp ce urmați un tratament cu Zeloxim Fort, trebuie să vă informați medicul.

În timpul primelor 6 luni de sarcină, medicul dumneavoastră vă poate prescrie anume acest medicament dacă este necesar.

În timpul ultimelor trei luni de sarcină, nu utilizați acest medicament, deoarece Zeloxim Fort poate afecta grav copilul dumneavoastră, în special prin efecte la nivel cardiopulmonar și renal, chiar după o singură doză.

Alăptarea

Acest medicament **nu** este recomandat mamelor care alăptează.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Fertilitatea

Dacă intenționați să rămâneți gravidă, Zeloxim Fort poate împiedica aceasta. Trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă intenționați să rămâneți gravidă sau aveți probleme în a rămâne gravidă.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

În timpul tratamentului cu acest medicament pot să apară tulburări de vedere, inclusiv vedere încețoșată, amețeli, somnolență, vertij sau alte tulburări la nivelul sistemului nervos central. Dacă apar astfel de manifestări **nu** conduceți și nu folosiți utilaje.

Zeloxim Fort conține lactoză.

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Zeloxim Fort conține sodiu.

Zeloxim Fort conține sodiu 30 mg pe doză .Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții ce urmează o dietă cu restricție de sodiu.

3. Cum să utilizați Zeloxim Fort

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este:

Acutizări ale osteoartritei

7,5 mg pe zi (o jumătate de comprimat) o dată pe zi. Doza poate fi crescută la 15 mg (un comprimat) o dată pe zi.

Poliartrită reumatoidă

15 mg pe zi (un comprimat) o dată pe zi. Doza poate fi scăzută la 7,5 mg (o jumătate de comprimat) pe zi.

Spondilită anchilozantă

15 mg pe zi (un comprimat) o dată pe zi. Doza poate fi scăzută la 7,5 mg (o jumătate de comprimat) pe zi. Comprimatele trebuie înghițite cu apă sau alt lichid, împreună cu alimente.

Comprimatele pot fi divizate în două doze egale.

Nu trebuie să depășiți doza zilnică maximă recomandată de 15 mg.

Dacă vă încadrați în vreo situație menționată la capitolul „**Atenționări și precauții**”, medicul dumneavoastră vă va reduce doza la 7,5 mg (o jumătate de comprimat) o dată pe zi.

Zeloxim Fort nu trebuie administrat la copii și adolescenți cu vârsta sub 16 ani.

Dacă aveți impresia că efectul Zeloxim Fort este prea puternic sau prea slab sau dacă după câteva zile nu simțiți nici o ameliorare a stării dumneavoastră, informați-l pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist.

Dacă utilizați mai mult Zeloxim Fort decât trebuie

Dacă ați luat prea multe comprimate sau bănuți un supradozaj, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau mergeți imediat la cel mai apropiat spital.

Simptomele după supradozajul acut cu antiinflamatoare nesteroidiene sunt în general limitate la:

- lipsă de energie (letargie),
- somnolență,
- senzație de rău (greață) și vărsături,
- durere în zona stomacului (durere epigastrică).

În general, aceste simptome sunt ameliorate dacă întrerupeți utilizarea Zeloxim Fort. Puteți avea sângerări la nivelul stomacului sau intestinelor (hemoragie gastro-intestinală).

Supradozajul grav poate determina reacții adverse grave (vezi pct. 4):

- creșterea tensiunii arteriale (hipertensiune arterială),
- insuficiență renală acută,
- insuficiență hepatică,
- reducerea/aplatizarea amplitudinii respirației sau oprirea respirației (depresie respiratorie),
- pierderea conștienței (comă),
- atacuri (convulsii),
- colaps al circulației sângelui (colaps cardiovascular),
- oprirea inimii (stop cardiac),
- reacții alergice de tip imediat (de hipersensibilitate), incluzând:
 - leșin,
 - scurtarea respirației,
 - reacții pe piele.

Dacă uitați să utilizați Zeloxim Fort

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luați doza următoare ca de obicei.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Nu mai luați Zeloxim Fort și consultați un medic sau mergeți la cel mai apropiat spital, dacă observați:

Orice reacție alergică (hipersensibilitate), care poate apare sub formă de:

- reacții pe piele, cum ar fi mâncărime (prurit), veziculație sau descuamare a pielii, care pot fi reacții cutanate care pot pune viața în pericol (sindrom Steven-Johnson, necroliză epidermică toxică), leziuni ale țesuturilor moi (leziuni ale mucoaselor) sau eriteme multiforme (vezi punctul 2).

Eritemul multiform este o reacție alergică gravă a pielii care produce pete, urme roșii sau purpurii sau zone acoperite cu vezicule. Poate afecta de asemenea gura, ochii sau alte suprafețe ale corpului.

- tumefacție a pielii sau a mucoaselor, cum ar fi tumefacții la nivelul ochilor, feței sau buzelor, gurii sau gâtului, care pot să determine dificultăți în respirație, tumefacția încheieturilor sau a picioarelor (edem al extremităților membrelor)
- scurtarea amplitudinii respirației sau crize de astm bronșic
- inflamare a ficatului (hepatită). Aceasta poate produce simptome cum ar fi:
 - îngălbenire a pielii sau a globilor oculari (icter/gălbănare),
 - durere în abdomen,
 - pierdere a apetitului alimentar.

Orice reacție adversă la nivelul tubului digestiv, în special:

- sângerare (care produce scaune de culoare neagră),
- ulcerarea la nivelul tubului digestiv (care produce durere abdominală).

Sângerările la nivelul tractului digestiv (hemoragie gastro-intestinală), formarea de ulcere sau formarea unui orificiu în peretele tubului digestiv (perforație) pot fi uneori grave și pot avea potențial letal, în special la vârstnici.

Dacă anterior ați suferit de orice simptom la nivelul tractului digestiv, datorită utilizării de AINS pe termen lung, solicitați imediat un consult medical, în special dacă sunteți în vârstă. Medicul dumneavoastră vă poate urmări evoluția pe parcursul tratamentului.

Reacții adverse generale ale medicamentelor antiinflamatoare (AINS)

Utilizarea unor medicamente anti-inflamatoare (AINS) poate fi asociată cu o mică creștere a riscului de obturare a arterelor (evenimente arteriale trombotice), de exemplu atac cardiac (infarct miocardic) sau atac (apoplexie), în particular la doze mari și după o perioadă lungă de tratament.

Asociat tratamentului cu AINS, s-au raportat retenție de fluide (edeme), creștere a presiunii sanguine (hipertensiune arterială) și atac cardiac (insuficiență cardiacă).

Cel mai frecvent observate reacții adverse afectează tubul digestiv (manifestări gastro-intestinale):

- ulcere ale stomacului și a părții superioare a intestinului subțire (ulcer peptic/gastroduodenal)
- un orificiu în peretele intestinului (perforație) sau sângerări digestive (uneori letale, în special la vârstnici).

După administrare de AINS, au fost raportate următoarele reacții adverse:

- senzație de rău (greață) și vărsături,
- pierdere de scaune (diaree),
- flatulență,
- constipație,
- indigestie (dispepsie),
- durere abdominală,
- scaune de culoarea păcurii datorită unei sângerări a tubului digestiv (melenă),
- vărsături cu sânge (hematemeză),
- inflamație cu producere de ulcere în gură (stomatite ulcerative),
- înrăutățire a inflamației tubului digestiv (exacerbare a colitei sau a bolii Crohn)

Mai puțin frecvent, au fost observate inflamații ale stomacului (gastrită).

Reacții adverse ale meloxicamului – substanța activă a Zeloxim Fort

Foarte frecvente: afectează până la 1 din 10 utilizatori

- reacții adverse gastro-intestinale ca de exemplu indigestie (dispepsie), senzație de rău (greață) și vărsături, durere abdominală, constipație, flatulență, pierdere de scaune (diaree).

Frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 100

- dureri de cap.

Mai puțin frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000

- amețeli (pierdere ușoară a cunoștinței)
- senzație de amețală sau de învârtire (vertij)
- somnolență
- anemie (scădere a concentrației pigmentului celulelor roșii hemoglobină)
- creștere a presiunii sanguine (hipertensiune arterială)
- îmbujorare (înroșire temporară a feței și a gâtului)
- retenție de sodiu și de apă
- creșterea concentrațiilor de potasiu (hiperkaliemie). Aceasta poate conduce la simptome cum ar fi:
 - modificări ale ritmului bătăilor inimii (aritmie)
 - palpitații (când simțiți bătăile inimii mai puternic decât de obicei)
 - slăbiciune musculară
 - eructații
 - inflamare a stomacului (gastrită)
 - sângerare la nivelul tubului digestiv
 - inflamație la nivelul gurii (stomatită)
 - reacții alergice imediate (de hipersensibilitate)
 - mâncărime (prurit)
 - erupție pe piele
 - tumefacții datorate retenției de apă/lichide (edem), inclusiv tumefacție a încheieturilor/picioarelor (edeme ale extremităților membrelor)
 - tumefacție bruscă a pielii sau a mucoasei, cum ar fi tumefacții la nivelul ochilor, feței, buzelor, gurii sau pieptului, care pot să determine dificultăți în respirație (edem angioneurotic)
 - tulburări pasagere ale testelor funcției hepatice (de exemplu creștere a valorilor enzimelor ficatului, transaminazele sau o creștere a valorilor pigmentului biliar bilirubina). Medicul dumneavoastră poate determina aceasta cu ajutorul unor teste de sânge.
 - modificări ale testelor de laborator care investighează funcția rinichilor (renală) (de exemplu creștere a valorilor creatininei sau ale ureei)

Rare: afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000

- modificări de dispoziție
- coșmaruri
- valori anormale ale testelor de sânge
 - valori anormale ale diferitelor componente din sânge
 - scăderea numărului celulelor albe din sânge (leucocitopenie)
 - scăderea numărului plachetelor sanguine (trombocitopenie)

Acest reacții adverse pot conduce la o creștere a riscului de apariție a infecțiilor și a unor simptome, cum ar fi vânătași sau sângerare a nasului

- sunete în urechi (tinitus)
- simțiți bătăile inimii mai puternic decât de obicei (palpitații)
- ulcere ale stomacului sau ale părților superioare ale intestinului subțire (ulcere peptice/gastro- duodenale)
- inflamații ale esofagului (esofagită)
- crize de astm bronșic (la persoane care sunt alergice la acid acetilsalicilic sau alte AINS)
- veziculație severă a pielii sau descuamarea pielii (sindrom Steven-Johnson sau necroliză epidermică toxică)
- urticarie
- tulburări vizuale, inclusiv:
 - vedere încețoșată

- conjunctivită (inflamația globilor oculari sau a pleoapelor)
- inflamare a intestinului gros (colită)

Foarte rare: afectează mai puțin de 1 utilizator din 10000

- reacții de acoperire cu vezicule a pielii (reacții buloase) și eritem multiform
- Eritemul multiform este o reacție alergică gravă, care produce pete, umflături roșii sau purpurii sau zone acoperite cu vezicule. Pot afecta de asemenea gura, ochii sau alte părți moi ale corpului.
- inflamare a ficatului (hepatită). Aceasta poate produce simptome cum ar fi:
 - îngălbenire a pielii sau a globilor oculari (icter/gălbănare)
 - durere a abdomenului
 - pierdere a apetitului alimentar
 - insuficiență acută a rinichilor (insuficiență renală), în special la pacienții cu factori de risc, cum ar fi boli de inimă, diabet sau boli ale rinichiului
 - un orificiu în peretele intestinelor (perforație)

Cu frecvență necunoscută: frecvența nu poate estimată din datele disponibile

- confuzie
- dezorientare
- scurtare a amplitudinii respirației și reacții ale pielii (reacții anafilactice/reacții anafilactoid),
- erupții cutanate produse de expunere la lumina solară (reacții de fotosensibilitate)
- insuficiență a inimii (insuficiență cardiacă) a fost raportată în asociere cu tratamentul cu AINS
- pierdere completă a unor tipuri specifice de celule albe din sânge (agranulocitoză), în special la pacienți care iau Zelixim Fort împreună cu alte medicamente care au potențial inhibitor, depresiv sau distructiv asupra măduvei osoase (medicamente mielotoxice). Acestea pot produce:
 - febră subită
 - durere în gât
 - infecții
- pancreatită (inflamație a pancreasului)
- infertilitate a femeilor, ovulație întârziată.

Reacții adverse produse de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), dar care încă nu au fost raportate după administrarea de Zelixim Fort

Modificări ale structurii rinichiului, care produc insuficiență acută a rinichiului:

- foarte rare cazuri de inflamație a rinichiului (nefrită interstițială)
- moarte a unor celule din structura rinichiului (necroză tubulară sau papilară acută)
- proteine în urină (sindrom nefrotic cu proteinurie).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Zelixim Fort

Nu lăsați acest medicament la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, cutie sau blister, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul dumneavoastră cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Zelixim Fort :

- Substanța activă este meloxicam. Fiecare comprimat conține meloxicam 15 mg.
- Celelalte componente sunt: citrat de sodiu dehidrat, lactoză monohidrat, celuloză microcristalină (Avicel PH 102), polividonă (Kollidon 25), dioxid de siliciu coloidal anhidru (Aerosil 200), crospovidonă (Kollidon CL), stearat de magneziu.

Cum arată Zelixim Fort și conținutul ambalajului

Zelixim Fort 15 mg se prezintă sub formă de comprimate rotunde, de culoare galben-deschisă, cu incizie pe o parte. Ambele părți ale inciziei sunt gravate cu inscripția "1N".

Este disponibil câte 10 comprimate în blister din Al-PVC/LDPE/PVDC, în cutie de carton împreună cu prospectul pentru pacient.

Deținătorul certificatului de înregistrare și Fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Cad.
No: 184 34440 Beyoğlu/Istanbul/
Turcia

Fabricantul

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
GOSB 1900 Sokak, No: 1904
41480 Gebze Kocaeli/
Turcia

Acest prospect a fost revizuit în octombrie 2024

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>