

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

IOD-MC 50 mg/ml soluție cutanată

Iod

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Iod-MC și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Iod-MC
3. Cum să luați Iod-MC
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Iod-MC
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Iod-MC și pentru ce se utilizează

Iodul elementar are proprietăți antimicrobiene pronunțate. Iodul acționează ca un agent germicid puternic cu spectru larg, prin distrugerea și penetrarea pereților celulari ai organismelor. Preparatele pe bază de iod elementar se caracterizează printr-un efect iritant local pronunțat asupra țesuturilor, iar în concentrații ridicate - efect cauterizant. Acțiunea locală este cauzată de capacitatea iodului elementar de a precipita proteinele tisulare. Preparatele, care detașează iodul elementar, au un efect iritant mult mai puțin pronunțat, iar iodurile au proprietăți iritante locale numai în concentrații foarte mari.

Iod-MC se utilizează pentru uz extern. Antiseptic pentru dezinfectarea pielii intacte înainte de intervenții chirurgicale minore, injecții, puncții sau recoltări.

Poate fi utilizat și pentru tratarea locală a infecțiilor cutanate superficiale (de exemplu, tăieturi minore, zgârieturi, înțepături).

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Iod -MC

Nu utilizați Iod -MC

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la alte componente ale medicamentului enumerate la pct. 6,
- dacă aveți hipertiroidism,
- la nou-născut și sugari,
- dacă aveți alte tulburări acute ale funcției glandei tiroide,
- dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Atenționări și precauții

Utilizarea pe termen scurt și pe suprafețe mici este sigură în general. Se evită aplicarea pe piele lezată, arsuri extinse, mucoase. Se evită utilizarea repetată la sugari, femei însărcinate sau persoane cu afecțiuni tiroidiene. Se monitorizează funcția tiroidiană dacă expunerea este prelungită.

Copii

Nu utilizați acest medicament la nou-născuți și sugari la nou-născuți și sugari sub 6 luni

Iod-MC împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Efectul tratamentului poate fi modificat dacă iod este utilizat în același timp cu alte medicamente.

Utilizarea asociată de iod cu preparate enzimatice pentru prelucrarea plăgilor, contribuie la scăderea reciprocă a eficacității. Preparatele, care conțin mercur, argint, peroxid de oxigen și tauroridină, pot interacționa cu iod, de aceea nu trebuie administrate concomitent.

Iod-MC împreună cu alimente și băuturi

Iod-MC se utilizează cutanat.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Preparatul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Iod-MC

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul sau asistenta medicală. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul sau cu asistenta medicală dacă nu sunteți sigur.

Mod de utilizare

Administrare cutanată.

Se aplică nediluat, de 1–3 ori pe zi, pe zona afectată. Se aplică cutanat, cu ajutorul unei comprese sterile sau a aplicatorului. Nu se utilizează pe mucoase sau în cavități ale corpului.

Se evită acoperirea cu pansamente ocluzive fără indicație medicală.

Dacă luați mai mult Iod-MC decât trebuie

Nu sunt relatate cazuri de supradozare la utilizare cutanată.

Dacă uitați să luați Iod-MC

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă încetați să luați Iod-MC

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 utilizatori)

Iritație locală, prurit, uscăciune cutanată

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 utilizatori)

Dermatită de contact

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 utilizatori)

Hipertiroidism

Reacții adverse cu frecvență necunoscută

Hipotiroidism

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse posibile nemenționate în acest prospect. Puteți raporta, de asemenea, reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, disponibil pe site-ul AMDM la următoarea adresă web: www.amdm.gov.md sau prin e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Prin raportarea efectelor adverse veți ajuta la furnizarea mai multor informații cu privire la siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Iod-MC

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, ferit de lumină.

Nu utilizați Iod-MC după data de expirare înscrisă pe cutie după “Exp:”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Iod-MC

Substanța activă este iod și iodura de potasiu.

1 ml soluție cutanată conține iod 50 mg, iodura de potasiu 20 mg.

Celelalte componente sunt: alcool etilic.

Excipienți cu efect cunoscut: Conține alcool etilic 50%.

Cum arată Iod-MC

Lichid transparent, de culoare brună cu miros caracteristic de iod și alcool etilic.

Este disponibil câte 10 ml, 20 ml în flacon din sticlă sau masă plastică de culoare brună, acoperite cu capac cu/sau fără dop cu picurător. Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton.

Se admite eliberarea flacoanelor însoțite de prospect, fără ambalare în ambalaj secundar.

Deținătorul autorizației de punere pe piață

MC Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova

MD-2037, mun. Chisinău, str. Industrială 59/3

Fabricantul

MC Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova

MD-2037, mun. Chisinău, str. Industrială 59/3

Acest prospect a fost aprobat în octombrie 2025

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>