

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

### Lacto-G capsule

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Lacto-G și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Lacto-G
3. Cum să luați Lacto-G
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Lacto-G
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Lacto-G și pentru ce se utilizează**

Lacto-G este un medicament, care reglează microflora intestinală.

Bifidobacteriile și lactobacilii din componența medicamentului mențin și restabilesc echilibrul fiziologic al microflorei intestinale.

Lacto-G se utilizează în:

- profilaxia și tratamentul tulburărilor echilibrului microflorei intestinale – disbacteriozei (sindromul intestinului iritat);
- disbacterioze la adulți și copii, determinate de administrarea antibioticelor și remediilor chimioterapice;
- diaree, balonarea abdomenului (meteorism), constipații;
- inflamația intestinului (colite și gastroenterocolite acute și cronice).

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să luați Lacto-G**

##### **Nu luați Lacto-G în cazul:**

- dacă aveți alergii (hipersensibilitate) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6).

#### **Atenționări și precauții**

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua Lacto-G.

Copiilor cu vârsta sub 6 ani tratamentul diareei se va efectua sub supravegherea medicului.

Dacă simptomele diareei persistă după 2 zile de tratament, e necesar să vă adresați la medic.

În caz de diaree e necesar să acordați o atenție deosebită restituirii lichidului și sărurilor pierdute.

#### **Lacto-G împreună cu alte medicamente**

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripție medicală.

Nu sunt înregistrate interacțiuni nefavorabile ale Lacto-G cu alte medicamente.  
Pentru sporirea eficacității medicamentului se recomandă de administrat Lacto-G peste 3 ore după administrarea antibioticelor și chimioterapicelor.

### **Lacto-G împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Lacto-G se administrează pe nemâncate sau înainte de luarea mesei, cu o cantitate mică de lichid.  
Pe durata tratamentului nu se recomandă consumul alcoolului.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Lacto-G poate fi utilizat în timpul sarcinii și alăptării conform indicațiilor.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Administrarea de Lacto-G nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

## **3. Cum să luați Lacto-G**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Copiilor cu vârsta sub 2 ani se administrează conținutul unei capsule, amestecat cu o cantitate mică de lichid (suc, apă îndulcită), până la mese.

Copiilor cu vârsta de 2-12 ani se administrează câte 1-2 capsule pe zi până la mese, cu o cantitate mică de lichid.

Adulților și copiilor cu vârsta peste 12 ani se administrează câte 2-3 capsule pe zi pe nemâncate sau până la mese, cu o cantitate mică de lichid.

Durata tratamentului depinde de etiologia disbacteriozei și particularitățile individuale ale organismului.

### **Dacă luați mai mult Lacto-G decât trebuie**

Nu sunt date privind supradozajul cu aceste medicament.

În caz de supradozaj adresați-vă imediat la medic.

### **Dacă uitați să luați Lacto-G**

Dacă ați uitat să luați o doză, luați-o imediat ce vă aduceți aminte. Dacă se apropie momentul următoarei doze, nu luați o doză dublă, ci continuați să administrați medicamentul după cum e recomandat, respectând intervalele obișnuite între prize.

### **Dacă încetați să luați Lacto-G**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Medicamentul, de regulă, este bine tolerat.

La administrarea în doze recomandate reacții adverse nu au fost semnalate.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta

reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau prin e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## 5. Cum se păstrează Lacto-G

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## 6. Conținutul ambalajului și alte informații

### Ce conține Lacto-G

1 capsulă conține:

- *Substanțe active:* nu mai puțin de  $5 \times 10^9$  CFU bacterii vii: *Lactobacillus acidophilus* – nu mai puțin de  $2,5 \times 10^9$  CFU (25 mg), *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium infantis* – cantitatea sumară nu mai puțin de  $2,5 \times 10^9$  CFU (25 mg);
- *Celelalte componente sunt:* fructooligozaharide, maltodextrină de orez.  
Compoziția capsulei: polizaharide.

### Cum arată Lacto-G și conținutul ambalajului

Lacto-G se prezintă sub formă de capsule polizaharidice tari nr.0 cu căpăcel și corp transparente.

*Conținutul capsulei:* pulbere albă cu incluziuni gălbui.

Lacto-G este disponibil în cutii cu 1 blister din PVC/Al a câte 10 capsule.

## Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricanții

### Deținătorul certificatului de înregistrare

GM Pharmaceuticals Ltd.,

Rustavi Highway 52, Tbilisi, 0114, Georgia.

### Fabricanții

GM Pharmaceuticals Ltd.,

Rustavi Highway 52, Tbilisi, 0114, Georgia.

UAS Laboratories LLC, SUA,

555 North 72<sup>nd</sup> Avenue, Wausau, WI 54401.

## Acest prospect a fost revizuit în August 2024.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>