

Prospect: informații pentru consumator/pacient

HEPEEL, comprimate

Medicament homeopat

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă peste 3-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Hepeel și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hepeel
3. Cum să utilizați Hepeel
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Hepeel
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Hepeel și pentru ce se utilizează

Hepeel este un medicament homeopat, care se utilizează ca adjuvant în tratamentul complex al maladiilor cronice ale ficatului și vezicii biliare - hepatite cronice (inflamația cronică a ficatului), ciroză hepatică (maladie gravă care modifică structura ficatului), colelitiază (formarea de calculi biliari), colangită (inflamație a căilor biliare), enterite cronice, colite și dereglări ale microflorei intestinale.

Preparatul este indicat în tratamentul complex al afecțiunilor cutanate acute și cronice - reacții alergice, comedon deschis (puncte negre pe piele), eczeme (boli de piele de origine infecțioase).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hepeel

Nu utilizați Hepeel:

- dacă sunteți alergic la oricare dintre componentele acestui medicament.

Atenționări și precauții

În caz că ați mai avut maladii hepatice, este necesar de consultat medicul.

Dacă cele menționate mai sus sunt valabile în cazul dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza Hepeel.

Copii

Preparatul este indicat copiilor cu vârsta ≥ 12 ani.

Nu există informații clinice privitor la administrarea preparatului copiilor sub 12 ani.

Acest produs medicamentos conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră va spus că aveți tulburări ereditare rare de tipul intoleranței la galactoză, deficiența de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză, nu trebuie să utilizați acest medicament.

Hepeel împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Hepeel nu interacționează cu alte medicamente.

Hepeel împreună cu alimente, băuturi și alcool

Ca și orice medicament homeopat, Hepeel trebuie administrat cu 15-20 minute înainte sau cu 1 oră după mese.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există careva informații despre utilizarea acestui medicament în sarcină sau în perioada de alăptare.

Deoarece concentrația substanțelor prezente în acest medicament este foarte mică, acestea nu sunt toxice în timpul sarcinii și alăptării. Nu au fost raportate careva efecte adverse.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Hepeel nu influențează capacitatea de a conduce vehicule să de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Hepeel

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medical sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Doza standard:

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: 1 comprimat de 3 ori pe zi.

Doza în stadiul acut al maladiei sau în caz de inițiere a tratamentului:

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: câte 1 comprimat la fiecare 0,5-1 ore, până la 12 comprimate pe zi, după care se va continua cu doza standard.

Nu există informații clinice privitor la administrarea produsului copiilor.

Mod de administrare

Este preferabil de a menține comprimatele în gură până la dizolvare. Pentru a fi administrat copiilor, este posibilă sfărâmarea comprimatului și dizolvarea acestuia într-o cantitate mică de apă. Medicamentul trebuie administrat în afara meselor.

Dacă utilizați mai mult Hepeel decât trebuie

Dacă ați utilizat o doză prea mare, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Nu sunt cunoscute cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să utilizați Hepeel

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Hepeel

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După punerea pe piață, în câteva ocazii, au fost raportate următoarele reacții adverse la persoanele care au utilizat Hepeel:

- reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Hepeel

A se păstra la loc uscat, la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați acest medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Hepeel

1 comprimat conține:

Substanțe active :

Chelidonium majus	D4	30 mg
Cinchona pubescens	D3	30 mg
Citrullus colocynthis	D6	90 mg
Lycopodium clavatum	D3	30 mg
Myristica fragrans	D4	30 mg
Phosphorus	D6	15 mg
Silybum marianum	D2	15 mg
Veratrum album	D6	60 mg

Celelalte componente sunt: lactoză, stearat de magneziu.

Cum arată Hepeel și conținutul ambalajului

Hepeel se prezintă sub formă de comprimate rotunde, cu margini rotunjite, de culoare albă până la galben pal, fără miros.

Conținutul ambalajului

Câte 50 de comprimate ambalate în flacon din plastic. Câte 1 flacon, împreună cu prospectul pentru pacient în curție de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**Deținătorul certificatului de înregistrare**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Telefon : 0049 7221 501 00

Fax : 0049 7221 501 485

e-mail : info@heel.com

Fabricantul

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Germania

Acest prospect a fost revizuit în decembrie 2021

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>