

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Pyrantel 250 mg comprimate

Pirantel

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Pyrantel și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Pyrantel
3. Cum să luați Pyrantel
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Pyrantel
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Pyrantel și pentru ce se utilizează

Pyrantel comprimate este un medicament ce conține ca substanță activă pirantel și este indicat în tratamentul de scurtă durată al următoarelor afecțiuni provocate de helminți:

- ascaridoză;
- enterobioză;
- ankilostomiază;
- necatoriază;
- tricostrongiloză.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Pyrantel

Nu luați Pyrantel:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la pamoatul de pirantel sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă aveți insuficiență a funcției ficatului.

Atenționări și precauții

Administrarea preparatului nu necesită pregătire specială sau administrarea laxativelor.

În enterobioză se efectuează tratamentul tuturor persoanelor, care locuiesc împreună.

Pentru tratamentul definitiv este necesară respectarea regulilor de igienă personală, în special la copii și administrarea repetată de Pyrantel peste 3 săptămâni.

Pyrantel împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. Aceasta este necesar deoarece Pyrantel comprimate poate afecta modul în care acționează alte medicamente. De asemenea, alte medicamente pot afecta modul în care acționează Pyrantel comprimate.

Administrarea concomitentă a piperazinei poate diminua eficacitatea pirantelului. Toxicitatea pirantelului crește atunci când este administrat concomitent cu levamisol.

Pyrantel împreună cu alimente, băuturi și alcool

Pyrantel se administrează în orice parte a zilei și indiferent de orarul meselor.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, încercați să rămâneți gravidă sau dacă alăptați.

Sarcina

Nu luați Pyrantel decât dacă v-a recomandat medicul dumneavoastră.

Alăptarea

Nu luați Pyrantel decât dacă v-a recomandat medicul dumneavoastră.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Reacții adverse din partea sistemului nervos, pot fi observate uneori, în timpul tratamentului cu pirantel care poate influența rata de reacție în timpul conducerii și capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Totuși, dacă luați Pyrantel pentru prima dată, trebuie să fiți atent și să observați cum vă afectează tratamentul, înainte de a conduce vehicule sau a folosi utilaje.

3. Cum să luați Pyrantel

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a indicat medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Se administrează pe cale orală o dată pe zi, indiferent de orarul meselor și parte a zilei. Nu se administrează laxative înainte de tratament.

În enterobioză sau enterobioza asociată cu ascaridioza, la adulți și copii se administrează câte 10 mg/kg într-o singură doză sau conform schemei următoare:

<i>Vârsta</i>	<i>Doza preparatului</i>	
Copii cu vârsta de la 3 până la 6 ani	250 mg	1 comprimat
Copii cu vârsta de la 6 până la 12 ani	500 mg	2 comprimate
Copii cu vârsta peste 12 ani și adulți cu masa corporală până la 75 kg	750 mg	3 comprimate
Adulți	1000 mg	4 comprimate

Pentru a preveni reinfestarea se recomandă administrarea repetată peste 3 săptămâni a unei doze de 10 mg/kg/zi.

În ascaridioza izolată se administrează o doză de 5 mg/kg/zi odată.

Dacă luați mai mult Pyrantel decât trebuie

Dacă ați luat sau credeți că ați luat mai mult Pyrantel decât trebuie (supradozaj), spuneți imediat medicului dumneavoastră sau prezentați-vă la cea mai apropiată unitate medicală. Aduceți medicamentele rămase cu dumneavoastră. În caz de supradozaj probabil veți avea următoarele simptome: disfuncție autonomă (lacrimație, inroșirea conjunctivelor, rinoree sau congestie

nazală), spasme musculare, slăbiciune, stare de prostrație și în cele din urmă asfixie din cauza paraliziei musculare.

Dacă uitați să luați Pyrantel

Dacă uitați să luați medicamentul sau ați luat o doză mai mică decât cea recomandată de medicul dumneavoastră nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată; așteptați momentul stabilit pentru administrarea următoarei doze și continuați tratamentul așa cum v-a prescris medicul dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse posibile care pot apărea la utilizare medicamentului Pyrantel sunt descrise mai jos.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- dureri de cap, vertij, somnolență, fatigabilitate;
- creșterea nivelului enzimelor hepatice;
- erupții cutanate.

Reacții adverse cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- epigastralgie (durere localizată în epigastru - zona superioară și mediană a abdomenului), greață, vomă, diaree, lipsa poftei de mâncare (anorexie).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale:

www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Pyrantel

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Pyrantel

Substanța activă este pamoatul de pirantel. Fiecare comprimat conține pamoat de pirantel echivalent cu pirantel 250 mg.

Celelalte componente sunt: povidonă K-30, amidon de porumb, croscarmeloză sodică, celuloză microcristalină, stearat de magneziu, dioxid de siliciu coloidal anhidru.

Cum arată Pyrantel și conținutul ambalajului

Comprimate de culoare galbenă, formă ovală, cu incizie pe o parte a comprimatului.

Blistere a câte 3 comprimate. Câte 1 blister împreună cu prospectul pentru utilizator/pacient în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.
SP-289(A), RIICO Industrial Area,
Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan),
India

Fabricantul

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.
SP-289(A), RIICO Industrial Area,
Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan),
India

Acest prospect a fost aprobat în martie 2025

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>