

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Estrinorm 1 mg/g cremă vaginală

Estriol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Estrinorm și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Estrinorm
3. Cum să utilizați Estrinorm
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Estrinorm
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Estrinorm și pentru ce se utilizează

Estrinorm este o cremă pentru utilizare vaginală care conține hormonul feminin estriol (un estrogen) și aparține unui grup de medicamente destinate terapiei de substituție hormonală (TSH).

Se utilizează pentru ameliorarea simptomelor menopauzei vaginale, cum sunt uscăciunea sau iritarea. În termeni medicali, această situație este denumită „atrofie vaginală”. Acestea sunt cauzate de o scădere a concentrațiilor de estrogen din organismul dumneavoastră, care apare în mod natural după menopauză.

Estrinorm acționează prin înlocuirea estrogenului care este produs în mod obișnuit în ovarele femeilor. Se introduce în vagin, astfel încât hormonul este eliberat acolo unde acesta este necesar. Aceasta poate ameliora senzația de disconfort de la nivelul vaginului.

Este o perioadă în care ovarele încep treptat să producă mai puțin estrogen. Perioada în care se petrece acest lucru (de obicei, în jurul vârstei de 50 ani) se numește menopauză. Dacă ovarele sunt îndepărtate chirurgical (ovariectomie) înainte de menopauză, producția de estrogen scade brusc.

Lipsa de estrogeni în timpul menopauzei poate cauza subțierea și uscarea peretelui vaginal. Ca urmare, relațiile sexuale pot deveni dureroase, pot apare prurit și infecții vaginale. Aceste probleme pot fi ameliorate folosind medicamente precum Estrinorm care conțin estrogen. Poate dura câteva zile sau chiar săptămâni înainte de a observa o îmbunătățire.

Estrinorm se utilizează și:

- pentru îmbunătățirea vindecării rănilor la femeile aflate în postmenopauză, supuse unei intervenții chirurgicale vaginale.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Estrinorm

Antecedente medicale și controale periodice

Utilizarea TSH prezintă anumite riscuri, care trebuie luate în considerare atunci când se decide începerea sau continuarea utilizării terapiei.

Experiența în tratamentul femeilor cu menopauză prematură (din cauza insuficienței ovariene sau a intervenției chirurgicale) este limitată. Dacă aveți o menopauză prematură riscurile legate de utilizarea TSH pot fi diferite. Vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră.

Înainte de a începe sau relua TSH, medicul dumneavoastră vă va adresa întrebări despre istoricul medical al dumneavoastră și al familiei dumneavoastră. Este posibil ca medicul să decidă efectuarea unei examinări fizice. Aceasta poate include examinarea sânilor și/sau o examinare internă, dacă este necesar.

După ce ați început tratamentul cu Estrinorm, trebuie să vă prezentați la medic pentru controale periodice (cel puțin o dată pe an). În cadrul acestor controale, discutați cu medicul dumneavoastră beneficiile și riscurile continuării tratamentului cu Estrinorm.

Mergeți la screening periodic al sânilor, conform recomandărilor medicului.

Nu utilizați Estrinorm dacă oricare dintre următoarele vi se aplică. Dacă nu sunteți sigură cu privire la oricare dintre punctele de mai jos, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a utiliza Estrinorm.

Nu utilizați Estrinorm:

- dacă sunteți alergică (hipersensibilă) la estriol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă aveți, ați avut sau sunteți suspectată de cancer de sân;
- dacă aveți sau dacă se suspectează că aveți o formă de cancer sensibil la estrogeni, cum este cancerul mucoasei uterului (endometrului);
- dacă aveți sângerare inexplicabilă din vagin;
- dacă aveți o îngroșare excesivă a mucoasei uterului (hiperplazie endometrială) netratată;
- dacă aveți sau ați avut vreodată un cheag de sânge la nivelul venelor (tromboză), de exemplu la nivelul picioarelor (tromboză venoasă profundă) sau plămânilor (embolie pulmonară);
- dacă prezentați tulburări de coagulare a sângelui (de exemplu, deficit de proteină C, proteină S sau antitrombină);
- dacă aveți sau ați avut recent o boală cauzată de cheaguri de sânge la nivelul arterelor, de exemplu, angină pectorală, infarct miocardic sau accident vascular cerebral;
- dacă aveți sau ați avut o afecțiune a ficatului, iar valorile testelor funcționale ale ficatului nu au revenit la normal;
- dacă aveți o afecțiune rară a sângelui numită "porfirie", care este transmisă pe cale ereditară (moștenită).

Dacă oricare dintre afecțiunile de mai sus apar pentru prima dată în timpul utilizării **Estrinorm**, opriți imediat administrarea și adresați-vă medicului dumneavoastră.

Afecțiuni care necesită supraveghere

Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre următoarele afecțiuni sunt prezente, au apărut anterior și/sau s-au agravat în timpul sarcinii sau în timpul unui tratament hormonal anterior, deoarece aceste afecțiuni pot reapărea sau se pot agrava în timpul tratamentului cu **Estrinorm**:

- fibrome în interiorul uterului;
- creștere a mucoasei uterine în afara uterului (endometrioză) sau istoric de creștere excesivă a mucoasei uterine (hiperplazie endometrială);
- risc crescut de formare a cheagurilor de sânge (vezi „Cheaguri de sânge la nivelul venelor (tromboză)”);
- risc crescut de apariție a cancerului sensibil la estrogen (de exemplu, dacă mama, sora sau bunica a avut cancer de sân);
- tensiune arterială mărită;

- o afecțiune a ficatului, cum ar fi o tumoră benignă a ficatului;
- diabet zaharat;
- calculi biliari;
- migrenă sau dureri de cap severe;
- o afecțiune rară a sistemului imunitar care afectează multe organe (lupus eritematos systemic);
- epilepsie;
- astm bronșic;
- o afecțiune la nivelul timpanului care deteriorează auzul (otoscleroză);
- retenție de lichide cauzată de afecțiuni ale inimii sau ale rinichilor.

Întrerupeți utilizarea Estrinorm și adresați-vă IMEDIAT medicului dumneavoastră dacă apar următoarele manifestări:

- oricare dintre afecțiunile menționate la punctul „Nu utilizați Estrinorm”;
- îngălbenirea pielii sau a albului ochilor (icter). Acestea pot fi semnele unei afecțiuni a ficatului;
- o creștere semnificativă a tensiunii arteriale (simptomele pot fi dureri de cap, oboseală, amețeli);
- dureri de cap asemănătoare migrenei, care apar pentru prima dată;
- dacă sunteți gravidă;
- dacă observați semnele unui cheag de sânge, cum ar fi:
 - umflare dureroasă și înroșire a picioarelor;
 - durere bruscă în piept;
 - dificultăți în respirație.

Pentru mai multe informații, vezi „Cheaguri de sânge la nivelul venelor (tromboză)”.

Notă: Estrinorm nu este un contraceptiv. Dacă au trecut mai puțin de 12 luni de la ultima menstruație sau dacă aveți vârsta sub 50 de ani, este posibil să fie necesar să folosiți în continuare metode suplimentare de contracepție, pentru a preveni apariția unei sarcini. Discutați cu medicul dumneavoastră pentru recomandări.

TSH și cancerul

Îngroșarea excesivă a mucoasei uterine (hiperplazie endometrială) și cancer al mucoasei uterine (cancer endometrial)

Administrarea TSH sub formă de comprimate numai cu estrogen, pentru o perioadă lungă de timp, poate crește riscul de dezvoltare a cancerului mucoasei uterine (de endometru).

Nu se cunoaște dacă există un risc similar în cazul utilizării Estrinorm în tratamente repetate sau pe termen lung (mai mult de un an). Cu toate acestea, s-a dovedit că nivelul de absorbție a estriol în sânge este foarte redus, prin urmare nu este necesară adăugarea unui progestativ.

De obicei, dacă aveți sângerări neregulate în afara ciclului sau pătare a lenjeriei, nu trebuie să vă îngrijorați, însă trebuie să vă faceți o programare la medic. Acestea ar putea fi un semn că endometrul dumneavoastră s-a îngroșat.

Următoarele riscuri sunt aplicabile medicamentelor utilizate ca TSH care ajung în circulația sângelui. Totuși, Estrinorm este destinat tratamentului local, la nivelul vaginului, iar absorbția în sânge este foarte redusă. Probabilitatea ca afecțiunile prezentate mai jos să se agraveze sau să revină în timpul tratamentului cu Estrinorm este mică, însă trebuie să vă prezentați la medicul dumneavoastră în cazul în care aveți îngrijorări.

Cancer de sân

Dovezile sugerează că administrarea locală de estrogeni nu crește riscul de cancer de sân la femei, care nu au avut cancer de sân în anamneză. Nu este cunoscut dacă administrarea Estrinorm poate fi utilizat în siguranță la femei cu cancer de sân în anamneză.

Verificați-vă sânii în mod regulat. Adresați-vă medicului dacă observați orice schimbări, cum ar fi:

- încrețire a pielii
- modificări ale mamelonului
- orice noduli pe care îi puteți vedea sau simți.

În plus, se recomandă să vă înscrieți în programele de testare prin mamografie care sunt disponibile pentru dumneavoastră.

Cancer ovarian

Cancerul ovarian este rar – mult mai rar decât cancerul de sân. Utilizarea TSH cu estrogen în monoterapie a fost asociată cu o ușoară creștere a riscului de cancer ovarian.

Riscul de cancer ovarian variază în funcție de vârstă. De exemplu, dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani care nu utilizează TSH, vor fi diagnosticate cu cancer ovarian circa 2 femei din 2 000, într-o perioadă de 5 ani. În cazul femeilor care au utilizat TSH timp de 5 ani, rezultatul a fost de aproximativ 1 caz suplimentar la 2 000 de utilizatoare.

Efectele TSH asupra inimii și circulației sanguine

Cheaguri de sânge la nivelul venelor (tromboză)

Riscul formării de cheaguri de sânge în vene este de 1,3 până la 3 ori mai mare la utilizatoarele TSH, comparativ cu femeile care nu utilizează, în special în primul an de tratament.

Formarea cheagurilor de sânge poate avea consecințe grave, și dacă unul dintre ele ajunge la nivelul plămânilor poate cauza dureri în piept, greutate la respirație, colaps sau chiar deces. Posibilitatea de a dezvolta cheaguri de sânge este mai mare pe măsură ce înaintați în vârstă și dacă oricare dintre următoarele vi se aplică. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste situații sunt valabile în cazul dumneavoastră:

- dacă nu vă puteți deplasa o perioadă îndelungată din cauza unei intervenții chirurgicale majore, a unei accidentări sau a unei boli (vezi deasemenea pct. 3 „Dacă aveți nevoie de o intervenție chirurgicală”)
- dacă aveți greutatea corporală mare (indicele masei corporale (IMC) $>30 \text{ kg/m}^2$)
- dacă aveți orice problemă de coagulare a sângelui care necesită tratament îndelungat cu un medicament pentru prevenirea formării de cheaguri de sânge
- dacă vreuna dintre rudele dumneavoastră apropiate a avut vreodată un cheag de sânge la nivelul picioarelor, al plămânilor sau al altui organ
- dacă aveți lupus eritematos sistemic
- dacă aveți cancer.

Comparație

Analizând femeile în jurul vârstei de 50 de ani care nu utilizează TSH, se preconizează că, în medie, pe parcursul unei perioade de 5 ani, la 4 până la 7 femei din 1 000 vor apărea cheaguri de sânge la nivelul unei vene.

La femeile în jurul vârstei de 50 de ani care utilizează TSH numai cu estrogen timp de mai mult de 5 ani, vor exista 5 până la 8 cazuri din 1 000 de utilizatoare (adică 1 caz suplimentar).

Boli de inimă (atac de cord)

Pentru femeile care utilizează TSH numai cu estrogen, nu există un risc crescut de a dezvolta o boală cardiacă.

Accident vascular cerebral

Riscul unui accident vascular cerebral este de aproximativ 1,5 ori mai mare la femeile care utilizează TSH comparativ cu femeile care nu iau aceste medicamente. Numărul de cazuri suplimentare de accident vascular cerebral din cauza utilizării TSH crește odată cu vârsta.

Comparație

Dintre femeile în jurul vârstei de 50 de ani care nu utilizează TSH, se preconizează că, în medie, pe parcursul unei perioade de 5 ani, 8 femei din 1 000 vor avea un accident vascular cerebral. La femeile în jurul vârstei de 50 de ani care utilizează TSH, vor exista 11 cazuri la 1 000 de utilizatoare, pe parcursul a 5 ani (adică 3 cazuri suplimentare).

Alte situații

TSH nu previne pierderea memoriei. Există unele dovezi de risc crescut de pierdere a memoriei la femeile care au început TSH după vârsta de 65 de ani. Discutați cu medicul dumneavoastră pentru recomandări.

Estrinorm împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

În special spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați:

- medicamente anticonvulsivante (de exemplu, hidantoine, barbiturice, carbamazepină)
- medicamente antiinfecțioase (de exemplu, griseofulvină, rifampicină, rifabutină, nevirapină, efavirenz, ritonavir, nelfinavir)
- preparate din plante medicinale care conțin sunătoare (*Hypericum perforatum*)
- corticosteroizi, succinilcolină, teofiline și troleandomicină.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți hepatită C și administrați schema conținând asocierea medicamentoasă reprezentată de ombitasvir/paritaprevir/ritonavir cu sau fără dasabuvir. Administrarea concomitentă a acestei combinații de medicamente cu unele preparate care conțin estrogen poate determina creșteri ale rezultatelor testelor funcționale hepatice sanguine (creșteri ale enzimei hepatice ALT). Nu se cunoaște dacă poate apărea un astfel de risc la utilizarea Estrinorm împreună cu această schemă medicamentoasă în asociere. Medicul dumneavoastră vă va oferi informații.

Dacă nu sunteți sigură că cele menționate mai sus vi se aplică, discutați cu medicul sau farmacistul înainte de a utiliza Estrinorm.

Dacă suspectați că aveți o infecție vaginală, medicul dumneavoastră vă poate prescrie, de asemenea, un medicament pentru a trata infecția.

Sarcina și alăptarea

Estrinorm este destinat pentru utilizare numai la femeile în postmenopauză. Dacă rămâneți gravidă, opriți utilizarea Estrinorm și adresați-vă medicului dumneavoastră.

Estrinorm nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Estrinorm nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Informații importante privind unele componente ale Estrinorm cremă

Estrinorm cremă conține alcool cetilic și alcool stearilic. Aceștia pot provoca reacții adverse cutanate locale (de exemplu dermatită de contact).

3. Cum să utilizați Estrinorm

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigură.

Pentru tratamentul atrofiei vaginale: 1 aplicație pe zi în primele 2 până la 3 săptămâni (maximum 4 săptămâni), urmată de o scădere treptată, bazată pe atenuarea simptomelor, până la atingerea dozei de întreținere (de exemplu, 1 aplicație de 2 ori pe săptămână).

Pentru îmbunătățirea vindecării rănilor la femeile aflate în menopauză, supuse unei intervenții chirurgicale vaginale: 1 aplicație pe zi în cele 2 săptămâni înainte de intervenția chirurgicală; 1 aplicație de 2 ori pe săptămână în cele 2 săptămâni după intervenția chirurgicală.


Medicul dumneavoastră vă va prescrie cea mai mică doză pentru a trata simptomele dumneavoastră pe o perioadă cât mai scurtă necesară. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă credeți că această doză este prea puternică sau nu este suficient de puternică.

Mod de administrare


Folosiți aplicatorul pentru a introduce crema în vagin. Faceți acest lucru seara înainte de culcare. O aplicație (aplicatorul umplut până la marcajul circular) conține 0,5 g Estrinorm cremă, care corespunde unei doze de 0,5 mg estriol.

Instrucțiuni de utilizare pentru pacientă


1. Îndepărtați capacul tubului, întoarceți-l și utilizați vârful ascuțit ca să deschideți tubul.
2. Înșurubați capătul aplicatorului la tub. Asigurați-vă că pistonul este introdus complet în tubul aplicatorului.



3. Apăsați ușor pe tub ca să umpleți aplicatorul cu cremă până când pistonul se oprește (la marcajul circular, vezi săgețile din figura de mai jos).



4. Deșurubați aplicatorul de pe tub și puneți la loc capacul tubului.
5. Pentru aplicarea cremei, întindeți-vă pe pat și introduceți capătul aplicatorului adânc în vagin.
6. Apăsați încet pistonul pe toată cursa până când aplicatorul este gol.



7. După utilizare, trageți pistonul afară din tubul aplicatorului până la punctul de rezistență și spălați-le în apă caldă cu săpun. Nu utilizați detergenți. Clătiți bine după spălare.

NU INTRODUCEȚI APLICATORUL ÎN APĂ FIERBINTE SAU CLOCOTITĂ.

8. Aplicatorul poate fi re-asamblat prin introducerea completă a pistonului în tub dincolo de punctul în care se simte rezistență.
9. Aruncați aplicatorul de îndată ce tubul este gol.

Dacă utilizați mai mult Estrinorm decât trebuie

Dacă ați utilizat mai mult **Estrinorm** decât trebuie, adresați-vă medicului sau farmacistului.

Dacă cineva a înghițit o cantitate de cremă, nu este nevoie să vă faceți griji. Totuși, ar trebui să vă adresați unui medic. Simptomele care pot apărea sunt greața și vărsăturile; la femei, după câteva zile pot să apară sângerări vaginale.

Dacă uitați să utilizați Estrinorm

Dacă ați uitat să administrați o doză, administrați-o de îndată ce vă amintiți, cu excepția cazului în care aceasta este cu întârziere de peste 12 ore. În acest caz omiteți doza uitată și continuați cu doza următoare. Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Estrinorm

Medicul dumneavoastră vă va explica efectele opririi tratamentului și când trebuie oprit. De asemenea, medicul va discuta cu dumneavoastră alte posibilități de tratament.

Dacă aveți nevoie de o intervenție chirurgicală

Dacă urmează să vi se efectueze o intervenție chirurgicală, spuneți medicului chirurg că utilizați **Estrinorm**. Posibil să fie necesar să întrerupeți utilizarea Estrinorm aproximativ de la 4 până la 6 săptămâni înainte de operație pentru a reduce riscul de formare a cheagurilor de sânge. Întrebați medicul dumneavoastră când puteți relua utilizarea Estrinorm.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Următoarele afecțiuni au fost raportate mai frecvent la femeile care utilizează TSH comparativ cu femeile care nu utilizează TSH. Aceste riscuri se aplică în măsură mai mică tratamentelor cu estrogen utilizate la nivelul vaginului:

- cancer ovarian;
- cheaguri de sânge în venele de la nivelul plămânilor sau picioarelor (tromboembolism venos);
- accident vascular cerebral;
- pierdere probabilă a memoriei dacă TSH este inițiată după vârsta de 65 de ani.

Pentru mai multe informații privind aceste reacții adverse, vezi pct. 2.

Alte reacții adverse includ:

- sensibilitate crescută la atingerea sânilor
- disconfort și dureri la nivelul sânilor
- sângerări vaginale adundente
- sângerări ușoare (pătare)
- secreții abundente a mucusului cervical
- greață
- vărsături

- iritație locală sau mâncărime
- dureri de cap
- simptome asemănătoare gripei.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Următoarele reacții adverse au fost raportate pentru TSH care conține estrogeni, însă nu și în cazul utilizării Estrinorm:

- afecțiuni ale vezicii biliare;
- diverse afecțiuni ale pielii:
 - modificări ale culorii pielii, în special la nivelul feței și gâtului, cunoscute ca "pete de sarcină" (cloasmă);
 - erupție trecătoare pe piele cu leziuni în formă de țintă de culoare roșie sau ulceratii (eritem polimorf);
 - noduli roșiatici, dureroși pe piele (eritem nodos);
 - purpură vasculară (erupții hemoragice).

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Estrinorm

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor!

A se păstra la temperaturi sub 25 °C. A nu se congela.

Nu utilizați Estrinorm după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Estrinorm

- Substanța activă este estriol. 1 g cremă conține estriol 1 mg.
- Celelalte componente sunt: octildodecanol, cetilpalmitat, glicerol, alcool cetilic, alcool stearilic, polisorbat 60, sorbitan monostearat, acid lactic, diclorhidrat de clorhexidină, hidroxid de sodiu, apă purificată.

Cum arată Estrinorm și conținutul ambalajului

Cremă omogenă de culoare albă sau aproape albă.

Estrinorm este disponibil în cutie cu un tub din aluminiu a câte 15 g cremă însoțit de aplicator vaginal și prospect.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

FARMAPRIM SRL, Republica Moldova
str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni, MD-4829
telefon (+373 22) 28-18-45
fax (+373 22) 28-18-46
e-mail: safety@farmaprim.md

Fabricantul

FARMAPRIM SRL, Republica Moldova
str. Crinilor, 5, s. Porumbeni, r-ul Criuleni, MD-4829

Acest prospect a fost aprobat în Mai 2021

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>