

**Prospect: Informații pentru consumator/pacient**  
**Uroholum picături orale, soluție**  
Combinatie

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Uroholum și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Uroholum
3. Cum să luați Uroholum
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Uroholum
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Uroholum și pentru ce se utilizează**

Uroholum reprezintă un medicament combinat de origine vegetală. Un complex de substanțe biologice active (uleiuri esențiale), ușor de absorbit în sânge și stimulând circulația renală și hepatică, ajută la creșterea secreției urinare și biliare, normalizează tonusul mușchilor netezi ai tractului urinar superior și ai vezicii biliare, slăbește procesele inflamatorii, are acțiuni bactericide, diuretice, coleretice, antispastice.

Uroholum are un efect anti azotemic, elimină ureea, acidul uric și clorurile din organism. Ajută la îndepărtarea nisipului și a pietrelor din rinichi, vezici urinare și biliare.

**Uroholum se utilizează ca adjuvant în :**

- Terapia complexă a afecțiunilor infecțioase și inflamatorii (acute și cronice) ale sistemului urogenital: cistita; uretrita; pielonefrita; nefrita; nefroza; urolitiază, nefrolitiază și diateză de sare (prevenirea formării pietrelor, inclusiv după îndepărtarea acestora.
- Terapia complexă a dischineziei căilor biliare, colecistita cronică.

**2. Ce trebuie să știți înainte să luați Uroholum**

**Nu luați Uroholum:**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- dacă aveți modificări ale proprietăților reologice ale sângelui;
- dacă aveți inflamații ale căilor biliare (icter);
- dacă aveți gastrită (inflamația mucoasei stomacului), ulcer gastric sau duodenal.

### **Atenționări și precauții**

Înainte să luați Uroholum, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Utilizarea cu grijă la pacienții care suferă de arsuri la stomac, ca urmare a refluxului gastro-esofagian, (poate provoca apariția și/sau creșterea arsurilor la stomac);

*Nu administrați Uroholum, dacă diametrul calculilor depășește 3 mm.*

### **Copii și adolescenți**

Uroholum sub formă de picături orale, soluție se utilizează la copii cu vârsta peste 12 ani.

### **Uroholum împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv eliberate fără prescripția medicului.

### **Uroholum împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Uroholum se administrează înainte de mese.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu se recomandă administrarea preparatului în sarcină și perioada de alăptare.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Deoarece produsul conține alcool nu se recomandă de a conduce vehicule și de a folosi utilaje în timpul administrării preparatului.

**Uroholum conține o cantitate mică de etanol** – mai puțin de 100 mg/doză.

## **3. Cum să luați Uroholum**

Luăți întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### ***Doze recomandate:***

*Adulți și copii peste 12 ani:*

Se administrează câte 10-20 picături Uroholum, dizolvate într-o cantitate mică de apă, de 3 ori pe zi. Durata administrării constituie de la 5 până la 30 zile și depinde de gravitatea bolii și indicațiile medicului. La necesitate tratamentul poate fi repetat..

### ***Mod de administrare***

Administrare orală.

Uroholum se administrează înainte de mese.

### **Dacă luați mai mult Uroholum decât trebuie**

Dozele foarte mari de medicament pot determina greață, vomă, amețeli. Adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau mergeți la spitalul cel mai apropiat, dacă ați luat mai mult Uroholum decât v-a fost recomandat de către medic.

#### **Dacă uitați să luați Uroholum**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuați tratamentul așa cum v-a fost prescris de către medic.

#### **Dacă încetați să luați Uroholum**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvențele reacțiilor adverse sunt definite după cum urmează:

- *foarte frecvente*: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane;
- *frecvente*: pot afecta până la 1 din 10 persoane;
- *mai puțin frecvente*: pot afecta până la 1 din 100 persoane;
- *rare*: pot afecta până la 1 din 1000 persoane;
- *foarte rare*: pot afecta până la 1 din 10.000 persoane;
- *cu frecvență necunoscută*: frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile.

#### **Frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):**

- amețeli;
- manifestări dispeptice (greturi, vomă);

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau email: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Uroholum**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. A se păstra în ambalajul original, la temperaturi sub 25°C.

După deschiderea flaconului la respectarea condițiilor de păstrare termenul de valabilitate nu se modifică.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Uroholum**

- Substanțele active sunt: 1 ml de produs conține extract hidroalcoolic (1:1) (extractant – etanol 40%) din amestec de plante: fructe de morcov sălbatic (*Dauci carotae fructus*) – 200 mg; frunze de Orthosiphon (*Orthosiphonis staminei folia*) – 180 mg; iarbă de troscot (*Poligoni avicularis herba*) – 150 mg; mătase de porumb (*Zea maydis styli cum stigmatis*) – 120 mg; flori de soc negru (*Sambuci nigrae flores*) – 100 mg; iarbă de coada-calului (*Equiseti herba*) – 100 mg; conuri de hamei (*Lupuli flos*) – 50 mg; muguri de mestecan (*Betulae gemmae*) – 50 mg; iarbă de sunătoare (*Hyperici herba*) – 40 mg; frunze de mentă (*Menthae piperitae folia*) – 10 mg.

- *Celelalte componente : Uroholum nu conține alte componente (excipienți)*

### **Cum arată Uroholum și conținutul ambalajului**

Uroholum se prezintă sub formă de lichid de culoare maro închis, având un miros aromat specific. La depozitare poate apărea precipitat.

Este disponibil în cutie cu 1 flacon a câte 25 ml sau 40 ml picături orale, soluție.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

«DKP «Fabrica farmaceutică», SRL  
Ucraina, 10014, reg. Jitomir,  
or. Jitomir, r-ul Koroliiov, str. Lermontovskaia, 5

#### **Fabricantul**

DKP Fabrica farmaceutică SRL,  
str. Koroliova, 4, s-l Stanișovka, r-ul Jitomir,  
reg. Jitomir, 12430, Ucraina

### **Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2025**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>