

PROSPECT: Informații pentru consumator/pacient

CLORURĂ DE SODIU 50 mg/ml picături oftalmice/nazale, soluție *Clorură de sodiu*

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este CLORURĂ DE SODIU și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați CLORURĂ DE SODIU
3. Cum să utilizați CLORURĂ DE SODIU
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează CLORURĂ DE SODIU
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE CLORURĂ DE SODIU ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

CLORURĂ DE SODIU la utilizare sub formă de picături oftalmice înlătură edemul la nivelul ochiului.

La utilizare nazală elimină alergenii și microbii patogeni; excesul de mucus, crustele, praful și particulele mărunte, care impurifică nasul și creează dificultăți de respirație; contribuie la eliminarea scuamelor și crustelor după intervenții chirurgicale fără risc de hemoragie; crește eficiența utilizării medicamentelor cu acțiune locală; normalizează formarea mucusului din cavitatea nazală.

CLORURĂ DE SODIU este utilizată:

Oftalmic:

- edem la nivelul ochiului (edemul corneei).

Nazal:

- pentru igiena cavității nazale;
- rinită, rinosinuzită, rinofaringită;
- profilaxia inflamației sinusurilor paranazale (higmorită, frontită, sinuzită);
- pregătirea de administrarea nazală a altor medicamente (pentru îmbunătățirea absorbției lor).

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI CLORURĂ DE SODIU

Nu utilizați CLORURĂ DE SODIU:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6).

Atenționări și precauții

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte să utilizați CLORURĂ DE SODIU.

Nu se admite utilizarea medicamentului în caz de intervenții electrochirurgicale.

CLORURĂ DE SODIU împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

A se utiliza cu precauție în sarcină și perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

La administrare oftalmică este posibil ca vederea să fie încetșată pentru scurt timp după utilizarea de CLORURĂ DE SODIU. Nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje până când acest efect nu dispare.

Informații importante privind unele componente ale CLORURĂ DE SODIU

Medicamentul conține metilhidroxibenzoat (E218) și propilhidroxibenzoat (E216). Poate provoca reacții alergice (chiar întârziate).

3. CUM SĂ UTILIZAȚI CLORURĂ DE SODIU

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa, cum v-au spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Utilizați CLORURĂ DE SODIU numai ca picături pentru ochi sau pentru nas.

Administrare oftalmică: se instilează în ochiul (ochii) afectat (afecțați) câte 1-2 picături de 3-4 ori pe zi.

Administrare nazală: pentru spălarea nasului medicamentul se utilizează nediluat sau diluat cu apă pentru injecții sau apă fiartă și răcită. Pentru diluare se ia o parte de medicament și de la 1 până la 4 părți de apă. Pentru copii cu vârsta peste 2 ani și adulți se utilizează de 2-4 ori pe zi în fiecare nară.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din CLORURĂ DE SODIU

Clătiți bine ochiul cu apă caldă. Nu vă mai administrați altă picătură până la momentul dozei următoare.

Dacă uitați să utilizați CLORURĂ DE SODIU

Continuați tratamentul obișnuit, cu doza următoare. Nu vă administrați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă utilizați și alte picături sau unguent pentru ochi

Așteptați cel puțin 15-20 minute între administrarea CLORURĂ DE SODIU și a celorlalte picături. Unguentul oftalmic se va aplica întotdeauna ultimul.

Dacă încetați să utilizați CLORURĂ DE SODIU

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. De obicei vă puteți administra picăturile în continuare, exceptând situația în care reacțiile adverse sunt grave sau în care prezentați o reacție alergică gravă.

Reacții adverse cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

La utilizarea sub formă de picături oftalmice

- senzație tranzitorie de arsură, înroșire și iritare la nivelul ochiului.

La utilizarea sub formă de picături nazale

- reacții alergice (urticarie, dificultăți de respirație, umflarea feței, buzelor).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: <http://amdm.gov.md> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CLORURĂ DE SODIU

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare, înscrisă pe flacon și pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

După prima deschidere conținutul flaconului a se utiliza timp de o lună.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține CLORURĂ DE SODIU

Substanța activă este clorura de sodiu.

1 ml picături oftalmice/nazale, soluție conține clorură de sodiu – 50 mg.

Celelalte componente sunt: acid boric, tetraborat de sodiu dexahidrat, hipromeloză, propilenglicol, metilhidroxibenzoat (E218), propilhidroxibenzoat (E216), apă pentru injecții.

Cum arată CLORURĂ DE SODIU și conținutul ambalajului

CLORURĂ DE SODIU se prezintă sub formă de lichid transparent incolor.

CLORURĂ DE SODIU este disponibil în cutii cu 1 sau 10 flacoane-picurătoare din polietilenă a câte 10 ml picături oftalmice, soluție.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

„Liqvor” SAÎ,
str. Kochinyan, 7/9,
or. Yerevan, 0089, Armenia.

Fabricantul

„Liqvor” SAÎ,
str. Kochinyan, 7/9,
or. Yerevan, 0089, Armenia.

Acest prospect a fost aprobat în Aprilie 2021.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>.