

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT
PEROXID DE HIDROGEN-MC 3% 30 mg/ml soluție cutanată
Hydrogenii peroxydum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Peroxid de hidrogen-MC și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Peroxid de hidrogen-MC
3. Cum să luați Peroxid de hidrogen-MC
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Peroxid de hidrogen-MC
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Peroxid de hidrogen-MC și pentru ce se utilizează

Peroxidul de hidrogen este o substanță din grupul antisepticelor cu acțiune oxidantă. Sub influența unor enzime se descompune în apă și oxigen atomic cu putere oxidativă mare, care acționează negativ asupra dezvoltării microbilor. La pătrunderea soluției în rană oxigenul degajat are și efect mecanic, înlăturând puroiul și corpii străini din rană în urma formării unei spume abundente. Această spumă contribuie la formarea cheagurilor de sânge și oprirea sângerărilor mici.

Peroxid de hidrogen-MC se utilizează pentru prelucrarea rănilor superficiale, oprirea sângerărilor din vasele mici de sânge (capilare) în rănilor superficiale, în sângerări nazale; gargare în stomatite, tonzilită; spălături în boli ginecologice.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Peroxid de hidrogen-MC

Nu utilizați Peroxid de hidrogen-MC

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la alte componente ale medicamentului enumerate la pct. 6.

Atenționări și precauții

A se evita contactul preparatului cu mucoasa ochiului.

Dacă înghiți accidental niște peroxid de hidrogen diluat, cum ar fi soluția de 30 mg/ml disponibilă pe scară largă în farmacii, probabil vei observa o ușoară durere de stomac. De asemenea, puteți vomita o substanță ușor spumoasă, ceea ce este normal.

Cu toate acestea, este vital să folosiți o concentrație nu mai mare de 30 mg/ml și să o folosiți cu moderație pentru a evita iritația.

Lumina și căldura reduc activitatea preparatului.

Informații importante despre unii excipienți

Conține benzoat de sodiu. Ușor iritant al pielii, ochilor și mucoaselor.

Peroxid de hidrogen-MC împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Efectul tratamentului poate fi modificat dacă peroxidul de hidrogen este utilizat în același timp cu alte medicamente.

Acțiunea antiseptică scade în mediul alcalin. Sărurile metalelor, radicalii compușilor unor oxidanți reduc acțiunea peroxidului de hidrogen.

Peroxid de hidrogen-MC împreună cu alimente și băuturi

Peroxid de hidrogen-MC se utilizează cutanat.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Preparatul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Peroxid de hidrogen-MC

Utilizați întotdeauna Peroxid de hidrogen-MC exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Mod de utilizare

Utilizare cutanată.

Porțiunile afectate ale pielii se prelucrează cu un tampon de vată sau tifon, îmbibat în soluție de 10 – 30 mg/ml.

Pentru prelucrarea mucoaselor și pentru gargare se utilizează soluția 2,5 mg/ml.

Mod de preparare a soluției de 2,5 mg/ml Peroxid de hidrogen:

Se amestecă 2,5 ml soluție Peroxid de hidrogen în 1 ml apă purificată sau fiartă și răcită.

Dacă luați mai mult Peroxid de hidrogen-MC decât trebuie

Nu sunt relatate cazuri de supradozare la utilizare cutanată.

Dacă uitați să luați Peroxid de hidrogen-MC

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă încetați să luați Peroxid de hidrogen-MC

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 utilizatori)

Senzație de usturime în timpul prelucrării răni.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 utilizatori)

Reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse posibile nementionate în acest prospect. Puteți raporta, de asemenea, reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, disponibil pe site-ul AMDM la următoarea adresă web: www.amdm.gov.md sau prin e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Prin raportarea efectelor adverse veți ajuta la furnizarea mai multor informații cu privire la siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Peroxid de hidrogen-MC

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A se păstra în ambalajul original, protejat de lumină și umiditate.

Nu utilizați Peroxid de hidrogen-MC după data de expirare înscrisă pe cutie după “Exp:.”.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Peroxid de hidrogen-MC

Substanța activă este peroxid de hidrogen.

1 ml soluție cutanată conține peroxid de hidrogen 30 mg.

Celelalte componente sunt: benzoat de sodiu (E211), apă purificată.

Cum arată Peroxid de hidrogen-MC

Lichid transparent, incolor, fără miros.

Este disponibil câte 40 ml, 100 ml sau 1000 ml în flacon din sticlă sau masă plastică de culoare brună, acoperit cu capac cu/sau fără dop cu picurător. Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton.

Se admite eliberarea flacoanelor însoțite de prospect, fără ambalare în ambalaj secundar.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

MC Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova

MD-2037, mun. Chișinău, str. Industrială 59/3

Fabricantul

MC Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova

MD-2037, mun. Chișinău, str. Industrială 59/3

Acest prospect a fost aprobat în Septembrie 2025

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>