

**Prospect: Informații pentru utilizator****STREPSILS ORANGE VITAMINA C pastile**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Strepsils Orange Vitamina C și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Strepsils Orange Vitamina C
3. Cum să utilizați Strepsils Orange Vitamina C
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Strepsils Orange Vitamina C
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Strepsils Orange Vitamina C și pentru ce se utilizează**

Strepsils Orange Vitamina C aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.

Strepsils Orange Vitamina C este indicat pentru tratamentul durerilor în gât, favorizând ameliorarea simptomelor.

Strepsils Orange Vitamina C asigură cantitatea de Vitamina C necesară în cursul infecțiilor oro-faringiene.

Efect antibacterian, antifungic și antiviral

Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii puternice în gât.

**2. Ce trebuie să știți înainte să luați Strepsils Orange Vitamina C****Nu luați Strepsils Orange Vitamina C**

- dacă sunteți alergic la amilmetacrezol, alcool 2,4-diclorobenzilic, acid ascorbic și ascorbat de sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

**Atenționări și precauții**

Înainte să luați Strepsils Orange Vitamina C, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- dacă aveți diabet zaharat.

**Strepsils Orange Vitamina C împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

### **Utilizarea Strepsils Orange Vitamina C cu alimente, băuturi și alcool**

Strepsils Orange Vitamina C nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi. A se administra între mese.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Strepsils Orange Vitamina C nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

**Strepsils Orange Vitamina C conține** glucoză și zahăr. Dacă medicul v-a atenționat că aveți o intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

O pastilă Strepsils Orange Vitamina C conține glucoză 968,491 mg și sucroză (zahăr) 1 438mg. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

Acest medicament conține cantități foarte scăzute de gluten (din amidon de grâu). Este considerat „fără gluten” și este foarte puțin probabil să provoace probleme dacă aveți boala celiacă. O pastilă nu conține mai mult de 19,36 micrograme de gluten. Dacă aveți alergii la grâu (diferită de boala celiacă), nu trebuie să luați acest medicament.

Acest medicament conține propilenglicol (E 1520) 3 mg per fiecare pastilă.

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conține sodiu”.

Acest medicament conține arome cu citral, citronelol, d-limonen, geraniol și linalool.

Citral, citronelol, d-limonen, geraniol și linalool pot determina reacții alergice.

Dioxidul de sulf (E220) poate provoca rar reacții de hipersensibilitate grave și bronhospasm.

Pastilele Strepsils Orange Vitamina C conțin colorant galben amurg FCF (E 110) și colorant roșu coșenilă A (E 124) care pot determina reacții alergice.

## **3. Cum să utilizați Strepsils Orange Vitamina C**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### **Doze**

Reacțiile adverse pot fi minimizate prin utilizarea celei mai mici doze eficiente necesare pentru a controla simptomele, pentru cea mai scurtă durată posibilă.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile, deoarece pot apărea dezechilibre ale florei microbiene de la nivelul cavității bucale cu risc de producere a unor infecții bacteriene sau fungice.

#### *Adulți*

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Orange Vitamina C la fiecare 2 ore; Nu depășiți doza recomandată (cel mult 8 pastile în 24 ore).

#### *Populația pediatrică*

*Copii cu vârsta peste 6 ani:* doza recomandată este similară cu cea pentru adulți.

#### *Copii cu vârsta sub 6 ani*

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

#### *Vârstnici*

Nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de pacienți.

## **Mod de administrare**

Pentru administrare bucofaringiană.

Pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nu se înghit întregi; se administrează între mese. La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariției iritațiilor locale, trebuie să schimbați poziția pastilei în gură până la dizolvare.

Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils Orange Vitamina C va fi administrat numai copiilor care pot păstra pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheați.

### **Dacă utilizați mai mult decât trebuie din Strepsils Orange Vitamina C**

Poate apărea disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul și se iau măsurile de tratament simptomatic – pentru aceasta adresați-vă medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgențe.

### **Dacă uitați să utilizați Strepsils Orange Vitamina C**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Strepsils Orange Vitamina C**

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

- reacții de hipersensibilitate (se pot manifesta sub formă de erupții cutanate, angioedem, urticarie, bronhospasm și hipotensiune cu sincopă),
- greață,
- senzație de disconfort la nivelul gurii,
- diaree

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Strepsils Orange Vitamina C**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Strepsils Orange Vitamina C**

- Substanțele active sunt amilmetacrezol 0,6 mg, alcool 2,4-diclorobenzilic 1,2 mg, acid ascorbic 33,5 mg și ascorbat de sodiu 74,9 mg.
- Celelalte componente sunt acid tartric, aromă de portocală (Blood Orange PHL 105288, propilenglicol, levomentol, galben amurg FCF (E 110) și roșu coșenilă A (E 124) (conține sodiu), sucroză (zahăr), glucoză (conține amidon de grâu și dioxid de sulf (E220)).

### **Cum arată Strepsils Orange Vitamina C și conținutul ambalajului**

Strepsils Orange Vitamina C se prezintă sub formă de pastile rotunde, de culoare portocalie, cu miros caracteristic și gust dulce-acrișor, ștanțat cu logo „S” pe ambele fețe.

Este disponibil în cutii cu blister sau cu 2 blistere din Al/PVC-PVdC a câte 12 pastile.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și producătorul**

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL  
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr.48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11,  
Sectorul 1, București, România

#### **Fabricantul**

RB NL Brands B.V.  
Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Olanda

**Acest prospect a fost revizuit în octombrie 2022.**