

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Venta Max 1000 mg comprimate filmate Diosmină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Venta Max și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Venta Max
3. Cum să luați Venta Max
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Venta Max
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Venta Max și pentru ce se utilizează

Diosmina, substanța activă a Venta Max-ului, acționează prin stabilizarea vaselor capilare. Substanța activă din Venta Max acționează asupra funcționării venelor și le protejează; crește tonusul venelor și rezistența capilarelor. Substanța activă Venta Max reduce apariția umflăturilor și are, de asemenea, un efect antiinflamator asupra vaselor de sânge.

Acest medicament poate fi utilizat la adulți pentru următoarele afecțiuni:

- Este recomandat pentru ameliorarea simptomelor asociate cu insuficiența venoasă cronică a membrilor inferioare, cum ar fi tensiune, senzație de picioare grele, dureri și crampe la gambe pe timpul nopții.
- Este potrivit pentru tratamentul simptomatic al hemoroizilor dacă se înregistrează agravarea simptomelor hemoroizilor.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Venta Max

Nu luați Venta Max:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la diosmină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);

Atenționări și precauții

Aveți grijă deosebită când administrați Venta Max și adresați-vă medicului dumneavoastră:

Eficacitatea și siguranța acestui medicament nu au fost studiate în următoarele grupuri/afecțiuni; prin urmare, cereți sfatul medicului dumneavoastră înainte de a utiliza medicamentul:

- copii și adolescenți sub 18 ani,
- pacienți cu insuficiență hepatică,
- pacienți cu insuficiență renală.

Copii și adolescenți

Utilizarea Venta Max 1000 mg comprimate filmate nu este recomandată la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani, din cauza lipsei de date clinice.

Venta Max împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea medicamentului în timpul sarcinii. Utilizarea medicamentului nu este recomandată femeilor care alăptează.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Venta Max nu are nicio influență sau are o influență neglijabilă asupra capacităților de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Venta Max conține mai puțin de 1 mmol sodiu (23 mg) per comprimat filmat, adică practic „nu conține sodiu”.

3. Cum să luați Venta Max

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dozele recomandate pentru adulți

- În insuficiența venoasă cronică a membrelor inferioare: 1 comprimat filmat pe zi, a se administra dimineața în timpul mesei.
Dacă simptomele bolii dumneavoastră se agravează sau nu se ameliorează după 6 săptămâni de tratament, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră. Cu toate acestea, puteți lua Venta Max pentru o perioadă mai lungă de timp dacă, conform medicului dumneavoastră, nu aveți nevoie de alt tratament țintit.
- Dacă simptomele hemoroizilor se agravează: 1 comprimat filmat de 3 ori pe zi (dimineața, prânzul și seara, 1 comprimat filmat de fiecare dată) timp de 4 zile, apoi 1 comprimat filmat de două ori pe zi (dimineața și seara, 1 comprimat filmat de fiecare dată) timp de încă 3 zile, care se administrează în timpul mesei.

Dacă simptomele nu se ameliorează sau se agravează după 7 zile de tratament, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră. Autotratementul cu Venta Max poate dura până la 7 zile – dacă simptomele nu dispar în acest timp, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

În tratamentul insuficienței venoase cronice, cel mai bun efect se obține cu ajutorul unor măsuri adecvate de stil de viață. Ar trebui evitate băile de soare, perioadele lungi de stat în picioare sau excesul de greutate. Plimbările și ciorapii de compresie adecvati pot îmbunătăți circulația.

Utilizare la copii și adolescenți:

Utilizarea Venta Max 1000 mg comprimate filmate nu este recomandată la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani, din cauza lipsei de date.

Populație specială

Nu au fost efectuate studii de dozare la pacienții cu insuficiență renală și/sau hepatică sau la pacienți vârstnici. Pe baza datelor disponibile, nu a fost stabilit niciun risc specific pentru aceste grupuri de pacienți.

Dacă luați mai mult Venta Max decât trebuie

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

Dacă uitați să luați Venta Max

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse raportate la utilizarea diosminei sunt:

Frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):

- diaree, dispepsie, greață (senzație de rău), vărsături.

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):

- colită (inflamare a intestinului gros).

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- dureri de cap, stare generală de rău, senzație de învârtire (vertij);
- erupții trecătoare pe piele, mâncărime, urticarie (blânde).

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- durere la nivelul abdomenului;
- edeme (umflare a feței, buzelor și pleoapelor), în mod excepțional edem Quincke (umflarea rapidă a țesuturilor, cum ar fi la nivelul feței, buzelor, limbii sau gâtului, care poate duce la respirație dificilă).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe website-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Venta Max

Nu necesită condiții speciale de păstrare.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Venta Max

- Substanța activă este diosmină. Un comprimat filmat conține 1000 mg diosmină micronizată.
- Celelalte componente sunt: alcool polivinilic, croscarmeloză sodică, talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, Opadry II 85 F82874 galben [alcool polivinilic, dioxid de titan (E171), macrogol, talc, oxid de fier galben (E172)].

Cum arată Venta Max și conținutul ambalajului

Comprimate filmate alungite, galbene, biconvexe, cu o linie pe ambele fețe. Lungimea comprimatului filmat este de 19,2 mm, lățimea sa este de 9,2 mm, înălțimea sa este de 7,8 mm. Suprafața expusă pentru ruperea comprimatelor filmate este galben-cenusie sau bej, marmorată cu alb.

Linia mediană are numai rolul de a ușura ruperea comprimatului pentru a fi înghițit ușor și nu de divizare în doze egale.

Câte 10 comprimate în blister de PVC-PVDC/Al.

Câte 3 sau 6 blistere însoțite de prospect se plasează în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Kéri Pharma Hungary Kft., Ungaria

4032 Debrecen

Bartha Boldizsár u.7.

Fabricantul

MEDITOP Gyógyszeripari Kft., Ungaria
2097 Pilisborosjenő
Ady Endre u. 1.

Acest prospect a fost aprobat în mai 2024

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>