

**Prospect: Informații pentru utilizator**  
**STREPSILS MIERE ȘI LĂMÂIE pastile**

Amilmetacrezol / Alcool 2,4 diclorbenzilic

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece el conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări .
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Strepsils Miere și Lămâie și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Strepsils Miere și Lămâie
3. Cum să luați Strepsils Miere și Lămâie
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Strepsils Miere și Lămâie
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Strepsils Miere și Lămâie și pentru ce se utilizează**

Strepsils Miere și Lămâie aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice

Strepsils Miere și Lămâie se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.

Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.

Efect antibacterian, antifungic și antiviral.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Strepsils Miere și Lămâie**

**Nu luați Strepsils Miere și Lămâie**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la amilmetacrezol și alcool 2,4 diclorbenzilic sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului.

**Atenționări și precauții**

Înainte să luați Strepsils, Miere și Lămâie adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- dacă aveți diabet zaharat

**Strepsils Miere și Lămâie împreună cu alte medicamente**

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripție medicală.

Nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

### **Utilizarea Strepsils Miere și Lămâie împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Strepsils Miere și Lămâie nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi ci între mese.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Strepsils Miere și Lămâie nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

**Strepsils Miere și Lămâie conține** glucoză și zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Strepsils Miere și Lămâie conține 1441 mg zahăr și 976 mg glucoză/pastilă. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

Acest medicament conține cantități foarte scăzute de gluten (din amidon de grâu). Este considerat „fără gluten” și este foarte puțin probabil să provoace probleme dacă aveți boala celiacă. O pastilă nu conține mai mult de 19,52 micrograme de gluten. Dacă aveți alergii la grâu (diferită de boala celiacă), nu trebuie să luați acest medicament.

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic “nu conține sodiu”.

Acest medicament conține arome cu citral, d-limonen, geraniol și linalool. Citral, d-limonen, geraniol și linalool pot determina reacții alergice.

Dioxidul de sulf (E220) poate provoca rar reacții de hipersensibilitate grave și bronhospasm.

## **3. Cum să luați Strepsils Miere și Lămâie**

Luați întotdeauna Strepsils Miere și Lămâie exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### **Doze**

Reacțiile adverse pot fi minimizate prin utilizarea celei mai mici doze eficiente necesare pentru a controla simptomele, pentru cea mai scurtă durată posibilă.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile deoarece pot apărea dezechilibre ale florei microbiene de la nivelul cavității bucale cu risc de producere a unor infecții bacteriene sau fungice.

### *Adulții*

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Miere și Lămâie la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un interval de 24 de ore.

### *Populația pediatrică*

*Copii cu vârsta peste 6 ani:* doza recomandată este similară cu cea pentru adulți.

*Copii cu vârsta sub 6 ani*

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

*Vârșnici*

Nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de pacienți.

### **Mod de administrare**

Pentru administrare bucofaringiană.

Pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.

La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariției iritațiilor locale, trebuie să schimbați poziția pastilei în gură până la dizolvare.

Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils Miere și Lămâie va fi administrat numai copiilor care pot păstra pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheați.

### **Dacă ați luat mai mult Strepsils Miere și Lămâie decât trebuie**

Poate apărea disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul și se iau măsurile de tratament simptomatice – pentru aceasta adresați-vă medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgențe.

### **Dacă ați uitat să luați Strepsils Miere și Lămâie**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să luați Strepsils Miere și Lămâie**

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, Strepsils Miere și Lămâie poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

- reacții de hipersensibilitate (se pot manifesta sub formă de erupții cutanate, angioedem, urticarie, bronhospasm și hipotensiune cu sincopă), greață, senzație de disconfort la nivelul gurii, diaree.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Strepsils Miere și Lămâie**

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Strepsils Miere și Lămâie după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Strepsils Miere și Lămâie**

- Substanțele active sunt amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4 diclorbenzolic 1,2 mg pentru o pastilă.
- Celelalte componente sunt: acid tartric, ulei de lămâie, ulei de mentă, galben de chinolină (E 104) (conține sodiu), miere, zahăr, glucoză (conține amidon de grâu și dioxid de sulf (E 220)).

### **Cum arată Strepsils Miere și Lămâie și conținutul ambalajului**

Strepsils Miere și Lămâie se prezintă sub formă de pastile rotunde, de culoare galbenă, cu miros și gust de lămâie și miere.

Este disponibil în

Cutie cu 1 blister din Al/PVC-PVDC cu 12 pastile

Cutie cu 2 blistere din Al/PVC-PVDC a câte 12 pastile

Cutie metalică din staniu cu 1 blister din Al/PVC-PVDC cu 12 pastile

Cutie cu 3 blistere din Al/PVC-PVDC a câte 12 pastile

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr.48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11  
Sectorul 1, București, România

#### **Fabricantul**

RB NL Brands B.V.

Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol

Olanda

**Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2022.**