

## Prospect: Informații pentru consumator/pacient

### Levomecol 7,5 mg/40 mg/g unguent

*Cloramfenicol / Metiluracil*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Levomecol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Levomecol
3. Cum să utilizați Levomecol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Levomecol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este Levomecol unguent și pentru ce se utilizează**

Levomecol conține două substanțe active: antibioticul cloramfenicol, care inhibă multiplicarea agenților patogeni ai infecției de plagă și diverselor procese purulent-inflamatorii și metiluracilul, care stimulează procesele de regenerare a țesuturilor. Acțiunea antibacteriană se menține și în prezența puroiului și a maselor necrotice.

Levomecol unguent se utilizează în tratamentul plăgilor infectate (inclusiv tăieturi și excoriații) de diversă localizare (inclusiv infectate cu microfloră mixtă) în prima fază a procesului de plagă.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Levomecol**

##### **Nu utilizați Levomecol:**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6);
- la copii cu vârsta până la 1 an.

##### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Levomecol, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

##### **Levomecol împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă utilizați sau ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Interacțiuni cu alte medicamente nu sunt înregistrate.

##### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă,

adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Administrarea medicamentului în sarcină e posibilă numai la indicarea medicului, în cazul dacă beneficiile scontate pentru mamă justifică riscul potențial pentru făt.

La necesitatea utilizării unguentului Levomecol la mamele care alăptează, pe durata tratamentului alăptarea la sân se va întrerupe.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Levomecol nu influențează capacitatea de a conduce vehicule, a folosi utilaje sau efectuarea activităților potențial periculoase, care necesită o concentrare sporită a atenției și reacții psihomotorii rapide.

### **3. Cum să utilizați Levomecol**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Unguentul se aplică cutanat.

Meșele sterile de tifon se îmbibă cu medicament, care se introduc lejer în plagă. Medicamentul poate fi introdus în cavitățile supurate prin cateter (tub de dren) cu ajutorul seringii. În acest caz unguentul în prealabil se încălzește până la temperatura 35-36 °C. Pansamentele se efectuează zilnic până la curățirea completă a plăgii de masele necrotico-purulente.

Durata tratamentului depinde de severitatea și evoluția maladiei.

În caz de plăgi extinse doza zilnică de unguent în recalcul la cloramfenicol nu trebuie să depășească 3 g.

Nu utilizați timp îndelungat Levomecol unguent fără consultarea medicului.

### **Dacă ați utilizat mai mult Levomecol decât trebuie**

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

### **Dacă uitați să utilizați Levomecol**

Nu utilizați o doză dublă de unguent pentru a compensa doza uitată.

Utilizați unguentul, de îndată ce vă amintiți și continuați să-l aplicați în conformitate cu recomandările.

### **Dacă încetați să utilizați Levomecol**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

La utilizarea unguentului sunt posibile următoarele reacții adverse:

*Cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile)*

- reacții alergice (erupții cutanate).

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Levomecol**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați Levomecol unguent după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Levomecol**

*Substanțele active sunt* cloramfenicolul și dioximetiltetrahidropirimidina (metiluracil) .

1 g unguent conține: cloramfenicol – 7,5 mg, dioximetiltetrahidropirimidină (metiluracil) – 40 mg.

*Celelalte componente sunt:* macrogol 1500, macrogol 400.

### **Cum arată Levomecol unguent și conținutul ambalajului**

Levomecol se prezintă sub formă de unguent de culoare albă sau alb-gălbuie.

Levomecol este disponibil în cutii cu 1 tub de aluminiu sau de polietilenă laminată a câte 40 g unguent.

## **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

SA „Nijfarm”, Rusia

603105, or. Nijnii Novgorod,

str. Salganskaya, bl. 7

Tel.: (831) 278-80-88;

Fax: (831) 430-72-28

### **Fabricantul**

SA „Nijfarm”, Rusia

603105, or. Nijnii Novgorod,

str. Salganskaya, bl. 7

## **Acest prospect a fost revizuit în August 2023.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>