

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Aherp 50 mg/g cremă

Aciclovir

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 10 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Aherp cremă și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Aherp cremă
3. Cum să utilizați Aherp cremă
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Aherp cremă
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Aherp cremă și pentru ce se utilizează

Aherp cremă conține o substanță activă numită aciclovir, care face parte din grupa chimioterapice de uz local, antivirale.

Aherp cremă este folosit pentru a trata infecții ale pielii determinate de virusul herpes simplex la nivelul buzelor și feței. Nu se va administra în ochi, în interiorul gurii sau al vaginului.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Aherp cremă

Nu utilizați Aherp cremă:

- Dacă sunteți alergic (hipersensibil) la aciclovir, valaciclovir, propilenglicol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

Dacă nu sunteți sigur, întrebați medicul sau farmacistul înainte să utilizați Aherp cremă.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Aherp cremă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.

Nu se recomandă administrarea la pacienții imunocompromiși. Astfel de pacienți trebuie să consulte medicul în legătură cu tratamentul oricărei infecții.

Aplicați cremă numai pe leziunile cauzate de Herpes simplex pe buze și față. Nu aplicați crema pe mucoase, în special în interiorul gurii, ochi, sau zona genitală, deoarece poate fi iritant. Dacă nu sunteți sigur că aveți herpes labial, consultați medicul dumneavoastră.

Trebuie acordată o atenție deosebită pentru a se evita contactul accidental cu ochii. Spălați bine cu apă caldă în cazul în care crema ajunge în mod accidental în ochi.

Herpesul labial este contagios. Trebuie luate măsuri de precauție pentru a evita o posibilă transmitere a virusului, mai ales în prezența leziunilor active.

Aherp cremă împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente.

Aherp cremă cu alimente, băuturi și alcool

Efectul Aherp cremă nu este influențat de aportul de alimente și băuturi.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Aherp cremă nu trebuie utilizat în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare, decât în cazul în care medicul dumneavoastră consideră că potențialele beneficii ale mamei depășesc posibilitatea apariției unor riscuri la făt.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu există informații privind efectul aciclovirului asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Acest medicament conține **propilenglicol**, care poate provoca iritații ale pielii.

Acest medicament conține **alcool cetostearilic**, care poate provoca reacții adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact).

3. Cum să utilizați Aherp cremă

Utilizați întotdeauna Aherp cremă exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani

Cremă se va aplica pe zona afectată de 5 ori pe zi, la interval de aproximativ 4 ore, cu excepția dozei nocturne. Este important să începeți tratamentul cât mai curând posibil de la debutul infecției, de preferat în perioada prodromală sau în stadiul de eritem. Tratamentul poate fi început și în stadiu mai avansat - papulei sau pustulei.

Tratamentul trebuie continuat timp de cel puțin 4 zile. Dacă nu se vindecă, tratamentul poate fi continuat până la 10 zile. Dacă simptomele afecțiunii nu dispar după 10 zile de tratament, trebuie să consultați un medic.

Trebuie să vă spălați mâinile înainte și după aplicarea cremei și să evitați, dacă nu este necesar, frecarea sau atingerea leziunilor cu prosopul, pentru a evita agravarea sau transmiterea infecției.

Copii

Datele privind siguranța administrării medicamentului la copiii cu vârsta sub 12 ani nu sunt suficiente, astfel se recomandă administrarea la copii cu vârsta peste 12 ani.

Mod de administrare

Calea de administrare: cutanată

Dacă utilizați mai mult Aherp cremă decât trebuie

Dacă se ingeră accidental conținutul unui tub adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitați să utilizați Aherp cremă

Dacă ați uitat să utilizați o doză de cremă, aplicați imediat ce vă aduceți aminte. Apoi, continuați ca mai înainte. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Aherp cremă

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvențele reacțiilor adverse sunt definite după cum urmează:

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):

- senzații de arsură sau înțepătură care durează puțin timp după aplicarea de aciclovir cremă;
- uscăre și cojire ușoară a pielii;
- mâncărime (prurit).

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- roșeață în formă de pete (eritem);
- dermatită de contact (inflamație cauzată de expunerea pielii la contactul cu o substanță) după aplicarea cremei (testele de sensibilitate au arătat că sensibilitatea a fost datorată mai frecvent excipienților din compoziția cremei, decât aciclovirului).

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10.000 persoane):

- alergie imediată (reacții de hipersensibilitate), inclusiv edem angioneurotic (umflături la nivelul pielii și mucoaselor) și urticarie (apariția pe piele a unor bășicuțe de culoare roșie, însoțite de mâncărime).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Aherp cremă

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A nu se congela.

Nu utilizați Aherp cremă după data de expirare înscrisă pe ambalaj după „Exp.”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Aherp cremă

- Substanța activă este aciclovir. Fiecare gram cremă conține 50 mg aciclovir.
- Celelalte componente sunt: parafină albă moale, alcool cetostearilic, propilenglicol, ulei mineral, arlacel 165, poloxamer, laurilsulfat de sodiu, dimeticonă, apă purificată.

Cum arată Aherp cremă și conținutul ambalajului

Aherp cremă se prezintă sub formă de cremă omogenă de culoare albă sau aproape albă.

Câte 2 g cremă în tub din aluminiu. Câte 1 tub în penar. Câte 1 penar împreună cu prospectul pentru pacient în cutie de carton.

Câte 10 g cremă în tub din aluminiu. Câte 1 tub împreună cu prospectul pentru pacient în cutie de carton.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Întreprinderea Mixtă Ucraineană Spaniolă „Sperco Ucraina”

Ucraina, 21027, or. Vinnița, str. 600-letia, 25

Tel.: +380432523049

e-mail: office@sperco.ua

Fabricantul

Întreprinderea Mixtă Ucraineană Spaniolă „Sperco Ucraina”

Ucraina, 21027, or. Vinnița, str. 600-letia, 25

Acest prospect a fost aprobat în septembrie 2025.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>