

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Lysobact Duo Spray cu aromă de mentă 20 mg/1,5 mg/ml spray bucofaringian clorhidrat de lizozim/clorură de cetilpiridiniu

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Lysobact Duo Spray și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Lysobact Duo Spray
3. Cum să luați Lysobact Duo Spray
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Lysobact Duo Spray
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Lysobact Duo Spray și pentru ce se utilizează

Lysobact Duo Spray conține 2 substanțe active numite clorhidrat de lizozim și clorură de cetilpiridiniu.

Acestea aparțin unui grup de medicamente cu efect asupra sistemului respirator – preparate pentru tratamentul bolilor de gât.

Lysobact Duo Spray se utilizează pentru:

Tratamentul local al maladiilor inflamatorii acute ale mucoasei cavității bucale și laringelui, precum gingivite (afecțiuni a gingiilor), stomatite (inflamație a mucoasei cavității bucale), și afte (ulcere mici pe mucoasa gurii).

Tratamentul adjuvant al laringelui sau faringelui dureros, iritat și inflammat.

La recomandarea medicului, în perioada înainte sau după operație (pe tonzile, laringe), și în caz de leziuni sau abcese, precum și după extracție dentară.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Lysobact Duo Spray

Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați alte medicamente, dacă suferiți de o boală cronică, o tulburare a metabolismului, dacă sunteți hipersensibil la medicamente sau ați avut reacții alergice la unele dintre ele.

Nu utilizați Lysobact Duo Spray:

- dacă aveți alergii la clorhidrat de lizozim și clorură de cetilpiridiniu sau oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- dacă aveți alergii la albușul de ou;
- dacă copilul dumneavoastră are vârsta sub 6 ani.

Dacă oricare dintre cele de mai sus este valabil pentru dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest medicament.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Lysobact Duo Spray, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Indicația terapeutică nu justifică o durată de tratament mai lungă de 5 zile, deoarece poate duce la dezechilibrul microflorei normale (bariera naturală de protecție) a cavității bucale cu riscul de dezvoltare de bacterii sau fungi.

Dacă simptomele dumneavoastră durează mai mult de 5 zile și / sau temperatura corpului ridicată apare în același timp, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră

Au fost raportate cazuri de reacții alergice (hipersensibilitate) în asociere cu utilizarea lizozimului. Opriti utilizarea acestui medicament și adresați-vă la un medic în caz de apariție de erupții cutanate, mâncărime sau roșeață a pielii, umflare a feței, buzelor, gurii, limbii sau gâtului, dificultăți de respirație și/sau înghițire. Acestea pot fi semnele reacției alergice la acest medicament și ele necesită ajutor medical.

Lysobact Duo Spray împreună cu alte medicamente

Țineți cont de faptul că această informație se poate referi la medicamentele pe care le mai luați, precum și medicamentele pe care intenționați să le luați în viitor.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu luați simultan mai multe medicamente care conțin antiseptice locale.

Utilizarea de Lysobact Duo Spray cu alimente și băuturi

Alimentele și băuturile nu influențează eficiența Lysobact Duo Spray.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Înainte de a lua acest medicament consultați medicul dumneavoastră sau farmacistului.

Sarcina

Ca măsură de precauție, medicamentul nu se va administra în sarcină

Alăptarea

Deoarece există date insuficiente privind excreția medicamentului în laptele matern, acest preparat nu se recomandă de administrat în perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Lysobact Duo Spray nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Alte atenționări

Acest medicament conține următorii excipienți cu efect dovedit:

Lysobact Duo Spray conține glicerol (85%). Poate provoca cefalee, disconfort gastric și diaree.

Lysobact Duo Spray conține propilenglicol. Poate provoca simptome asemănătoare celor provocate de consumul de alcool.

Lysobact Duo Spray conține parahidroxibenzoat de metil, parahidroxibenzoat de propil. Poate provoca reacții alergice (chiar întârziate).


3. Cum să luați Lysobact Duo Spray

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Mod de administrare

- Se recomandă de utilizat numai la un pacient.
- Înainte de prima utilizare, scoateți capacul de masă plastică de pe pompa de pulverizare.
- După aceasta, inserați pe pompa de pulverizare aplicatorul de pulverizare prin apăsare ușoară.

- Aplicatorul poate fi deplasat lateral și se va asigura aplicarea corectă a spray-ului în cavitatea bucală.
- Aplicatorul se va întoarce în sus la un unghi drept față de flacon.
- Înainte de prima aplicare, se va apăsa de câteva ori pe pompa de pulverizare până ce jetul spray-ului devine omogen.
- Deschideți larg cavitatea bucală, direcționați aplicatorul spre zona afectată și apăsați pompa de pulverizare de câte ori se recomandă.
- Rețineți respirația în timpul pulverizării. Nu înghițiți.
- După administrarea preparatului, îndreptați în jos aplicatorul pentru a bloca pulverizarea.



Doze

Pentru o singură dozare, se recomandă de apăsat pompa de pulverizare de 5 ori.

Procedura poate fi repetată de 3-6 ori pe zi, cu interval de minim 2 ore dintre prize.

Lysobact Duo Spray, spray bucofaringian nu se recomandă de administrat la copiii cu vârsta sub 6 ani.

Durata tratamentului

Durata tratamentului este limitată la 5 zile.

Dacă utilizați mai mult Lysobact Duo Spray decât trebuie

Dacă aplicați mai mult Lysobact Duo Spray decât trebuie, contactați imediat medicul dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă aplicați mai mult spray decât trebuie, contactați medicul dumneavoastră și el vă va oferi asistență

Dacă uitați să utilizați Lysobact Duo Spray

Nu luați o cantitate dublă de medicament pentru a compensa doza uitată.

Dacă ați uitat să luați o doză de medicament, nu utilizați doza dublă după aceea, dar continuați utilizarea conform cu schema de dozare uzuală

Dacă încetați să utilizați Lysobact Duo Spray

Utilizați acest medicament atât timp cât v-a recomandat medicul dumneavoastră. Dacă încetați brusc utilizarea acestui medicament, nu sunt așteptate efecte negative.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea Lysobact Duo Spray, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, Lysobact Duo Spray poate provoca reacții adverse.

Foarte frecvente (afectează mai mult de 1 utilizator din 10)

Frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 100)

Mai puțin frecvente (afectează 1 până la 10 utilizatori din 1000)

Rare (afectează 1 până la 10 utilizatori din 10000)

Foarte rare (apar la mai puțin de 1 din 10000 persoane)

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Foarte rare: reacții de hipersensibilitate, inclusiv reacții anafilactice, edem angioneurotic (edem Quincke) și șoc anafilactic. Aceste reacții se caracterizează prin umflarea feței, buzelor, gurii, limbii sau gâtului și pot fi urmate de respirație dificilă și lipsă de respirație (bronhoconstricție), precum și o scădere a tensiunii arteriale și senzație de slăbiciune (complicații circulatorii).

Cu frecvență necunoscută: erupții cutanate, prurit, urticarie.

În plus, au fost raportate cazuri izolate de reacții cutanate severe, cum ar fi eritemul multiform și sindromul Stevens-Johnson, dintre care unele pot pune viața în pericol.

Aceste reacții sunt urmate de roșeață severă, vezicule a pielii și / sau exfoliere.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Lysobact Duo Spray

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A nu se congela.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Lysobact Duo Spray

1 ml soluție conține:

substanțe active: clorhidrat de lizozim 20 mg, clorură de cetilpiridiniu 1,5 mg. O apăsare pe pompa de pulverizare se eliberează 0,20 ml soluție ce conține 4 mg de lizozim, 0,3 mg cetilpiridiniu.

celelalte componente sunt: glicerol 85%, propilenglicol, parahidroxibenzoat de metil, parahidroxibenzoat de propil, zaharină sodică, aromă de mentă, hidroxid de sodiu, apă purificată.

Cum arată Lysobact Duo Spray și conținutul ambalajului

Soluție incoloră până la galben-pal, cu aromă de izmă bună.

Este disponibil câte 1 flacon de sticlă de culoare brună cu pompă de pulverizare și aplicator de pulverizare, împreună cu prospectul pentru utilizator în cutie de carton.

Câte 30 ml soluție în flacon.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry, Joint Stock Company, Sarajevo, Jukiceva 53, Bosnia și Herțegovina.

Fabricantul

Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry, Joint Stock Company, Sarajevo, Jukiceva 53, Bosnia și Herțegovina.

Acest prospect a fost revizuit în August 2021.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>