

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

GLICISED 100 mg comprimate

Glicină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este GLICISED și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați GLICISED
3. Cum să utilizați GLICISED
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează GLICISED
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE GLICISED ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

GLICISED conține glicină în calitate de substanță activă.

Aminoacidul glicina este un metabolit natural, care reglează procesele metabolice în creier, reduce tensiunea psihoemoțională, crește capacitatea de muncă intelectuală. Manifestă acțiune de protecție a creierului, antistres, calmantă, ameliorează metabolismul cerebral, normalizează somnul, reduce acțiunea toxică a alcoolului. Nu provoacă dependență.

GLICISED se utilizează:

- în stările astenice (oboseală intensă și prelungită), distonie neurocirculatorie (oscilări ale tensiunii arteriale);
- pentru creșterea capacității de muncă intelectuală (ca medicament care ameliorează procesele de gândire și capacitatea de a percepe și memoriza informația);
- în cadrul terapiei complexe în tensiune psihoemoțională, irascibilitate sporită, stări depresive, pentru normalizarea somnului;
- ca remediu care reduce dependența de alcool și micșorează manifestările sindromului de abținere alcoolică;
- în diverse afecțiuni funcționale și organice ale sistemului nervos central (tulburări cerebrale vasculare, infecții ale sistemului nervos central, consecințele traumelor cranio-cerebrale, encefalopatii perinatale (afecțiuni ale creierului în perioadă care precedă sau succedă imediat nașterii) și alte forme, inclusiv de geneză alcoolică).

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI GLICISED

Nu utilizați GLICISED

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la glicină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);

- dacă aveți tensiune arterială joasă;
- copiilor cu vârsta sub 3 ani.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați GLICISED, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă sunteți predispus la tensiune arterială joasă, medicul vă va monitoriza valoarea tensiunii arteriale și la necesitate vă va reduce doza. Dacă ea scade sub nivelul uzual, întrerupeți utilizarea medicamentului.

Copii

Medicamentul se indică copiilor cu vârsta peste 3 ani.

GLICISED împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați luat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv eliberate fără prescripția medicului.

Spuneți medicului dumneavoastră, dacă utilizați:

- remedii hipnotice (utilizate în tulburări de somn);
- remedii tranchilizante (utilizate pentru calmarea neliniștii);
- remedii antipsihotice (utilizate în boli psihice).

La asocierea GLICISED cu aceste medicamente cu are loc potențarea acțiunii deprimante asupra sistemului nervos central.

GLICISED reduce toxicitatea remediilor anticonvulsivante (utilizate în epilepsie), antipsihotice (utilizate în boli psihice), antidepresive (utilizate în depresie).

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Acțiunea medicamentului GLICISED asupra organismului în sarcină și perioada de alăptare nu s-a studiat detaliat, de aceea nu se recomandă administrarea lui.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Este necesar să fiți precauți în caz de conducere a autovehiculelor, precum și la exercitarea altor activități potențial periculoase.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI GLICISED

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Administrare bucofaringiană (în cavitatea bucală) și sublinguală (sub formă de comprimate sau pulbere după mărunțirea comprimatului).

Copiiilor cu vârsta peste 3 ani, adolescenților și adulților în caz de scădere a capacității de muncă intelectuală GLICISED se indică câte 1 comprimat (100 mg) de 2-3 ori pe zi timp de 14-30 zile.

Doza zilnică maximă constituie 300 mg.

Copiiilor cu vârsta peste 3 ani și adulților cu hiperexcitabilitate, labilitate emoțională se indică câte 1 comprimat de 2-3 ori pe zi, cura de tratament – 7-14 zile. La necesitate cura de tratament se repetă.

În tulburări de somn se indică câte 50-100 mg cu 20 minute înainte de somn sau nemijlocit înainte de somn.

În caz de accident vascular cerebral ischemic și tulburări ale circulației cerebrale se indică 1 g GLICISED bucofaringian sau sublingual (la necesitate comprimatul se va fărâmița) în primele 3-6 ore după dezvoltarea accidentului vascular cerebral, ulterior – timp de 1-5 zile câte 1 g pe zi, apoi timp de 6-30 zile – câte 1-2 comprimate de 3 ori pe zi.

În tratamentul alcoolismului se indică ca remediu adjuvant câte 1 comprimat de 2-3 ori pe zi timp de 14-30 zile. La necesitate cura de tratament se repetă de 4-6 ori pe an.

Dacă utilizați mai mult GLICISED decât trebuie

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă ați utilizat mai mult GLICISED decât v-a fost recomandat de către medic.

Până în prezent nu au fost descrise efecte datorate supradozajului la om.

Dacă uitați să utilizați GLICISED

Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuați tratamentul așa cum v-a fost prescris de către medic.

Dacă încetați să utilizați GLICISED

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

De obicei medicamentul este bine tolerat. În caz de hipersensibilitate individuală e posibilă apariția următoarelor reacții adverse:

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile):

- erupții pe piele, mâncărime, urticarie;
- iritarea nasului, gâtului și a ochilor;
- înrăutățirea concentrației atenției, dureri de cap, tensiune nervoasă, iritare;
- indigestie, dureri de stomac, grețuri;
- oboseală.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ GLICISED

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține GLICISED

- *Substanța activă* este glicina.

1 comprimat conține glicină în recalcul la 100% substanță – 100 mg.

- *Celelalte componente sunt:* copolimer de metacrilat de amoniu dispersie, în recalcul la substanță 100%, ceară montanglicol, povidonă, stearat de calciu.

Cum arată GLICISED și conținutul ambalajului

GLICISED se prezintă sub formă de comprimate de culoare aproape albă sau albă cu nuanță crem, rotunde, cu suprafață plată și margini teșite. Pe suprafața comprimatelor e posibilă marmorare.

GLICISED este disponibil în cutii cu 5 blistere a câte 10 comprimate.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Kievmedpreparat SAP,
str. Saksaganskogo, 139, 01032, or. Kiev, Ucraina.

Fabricantul

Kievmedpreparat SAP,
str. Saksaganskogo, 139, 01032, or. Kiev, Ucraina.

Acest prospect a fost revizuit în Mai 2022.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>