

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Vizarsin Q-Tab 50 mg comprimate orodispersabile Vizarsin Q-Tab 100 mg comprimate orodispersabile Sildenafil

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Vizarsin Q-Tab și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Vizarsin Q-Tab
3. Cum să utilizați Vizarsin Q-Tab
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Vizarsin Q-Tab
6. Conținutul ambalajului și alte informații.

1. Ce este Vizarsin Q-Tab și pentru ce se utilizează

Vizarsin Q-Tab conține substanța activă sildenafil care aparține grupului de medicamente denumite inhibitori ai fosfodiesterazei de tip 5 (PDE5). Vizarsin Q-Tab acționează prin relaxarea vaselor de sânge de la nivelul penisului, favorizând circulația sângelui în penis atunci când sunteți excitat sexual. Vizarsin Q-Tab vă ajută să obțineți o erecție numai dacă sunteți stimulat sexual.

Vizarsin Q-Tab este destinat bărbaților adulți cu disfuncție erectilă, cunoscută uneori și sub denumirea de impotență. Această afecțiune constă în lipsa sau în imposibilitatea menținerii erecției penisului în vederea desfășurării actului sexual.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Vizarsin Q-Tab

Nu utilizați Vizarsin Q-Tab:

- Dacă sunteți alergic la sildenafil sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).
- Dacă utilizați medicamente denumite nitrați, deoarece această asociere poate duce la o scădere periculoasă a tensiunii arteriale. Informați medicul dacă luați oricare dintre aceste medicamente care sunt de obicei administrate pentru tratamentul anginei pectorale (“dureri în piept”). Dacă nu sunteți sigur, întrebați medicul dumneavoastră sau farmacistul.
- Dacă utilizați oricare dintre medicamentele cunoscute sub numele de donori de oxid nitric, cum este nitritul de amil deoarece această asociere poate duce la o scădere periculoasă a tensiunii arteriale.
- Dacă luați riociguat. Acest medicament este utilizat pentru tratarea hipertensiunii arteriale pulmonare (de exemplu, tensiune mare a sângelui la nivelul plămânilor) și a hipertensiunii pulmonare tromboembolice cronice (de exemplu, tensiune mare a sângelui la nivelul plămânilor, secundar cheagurilor de sânge). Inhibitorii de PDE5, cum este

Vizarsin, s-au dovedit a mări efectul hipotensor al acestui medicament. Dacă luați riociguat sau nu sunteți sigur de acest lucru, spuneți medicului dumneavoastră

- Dacă aveți o afecțiune cardiacă sau hepatică severă.
- Dacă ați avut recent un accident vascular cerebral sau infarct miocardic, sau aveți hipotensiune arterială.
- Dacă aveți din naștere anumite boli rare de ochi (cum este retinita pigmentară).
- Dacă ați avut vreodată pierderea vederii datorită neuropatiei optice anterioare ischemice, nonarteritice (NOAIN).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Vizarsin Q-Tab adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- Dacă aveți siclemie (o boală a globulelor roșii din sânge), leucemie (cancer al celulelor din sânge), mielom multiplu (cancer al măduvei osoase).
- Dacă aveți o deformare a penisului sau Boala Peyronie.
- Dacă aveți boli de inimă. Medicul dumneavoastră trebuie să examineze cu atenție dacă starea inimii dumneavoastră permite susținerea efortului suplimentar al actului sexual.
- Dacă aveți ulcer gastric activ sau tulburări de sângerare (cum este hemofilia).
- Dacă aveți un episod brusc de scădere sau pierdere a vederii, nu mai luați Vizarsin Q-Tab și contactați imediat medicul.

Nu trebuie să utilizați Vizarsin Q-Tab împreună cu orice alt tratament administrat pe cale orală sau local pentru disfuncția erectilă.

Nu trebuie să utilizați Vizarsin Q-Tab împreună cu tratamente pentru tensiune arterială pulmonară mare (HAP) care conțin sildenafil sau orice alt inhibitor de PDE5.

Nu trebuie să utilizați Vizarsin Q-Tab dacă nu aveți disfuncție erectilă.

Nu trebuie să utilizați Vizarsin Q-Tab dacă sunteți femeie.

Informații speciale pentru pacienții cu afecțiuni ale rinichilor sau ficatului

Trebuie să vă informați medicul dacă suferiți de afecțiuni ale rinichilor sau ficatului. Medicul dumneavoastră vă poate stabili o doză mai mică.

Copii și adolescenți

Vizarsin Q-Tab nu trebuie administrat persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

Vizarsin Q-Tab împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Vizarsin Q-Tab poate interfera cu acțiunea altor medicamente, în special cu cele utilizate pentru durerile în piept. În cazul oricăror urgențe medicale, trebuie să informați medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală, că ați utilizat Vizarsin Q-Tab și când ați utilizat. Nu utilizați alte medicamente în același timp cu Vizarsin Q-Tab decât cu permisiunea medicului dumneavoastră.

Nu trebuie să luați Vizarsin Q-Tab dacă luați medicamente denumite nitrați deoarece asocierea acestor medicamente poate duce la o scădere periculoasă a tensiunii arteriale. Informați medicul, farmacistul sau asistenta medicală dacă luați oricare dintre aceste medicamente care se administrează frecvent pentru tratamentul anginei pectorale (“dureri în piept”).

Nu trebuie să luați Vizarsin Q-Tab dacă utilizați oricare dintre medicamentele cunoscute sub numele de donori de oxid nitric, cum este nitritul de amil deoarece această asociere poate duce la o scădere periculoasă a tensiunii arteriale.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați deja riociguat.

Dacă utilizați în același timp medicamente cunoscute sub numele de inhibitori de protează, medicamente utilizate pentru tratamentul infecției cu HIV, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă recomande să începeți cu cea mai mică doză de Vizarsin Q-Tab (25 mg).

Unii pacienți care utilizează medicamente blocante alfa-adrenergice pentru tratarea hipertensiunii arteriale sau pentru mărirea prostatei pot avea amețeli sau stare de confuzie care pot fi determinate de o scădere a tensiunii arteriale care apare atunci când stați în picioare sau când vă ridicați în picioare prea brusc. Unii pacienți au avut aceste manifestări când au luat Vizarsin Q-Tab în același timp cu medicamente alfa-blocante. Manifestările apar cel mai frecvent în primele 4 ore de la administrarea de Vizarsin Q-Tab. Pentru a reduce probabilitatea apariției acestor simptome, tratamentul cu medicamentul alfa-blocant trebuie urmat cu o doză zilnică constantă înainte de a începe tratamentul cu Vizarsin Q-Tab. Medicul s-ar putea să vă recomande să începeți tratamentul cu Vizarsin Q-Tab cu o doză mai mică (25 mg).

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați medicamente care conțin sacubitril/valsartan, utilizate pentru tratarea insuficienței cardiace.

Vizarsin Q-Tab împreună cu alimente, băuturi și alcool

Vizarsin Q-Tab poate fi luat cu sau fără alimente. Cu toate acestea, puteți observa că Vizarsin Q-Tab poate începe să acționeze mai târziu când este luat împreună cu o masă copioasă. Trebuie să nu aveți nimic în gură când luați Vizarsin Q-Tab.

Consumul de băuturi alcoolice poate afecta temporar capacitatea de a obține o erecție. Pentru a beneficia la maximum de efectele medicamentului, vă sfătuim să nu consumați cantități excesive de băuturi alcoolice înainte de a utiliza Vizarsin Q-Tab.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Vizarsin Q-Tab nu este destinat utilizării de către femei.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Vizarsin Q-Tab poate produce amețeli sau tulburări de vedere. Trebuie să știți cum reacționați la administrarea Vizarsin Q-Tab înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Vizarsin Q-Tab conține aspartam (E951) și zaharoză

Vizarsin Q-Tab 50 mg conține aspartam 0,75 mg în fiecare comprimat orodispersabil.

Vizarsin Q-Tab 100 mg conține aspartam 1,5 mg în fiecare comprimat orodispersabil.

Aspartamul este o sursă de fenilalanină. Acesta poate fi dăunător dacă aveți fenilcetonurie (PKU), o afecțiune genetică rară, în care fenilalanina se acumulează, deoarece organismul nu o poate elimina în mod corespunzător.

Vizarsin Q-Tab conține zaharoză. Dacă medicul v-a comunicat că aveți intoleranță la unele glucide, trebuie să-l contactați înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să utilizați Vizarsin Q-Tab

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată de start este de 50 mg.

Nu trebuie să utilizați Vizarsin Q-Tab mai mult de o dată pe zi.


Nu utilizați comprimatele orodispersabile Vizarsin Q-Tab în combinație cu alte forme farmaceutice ale Vizarsin Q-Tab.

Trebuie să utilizați Vizarsin Q-Tab cu aproximativ o oră înainte de momentul în care intenționați să aveți un contact sexual.


Comprimatele orodispersabile Vizarsin Q-Tab sunt fragile. Nu trebuie presate prin blister, deoarece se pot deteriora. Nu manipulați comprimatele cu mâinile umede, deoarece se pot sfărâma.

Scoateți comprimatele din blister conform recomandărilor de mai jos:

Pentru blisterele ce conțin 1 comprimat:



Pentru blisterele ce conțin 4 comprimate:



1. Apucați blisterul de margini și separați o celulă de celelalte, trăgând atent de-a lungul perforațiilor din jurul celulei.
2. Ridicați marginea foliei și detașați folia complet.
3. Scoateți comprimatul din celulă.
4. Plasați comprimatul pe limbă cât mai curând posibil după scoaterea acestuia din blister.

În câteva secunde comprimatul începe să se dezintegreze în cavitatea bucală și poate fi înghițit cu sau fără apă. Nu trebuie să aveți nimic în gură înainte de a plasa comprimatul pe suprafața limbii.

Dacă simțiți că Vizarsin Q-Tab acționează prea slab sau prea puternic, informați medicul dumneavoastră sau farmacistul.

Vizarsin Q-Tab vă ajută să obțineți erecția doar dacă sunteți stimulat sexual. Timpul necesar ca Vizarsin Q-Tab să acționeze diferă de la persoană la persoană, dar în mod obișnuit este cuprins între o jumătate de oră și o oră. Puteți observa că Vizarsin Q-Tab își face efectul într-un timp mai îndelungat dacă este luat după o masă bogată.

Dacă Vizarsin Q-Tab nu vă ajută să obțineți erecția sau dacă erecția nu persistă suficient de mult timp pentru a permite finalizarea actului sexual, trebuie să informați medicul dumneavoastră.

Dacă utilizați mai mult Vizarsin Q-Tab decât trebuie

senzație de somnolență, reducerea sensibilității tactile, vertij, zgomote în urechi, senzație de gură uscată, sinusuri blocate sau înfundate, inflamația mucoasei nazale (simptomele includ nas care curge, strănut și nas înfundat), dureri în partea superioară a abdomenului, boală de reflux gastroesofagian, (simptomele includ arsuri ale stomacului), sânge în urină, dureri ale brațelor sau picioarelor, sângerări nazale, senzație de căldură și senzație de oboseală.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane): leșin, accident vascular cerebral, infarct miocardic, bătăi neregulate ale inimii, reducerea temporară a circulației sângelui în unele zone ale creierului, senzație de constricție la nivelul gâtului, gură amorțită, sângerare în partea posterioară a ochiului, vedere dublă, acuitate vizuală redusă, senzații neobișnuite la nivelul ochiului, umflarea ochiului sau pleoapei, vederea unor mici particule sau pete, halouri în jurul luminilor, dilatația pupilei ochiului, decolorarea regiunii albe a ochiului, sângerări la nivelul penisului, prezența de sânge în spermă, nas uscat, umflarea regiunii interioare a nasului, senzație de iritabilitate și scăderea sau pierderea bruscă a auzului.

În cadrul experienței după punerea pe piață, cazurile de angină instabilă (afecțiune a inimii) și moarte subită au fost raportate rar. De notat că majoritatea, dar nu toți bărbații la care au apărut aceste reacții, sufereau de probleme cardiace înainte de a lua medicamentul. Nu a fost posibil să se determine dacă aceste evenimente au fost legate direct de utilizarea Vizarsin Q-Tab.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Vizarsin Q-Tab

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau pe blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a respectivei luni.

A se păstra la temperaturi sub 30 °C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Vizarsin Q-Tab

- Substanța activă este sildenafil. Fiecare comprimat orodispersabil conține sildenafil 50 mg sau 100 mg.
- Celelalte componente sunt: hidroxipropilceluloză (E463), manitol (E421), aspartam (E951), neohesperidin-dihidrochalcon (E959), aromă de mentă creață, aromă de mentă (conține de asemenea zaharoză), crospovidonă, silicat de calciu, stearat de magneziu (E470b).

Vezi pct.2 „Vizarsin conține aspartam (E951) și zaharoză”.

Cum arată Vizarsin Q-Tab și ce conține ambalajul

Comprimatele orodispersabile Vizarsin Q-Tab sunt rotunde, ușor biconvexe, de culoare albă până la aproape albă, cu incluziuni posibile de culoare mai întunecată.

Comprimatele orodispersabile Vizarsin Q-Tab sunt ambalate în cutii cu blistere conținând:

- 1 sau 2 comprimate orodispersabile (1 sau 2 blistere a câte 1 comprimat) în cutie;
- 4 comprimate orodispersabile (1 blister a câte 4 comprimate) în cutie.

Deținătorul Certificatului de Înregistrare și Fabricantul

Deținătorul Certificatului de Înregistrare

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Fabricantul

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2024

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>