

Prospect: Informații pentru utilizator**METEOSPASMYL 60 mg/300mg capsule moi**
citrat de alverină/ simeticonă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Meteospasmyl și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Meteospasmyl
3. Cum să utilizați Meteospasmyl
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Meteospasmyl
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Meteospasmyl și pentru ce se utilizează

Meteospasmyl este un medicament pentru tulburări funcționale intestinale.

Meteospasmyl este indicat adulților pentru:

- ameliorarea simptomatologiei gastro-intestinale, indusă de acumularea excesivă de gaze în intestin, de exemplu, flatulența.

Simptomatologia determinată de acumularea de gaze în tractul gastro-intestinal poate fi un semn al tulburărilor funcționale de la acest nivel, manifestându-se ca presiune sau balonare, plenitudine, eructație, mișcări peristaltice intestinale și flatulență.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Meteospasmyl**Nu utilizați Meteospasmyl:**

- dacă sunteți alergic la alverină, simeticonă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Meteospasmyl, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Meteospasmyl împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Meteospasmyl împreună cu alimente, băuturi și alcool

Nu se cunosc interacțiuni cu alimente și bauturi.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu există date disponibile de teratogenoză la animale. Din punct de vedere clinic, până în prezent, nu a apărut nicio malformație la făt. De asemenea, urmărirea gravidelor expuse la alverină este insuficientă pentru excluderea riscului.

În consecință, pentru precauție, este preferabil să nu se utilizeze alverină în timpul sarcinii.

În absența datelor disponibile privind trecerea acestui medicament în laptele matern, acesta nu trebuie utilizat pe perioada sarcinii.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Meteospasmyl nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Meteospasmyl

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este de:

Adulți: o capsulă de 2-3 ori pe zi, înainte de masă.

Dacă ați luat mai mult Meteospasmyl decât trebuie

Până în prezent, nu s-au raportat cazuri de intoxicație cu simeticonă.

Dacă uitați să utilizați Meteospasmyl

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Datorită prezenței alverinei, au fost observate :

- cazuri rare de urticarie, uneori cu edemul laringelui, șoc
- cazuri rare de afectare hepatică, care se remite la întreruperea tratamentului

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Meteospasmyl

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu utilizați Meteospasmyl după data de expirare înscrisă pe cutie și blister după EXP.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Meteospasmyl

- Substanțele active sunt: citratul de alverină și simeticona. Fiecare capsulă moale conține citrat de alverină 60 mg și simeticonă 300 mg.
- Celelalte componente sunt: gelatină, glicerol, dioxid de titan (E171), apă purificată.

Cum arată Meteospasmyl și conținutul ambalajului

Meteospasmyl se prezintă sub formă de capsule moi de culoare albă strălucitoare, care conțin o suspensie densă de culoare albă.

Este disponibil în cutii cu trei blistere din PVC/Al a câte 10 capsule moi.

Deținătorul Autorizației de punere pe piață și fabricantul

Laboratoires MAYOLY SPINDLER,
6 Avenue de l'Europe – BP 51, 78401 Chatou Cedex
Franța

Acest prospect a fost revizuit în iulie 2019.