

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

QUANIL 500 mg comprimate filmate

Citicolină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca ale dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Quanil și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Quanil
3. Cum să utilizați Quanil
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Quanil
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Quanil și pentru ce se utilizează

Quanil aparține unui grup de medicamente numite psihostimulante și nootrope, care acționează prin ameliorarea funcției cerebrale.

Quanil este utilizat în caz de:

- accident vascular cerebral, afecțiuni cerebrale vasculare în faza acută, tratamentul complicațiilor și sechelelor afecțiunilor cerebrale vasculare;
- traumatism cranio-cerebral și sechelele neurologice ale acestuia;
- tulburări cognitive și de comportament, cauzate de afecțiuni cronice cerebrale vasculare și degenerative.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Quanil

Nu utilizați Quanil dacă:

- sunteți hipersensibil (alergic) la citicolină sau la oricare dintre excipienții din compoziția medicamentului, enumerați la punctul 6;
- dacă suferiți de tonus crescut al sistemului nervos parasimpatic (stare clinică însoțită de tensiune arterială sever scăzută, transpirație, tahicardie și leșin).

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Quanil. Dozele mari de citicolină pot agrava creșterea fluxului sanguin cerebral în episoadele de hemoragie intracraniană persistentă.

Copii

Nu există date privind utilizarea medicamentului la copii.

Acest medicament conține lactoză. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Quanil împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Quanil crește efectele L-Dopa, prin urmare nu trebuie să administrați acest medicament concomitent cu medicamente care conțin L-Dopa fără a vă consulta cu medicul dumneavoastră. Medicamentele cu conținut de L-Dopa sunt, de obicei, utilizate pentru tratamentul bolii Parkinson.

Quanil nu trebuie administrat împreună cu medicamente care conțin meclofenoxat (un stimulant cerebral).

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, încercați să rămâneți gravidă sau alăptați.

Administrarea acestui medicament în timpul sarcinii și perioada de alăptare este posibilă numai în cazul în care beneficiul terapeutic așteptat pentru mamă depășește riscul potențial pentru făt sau sugar.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

În unele cazuri pot apărea reacții adverse din partea sistemului nervos central care vă pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule sau de a folosi utilaje.

Prin urmare, în timpul tratamentului trebuie să manifestați prudență în timpul conducerii autovehiculelor sau folosirii utilajelor.

3. Cum să luați Quanil

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a indicat medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Adulți

Doza și durata tratamentului depind de severitatea afectării cerebrale și va fi determinată în mod individual de către medicul dumneavoastră.

Doza recomandată pentru adulți este de 500 mg până la 2000 mg pe zi (1-4 comprimate) în funcție de severitatea simptomelor.

Copii

Nu există date privind siguranța utilizării acestui medicament la copii. Prin urmare, acest medicament nu trebuie utilizat la acest grup de pacienți.

Dacă utilizați mai mult Quanil decât trebuie

Dacă ați luat sau credeți că ați luat mai mult Quanil decât trebuie (supradozaj), spuneți imediat medicului dumneavoastră sau prezentați-vă la cea mai apropiată unitate medicală. Aduceți comprimatele rămase cu dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați Quanil

Dacă uitați să luați medicamentul sau ați luat o doză mai mică decât cea recomandată de medicul dumneavoastră nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată; așteptați momentul stabilit pentru administrarea următoarei doze și continuați tratamentul așa cum v-a prescris medicul dumneavoastră.

Dacă încetați să luați Quanil

Medicul dumneavoastră vă va comunica despre durata tratamentului cu Quanil. Nu întrerupeți tratamentul înainte de a vă consulta cu medicul dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse asociate cu acest medicament sunt foarte rare (pot apărea la mai puțin de 1 din 10000 de pacienți).

Reacțiile adverse posibile includ: halucinații, cefalee severă, vertij, hipertensiune arterială, hipotensiune arterială, dispnee, greață, vomă, diaree periodică, erupții cutanate, hiperemie, exantem, purpură, frisoane, edem.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse posibile nemenționate în acest prospect. Puteți raporta, de asemenea, reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, disponibil pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: www.amdm.gov.md sau prin e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Quanil

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Quanil

Substanța activă este citicolina. Fiecare comprimat conține 500 mg citicolină (sub formă de citicolină sodică).

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină PH101, povidonă K-90, croscarmeloză sodică, dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu, Opadry 03F58750 alb (HPMC 2910/Hipromeloză, dioxid de titan, macrogol/PEG, talc).

Cum arată Quanil și conținutul ambalajului

Quanil se prezintă sub formă de comprimate de culoare albă, formă ovală, plane.

Quanil este disponibil în cutii de carton ce conțin 1 blister din Al/Al cu 10 comprimate filmate și prospectul pentru pacient.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Kusum Healthcare Private Limited,
SP-289 (A) RIICO, Industrial Area, Chopanki,
Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), India

Fabricantul

Kusum Healthcare Private Limited,
SP-289 (A) RIICO, Industrial Area, Chopanki,
Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan), India

Acest prospect a fost aprobat în octombrie 2023

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amgm.gov.md>