

## Prospect: informații pentru consumator/pacient

Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție  
Minoxidil

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 4 luni nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

### Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție
3. Cum să utilizați Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție
6. Conținutul ambalajului și alte informații

### 1. Ce este Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție și pentru ce se utilizează

Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție aparține unui grup de agenți anti-alopécie (medicamente pentru stimularea creșterii părului).

Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție este un medicament utilizat pentru tratarea căderii ereditare comune a bărbaților cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, prin prevenirea pierderii ulterioare a părului și ajutând creșterea părului. Acest medicament conține **minoxidil**, considerat a îmbunătăți fluxul de sânge către foliculii de păr (celule din care crește părul) de pe scalp.

- Medicamentul este utilizat numai la bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.
- Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție funcționează cel mai bine la bărbații cu căderea părului sau subțierea în partea superioară a scalpului
- Cei care sunt mai tineri, au pierdut părul pentru o perioadă scurtă de timp sau au o zonă mică de chelie sunt susceptibili să aibă cele mai bune rezultate
- Este puțin probabil să aveți beneficiu la aplicarea de Pilfud 50 mg/ml spray cutanat, soluție dacă ați fost chel de mulți ani sau aveți o suprafață mare de cădere a părului.

Pierderea ereditară a părului poate fi recunoscută deoarece:

- este un model de pierdere a părului
- ea începe treptat și progresează
- aveți un istoric familial de pierdere a părului
- nu există alte simptome decât pierderea părului

### 2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție

Acest medicament este potrivit pentru majoritatea oamenilor, dar careva persoane nu ar trebui să îl utilizeze. Dacă nu sunteți sigur, spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **Nu utilizați Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție:**

- dacă sunteți alergic minoxidil sau oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- dacă sunteți femeie;
- dacă aveți vârsta mai mică de 18 ani sau mai mare de 65 ani;
- dacă nu sunteți sigur că pierderea părului este ereditară;
- dacă ați pierdut părul datorită administrării unor medicamente;
- dacă aveți chelie totală sau pierderea completă a părului pe întregul corp;
- în cazul în care cauza căderii părului este necunoscută, sau este bruscă și neașteptată;
- dacă aveți tensiunea arterială crescută (tratată sau netratată);
- dacă aveți orice boală care afectează scalpul, inclusiv arsuri solare și psoriazis;
- dacă aveți scalpul ras;
- dacă utilizați concomitent creme, unguente sau loțiuni folosite pentru a trata bolile de scalp, precum: ditranol (pentru psoriazis), tretinoină (pentru tratarea acneei sau a altor boli de piele), corticosteroizi (medicamente antiinflamatorii), vaselină - un ingredient frecvent în ceara de păr sau gel;
- dacă aveți pansament ocluziv pe scalp;
- dacă nu știți că scalpul este normal și sănătos.

Dacă vreun punct enumerate mai sus se aplică la moment sau în trecut pentru dumneavoastră, solicitați sfatul unui medic sau farmacist înainte de a utiliza Pilfud 50 mg/ml, spray, cutanat soluție.

### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- dacă nu sunteți sigur că scalpul este normal și sănătos;
- dacă suferiți de boli de inimă, inclusiv ritmuri sau rate anormale ale inimii, angină pectorală sau dureri în piept și/sau tulburări de circulație;
- dacă luați sau utilizați orice alte medicamente, inclusiv: anumite medicamente împotriva tensiunii arteriale crescute numite " vasodilatatoare " de ex hidralazina. Există un risc potențial că minoxidil, substanța activă în Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție, poate interacționa cu aceste medicamente și crește efectul lor.

Dacă nu sunteți sigur cu privire la medicamentele pe care le luați sau utilizați, arătați flaconul sau ambalajul farmacistului.

Dacă vreun punct enumerat mai sus se aplică la moment sau în trecut pentru dumneavoastră, spuneți medicului sau farmacistului.

### **Atenționări speciale**

- Dacă minoxidil trece în fluxul sanguin poate provoca unele efecte adverse legate de tensiunea arterială scăzută, cum ar fi dureri în piept, bătăi rapide ale inimii, leșin, amețeli, umflarea mâinilor și picioarelor sau roșeață sau iritare a scalpului. Dacă prezentați oricare dintre aceste reacții adverse, întrerupeți utilizarea medicamentului și spuneți medicului dumneavoastră. Atunci când se utilizează Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție așa cum este recomandat, este foarte puțin probabil ca aceste efecte se vor dezvolta. Totuși, există o șansă ca medicamentul ar putea ajunge în fluxul de sânge în cazul în care acesta este folosit în doze mari sau în cazul în care există o afecțiune a scalpului, cum ar fi psoriazisul prezent. Prin urmare, este foarte important să utilizați medicamentul așa cum este recomandat și urmați instrucțiunile foarte atent.
- Avertizare: lichid inflamabil. A se păstra departe de căldură / scântei / flăcări deschise / suprafețe fierbinți. Fumatul este interzis. A se evita expunerea recipientului și conținutul la flăcări deschise în timpul utilizării, păstrării și eliminării. A se păstra recipientul închis ermetic. A se păstra în locuri bine ventilate.

- A se evita contactul cu ochii, gura, pielea lezată și zonele sensibile. În cazul în care soluția este aplicată în mod accidental pe alte zone ale corpului, decât pielea capului, se spală bine cu multă apă.
- Nu trebuie să fie aplicat pe alte părți ale corpului, decât pe zona scalpului.
- Depășirea dozei recomandate nu va re-crește părul dumneavoastră mai repede și aveți un risc crescut de a avea reacții adverse.
- Ingestia accidentală poate provoca reacții adverse cardiace grave. Prin urmare, nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

### **Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție împreună cu alte medicamente.**

***Țineți cont de faptul că această informație se poate referi la medicamentele pe care le mai utilizați, precum și medicamentele pe care intenționați să le utilizați în viitor.***

*Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.*

Utilizarea concomitentă de Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție și altor medicamente pentru aplicare superficială, care conțin glucocorticosteroizi, tretionină, ditranol sau vaselină, pot intensifica absorbția minoxidilului (vezi pct. Nu utilizați Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție).

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați anumite medicamente pentru tensiunea arterială numite „vasodilatatoare”, de ex. hidrazalină (vezi pct. *Atenționări și precauții*). Există un risc potențial ca minoxidilul, substanța activă din Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție să interacționeze cu aceste medicamente și să le intensifice efectul.

Teoretic, există posibilitate, că minoxidil aplicat topic poate de asemenea, interacționa cu guanetidina (poate cauza tensiune arterială joasă)

### **Utilizarea de Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție cu alimente și băuturi**

Produsele alimentare și băuturile nu ar trebui să aibă efect asupra eficacității Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție.

### **Sarcina și alăptarea**

*Înainte de a lua acest medicament consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul.*

Acest produs este predestinat pentru bărbați și nu ar trebui să fie utilizat de femei.

Medicamentul nu se va administra dacă sunteți gravidă sau alăptați.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție poate provoca amețeli sau tensiune arterială joasă. Dacă prezentați aceste reacții adverse nu trebuie să conduceți vehicule sau să folosiți utilaje.

### **Alte atenționări**

- Pilfud 50 mg/ml spray cutanat, soluție conține propilenglicol, care poate cauza iritații cutanate.
- **Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție conține etanol (alcool)**, care poate determina iritații și senzație de arsură în ochi. A se evita contactul cu zonele sensibile (precum ochi, gura, pielea lezată și deteriorată). În caz de contact accidental, suprafețe afectate trebuie să fie spălate cu cantități mari de apă rece.

**Au fost raportate cazuri de creștere excesivă a părului pe corpul sugarilor, ca urmare a contactului cu suprafețele cutanate ale pacienților ( persoanelor care au grija de pacienți) care utilizează minoxidil cu administrarea topica.Creșterea părului a revenit la normal în decurs de câteva luni, atunci când copiii nu au mai fost expusi la minoxidil. Trebuie să vă asigurați că nu**

**exista contact între copii și suprafețele corpului pe care ați aplicat minoxidil cu administrare topică.**

**Adresați-vă unui medic dacă observați o creștere excesivă a părului pe corpul copilului dumneavoastră în perioada în care utilizați medicamente care conțin minoxidil cu administrare topică.**

### **3. Cum să utilizați Pildud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție**

*Utilizați întotdeauna medicamentul exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.*

Pildud 50 mg/ml, spray cutanat, soluție este destinat exclusiv pentru aplicare locală și externă. Trebuie să fie utilizat în mod direct la zona scalpului.

- Evitați inhalarea spray-ului în timp ce se aplică pe scalp.
- Nu se aplică pe alte zone ale corpului, decât la nivelul scalpului.
- Spălați-vă bine pe mâini înainte și după aplicarea soluției și spălați alte zone care au intrat în contact cu soluția.
- Asigurați-vă că părul și scalpul sunt complet uscate înainte de aplicarea soluției.

#### **Doze**

##### **Doze zilnice pentru bărbați adulți cu vârsta 18-65 ani**

- Aplicați câte 1 ml Pildud 50 mg/ml spray cutanat, soluție de 2 ori pe zi pe suprafața complet uscată afectată a scalpului.
- Soluția trebuie masată ușor în scalp după aplicare.

Respectați un interval de 12 ore dintre fiecare aplicare (de exemplu dimineața și seara). Doza totală zilnică nu va depăși 2 ml.

Nu se va aplica mai mult de 2 ori pe zi.

##### **Utilizarea continuă a Pildud 50 mg/ml spray cutanat, soluție**

- Este posibil să trebuiască să utilizați acest medicament de două ori pe zi timp de cel puțin 2 luni înainte de a vedea o nouă creștere a părului, acest lucru se datorează faptului că creșterea părului este un proces lent.
- Părul crescut poate fi moale și pufos la început, dar în cele din urmă ar trebui să devină la fel ca părul normal.
- Odată ce părul a început să crească din nou, trebuie să continuați să utilizați acest medicament de două ori pe zi pentru ca creșterea să continue. În studiile clinice, 3 din 5 bărbați au raportat creșterea părului după 48 de săptămâni de utilizare continuă a acestui produs.
- Când încetați să utilizați medicamentul, părul care a crescut din nou poate dispărea după 3-4 luni și procesul de chelie / cădere a părului va continua.
- Dacă nu aveți nicio îmbunătățire a creșterii părului după un an de utilizare, trebuie să întrerupeți tratamentul.
- Dacă sunteți îngrijorat în orice moment al tratamentului, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului.

##### **Modul de administrare**

- Înainte de prima utilizare, apăsați pompa de câteva ori până la atingerea unei pulverizări uniforme.  
La următoarea utilizare, spray-ul se va utiliza imediat.
- Aplicator de pulverizare cu pompă: este util pentru suprafețe mari.

- Îndreptați pompa spre centrul zonei chele, apăsați o dată și întindeți cu vârful degetelor pe întreaga zonă cheală. Repetați în total de 8 ori. Evitați inhalarea la pulverizarea medicamentului.
- În total 8 pulverizări vor elibera doza de 1 ml de minoxidil necesară.
- Spălați-vă mâinile și orice alte zone, altele decât scalpul, care ar fi putut intra în contact cu acest medicament.

### **Dacă utilizați mai mult Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție decât trebuie**

*Dacă ați utilizat o doză mai mare de medicament decât doza care vi s-a prescris, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului!*

Cereți sfatul medicului imediat dacă cineva, inclusiv un copil, folosește prea mult de acest medicament. Luați medicamentul și recipientul cu dumneavoastră.

Semnele și simptomele unui supradozaj cu minoxidil preponderent includ efecte cardiovasculare asociate cu retenție de lichid și sodiu. De asemenea pot să se dezvolte bătăi rapide ale inimii, tensiune arterială scăzută, amețeli și letargie (sommn profund și continuu, de lungă durată).

### **Dacă înghițiți accidental soluția**

Dacă cineva, inclusiv un copil, înghite oricare cantitate din Pilfud 50 mg / ml, spray cutanat, soluție duceți-l imediat la spital, dacă este posibil, luați flaconul cu dumneavoastră, deoarece medicul ar fi bine să cunoască cât de mult a înghițit.

### **Dacă uitați să utilizați Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție**

Dacă ați uitat una sau două aplicații de Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție, continuați la fel de normal ca și cum nu ați fi uitat doza - nu utilizați de două ori mai mult sau de două ori mai frecvent. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție**

Utilizați acest medicament atât timp cât a fost prescris de către medicul dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

*Ca și alte medicamentele, Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.*

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră și opriți utilizarea de Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție dacă apar:

- Dureri în piept
- Umflarea feței, buzelor, limbii sau gâtului, care poate cauza dificultăți la înghițire sau respirație.

Spuneți medicului dumneavoastră și opriți utilizarea Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție dacă apar:

- reacții alergice, inclusiv umflarea feței, înroșirea pielii sau mâncărime sau senzație de apăsare în gât,
- tensiune arterială scăzută,
- bătăi rapide sau de o conștientizare crescută a ritmul cardiac (palpitații),
- lipotimie sau amețeli,
- umflarea mâinilor sau picioarelor, dificultăți de respirație,
- creșterea bruscă inexplicabile a greutateii,

- roșeață locală persistentă sau erupții cutanate.

### **Alte reacții adverse**

Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):

- Dureri de cap

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):

- Mâncărimi, dermatită (inflamația pielii)
- S-a raportat creșterea nedorită a părului pe alte suprafețe decât scalpul (inclusiv creșterea părului facial la femei)

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):

- greață

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- poate să apară schimbarea texturii părului. În acest caz, opriți utilizarea Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție.

Alte reacții care pot apărea, dar cu frecvență necunoscută

- Stare depresivă
- iritația ochilor
- vărsături
- iritația scalpului, cum ar fi roșeață locală, uscăciune, toate au fost raportate pe piele sub formă de fulgi. Acest lucru se poate datora propilenglicol prezent produs. Aceasta este, de obicei, doar un efect temporar, dar dacă persistă ar trebui să opriți utilizarea Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție.
- erupție asemănătoare acnee, mâncărime, erupție sub formă de vezicule, sângerări sau ulceratii
- pierderea temporară a părului poate să apară în timpul primelor 2 - 6 săptămâni de utilizare. Acest lucru este probabil să fie ca urmare a unei modificări în cadrul ciclului de creștere și ar trebui să se oprească în câteva săptămâni. În cazul în care această pierdere a părului continuă timp de mai mult de 2 săptămâni, opriți administrarea produsului și discutați cu medicul dumneavoastră.
- poate să apară schimbarea culorii. În acest caz, opriți utilizarea Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md)  
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Pilfud 50 mg/ml, spray cutanat soluție**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 30°C

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Pildud 50 mg/ml, spray cutanat soluție**

Substanța activă este minoxidil.

Fiecare ml soluție conține: minoxidil 50 mg;

Celelalte componente sunt: propilenglicol, etanol 96%, apă purificată.

### **Cum arată Pildud 50 mg/ml, spray cutanat soluție și conținutul ambalajului:**

#### Descrierea medicamentului

Spray cutanat, soluție

Soluție transparentă de culoare galben-pal până la oranj.

#### Conținutul ambalajului

Flacoane din polietilenă de înaltă densitate de culoare albă, cu pompă de pulverizare.

Flaconul conține 60 ml soluție.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical  
Industry, Joint Stock Company, Sarajevo,  
Jukiceva 53,  
Bosnia și Herțegovina.

#### **Fabricantul**

Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical  
Industry, Joint Stock Company, Sarajevo,  
Jukiceva 53,  
Bosnia și Herțegovina.

### **Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2025.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>