

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

ANAFERON KIDS 0,003 g comprimate de supt *Anticorpi purificați prin afinitate față de γ -interferonul uman*

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament în conformitate cu informațiile din acest prospect sau conform indicațiilor medicului dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă farmacistului.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile de utilizare a medicamentului starea dumneavoastră nu se ameliorează sau se înrăutățește, consultați în mod obligatoriu medicul.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Anaferon Kids și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Anaferon Kids
3. Cum se utilizează Anaferon Kids
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Anaferon Kids
6. Conținutul ambalajului și alte informații suplimentare

1. CE ESTE ANAFERON KIDS ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Anaferon Kids comprimate de supt este un medicament homeopat. Manifestă acțiune imunostimulatoare și antivirală.

Anaferon Kids este destinat pentru tratamentul următoarelor stări la copii mai mari de 1 lună:

- Profilaxia și tratamentul infecțiilor respiratorii virale acute (inclusiv și a gripei).
- Terapia complexă a infecțiilor cauzate de virusul herpetic (mononucleoza infecțioasă, varicela, herpesul labial, herpesul genital).
- Terapia complexă și profilaxia recidivelor infecțiilor herpetice cronice, inclusiv a herpesului labial și genital.
- Terapia complexă și profilaxia altor infecții virale acute și cronice, provocate de virusul encefalitei de căpușe, enterovirus, rotavirus, coronavirus, calicivirus.
- În cadrul terapiei complexe a infecțiilor bacteriene.
- În cadrul tratamentului complex ale stărilor imunodeficitare secundare de diversă etiologie, inclusiv profilaxia și tratamentul complicațiilor infecțiilor virale și bacteriene.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI ANAFERON KIDS

Nu utilizați Anaferon Kids, dacă:

- dumneavoastră sau copilul dumneavoastră sunteți alergic la substanțele active sau la alte componente ale acestui medicament, enumerate la pct. 6;
- dacă copilul dumneavoastră are vârsta sub 1 lună;
- dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveți afecțiuni ereditare de galactozemie, sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză, deficit total de lactază.

Atenționări și precauții

Consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua Anaferon Kids.

Copii

Anaferon Kids nu este destinat utilizării la copii cu vârsta sub 1 lună.

Anaferon Kids împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau intenționați să luați orice alte medicamente.

Cazuri de incompatibilitate cu alte medicamente până în prezent nu au fost raportate.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă, credeți că sunteți gravidă sau intenționați să deveniți gravidă consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul înainte de a lua orice medicament.

Siguranța utilizării Anaferon Kids în timpul sarcinii nu a fost studiată. Ca măsură de precauție, se recomandă evitarea utilizării Anaferon Kids în timpul sarcinii. Dacă în timpul administrării medicamentului veți deveni gravidă, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră pentru a determina necesitatea continuării tratamentului.

Date privind eliminarea în laptele matern lipsesc. Anaferon Kids nu este recomandat în timpul alăptării.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Anaferon Kids nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi alte utilaje potențial periculoase.

Anaferon Kids conține lactoză

Dacă medicul dumneavoastră v-a informat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

3. CUM SE UTILIZEAZĂ ANAFERON KIDS

Luați întotdeauna Anaferon Kids exact așa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Anaferon Kids este destinat utilizării pe cale bucofaringiană, în afara meselor. Comprimatul trebuie ținut în gură, fără a fi înghițit, până la dizolvarea completă (nu în timpul mesei).

Incizia de pe fața comprimatului nu este destinată divizării comprimatului în doze egale.

Copiilor cu vârsta de la 1 lună. La administrarea medicamentului copiilor mici (1 lună – 3 ani) se recomandă de dizolvat comprimatul într-o cantitate mică (1 lingură de masă) de apă fiartă de temperatura camerei.

Infecții respiratorii virale acute, gripă, infecții intestinale, infecții herpetice, neuroinfecții

În prima zi de tratament se administrează 8 comprimate după următoarea schemă: în primele 2 ore – câte 1 comprimat la fiecare 30 minute (5 comprimate în 2 ore), apoi pe parcursul primei zile se administrează încă 3 comprimate la intervale egale de timp. Începând cu a 2-a zi se administrează câte 1 comprimat de 3 ori pe zi până la însănătoșire completă.

În cazul lipsei îmbunătățirii stării generale la a treia zi de tratament a infecțiilor respiratorii virale acute și gripei e necesar de adresat la medic.

Pe durata sezonului epidemic cu scop profilactic se administrează câte 1 comprimat o dată pe zi timp de 1-3 luni.

Herpes genital

În manifestările acute de herpes genital medicamentul se administrează la intervale egale de timp, după următoarea schemă: primele 3 zile – câte 1 comprimat de 8 ori pe zi, ulterior – câte 1 comprimat de 4 ori pe zi, pe o perioadă de timp nu mai mică de 3 săptămâni.

În profilaxia recidivelor infecției herpetice cronice se administrează câte 1 comprimat pe zi. Durata curei profilactice se stabilește individual și poate atinge 6 luni.

Alte stări

În tratamentul și profilaxia stărilor imunodeficitare, în terapia complexă a infecțiilor bacteriene se administrează câte 1 comprimat pe zi.

În caz de necesitate medicamentul poate fi asociat cu alte remedii antivirale și simptomatice.

Copii și adolescenți

Anaferon Kids nu este destinat pentru copii mai mici de 1 lună.

Dacă ați luat mai mult Anaferon Kids decât trebuie

Dacă luați în mod accidental prea multe comprimate, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În caz de supradozaj sunt posibile fenomene dispeptice (diaree, dureri în abdomen, greață), cauzate de excipienții din compoziția medicamentului. Dacă semnați aceste fenomene după un supradozaj accidental, întrerupeți utilizarea medicamentului și consultați medicul.

Dacă ați uitat să luați Anaferon Kids

Dacă ați uitat să luați Anaferon Kids, luați doza următoare imediat ce v-ați amintit; luați doza următoare la ora obișnuită. Nu dublați doza pentru a înlocui doza uitată.

Dacă ați încetat să luați Anaferon Kids

Durata tratamentului este determinată individual. Medicul sau farmacistul vă va spune cât timp trebuie să continuați tratamentul. Trebuie să consultați medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă ați decis să încetați să luați medicamentul.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse rare (pot apărea până la 1 din 1000 persoane):

– sunt posibile reacții alergice la componentele medicamentului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ ANAFERON KIDS

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.
A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.
Nu utilizați Anaferon Kids după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține Anaferon Kids

1 comprimat conține anticorpi purificați prin afinitate față de gama-interferonul uman – 0,003 g*.

* se aplică pe lactoză monohidrat sub formă de amestec hidro-alcoolic cu conținut de cel mult 10^{-16} ng/g formă activă a substanței active.

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, stearat de magneziu.

Cum arată Anaferon Kids și conținutul ambalajului

Anaferon Kids se prezintă sub formă de comprimate plat-cilindrice, cu incizie diametrală și margini teșite, de culoare de la albă până la aproape albă. Pe o suprafață plată e aplicată incizia, pe cealaltă suprafață este imprimată inscripția ANAFERON KID.

Incizia diametrală nu este destinată divizării comprimatului în doze egale.

Anaferon Kids este disponibil în cutii cu 1 blister a câte 20 comprimate.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricanții

Deținătorul certificatului de înregistrare

FȘP Materia Medica Holding SRL,
Str-la 3 Samotecinîi, 9,
127473, or. Moscova, Rusia.
Tel./fax: +7 (495) 684-43-33.

Fabricanții

FȘP Materia Medica Holding SRL,
str. Buguruslanskaya, 54,
454139, or. Celeabinsk, Rusia.

SAÎ Santonika,
str. Veiveriu, 134 B,
LT-46353, or. Kaunas, Lituania.

Acest prospect a fost revizuit în februarie 2024.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>