

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR / PACIENT

### COCARNIT pulbere și solvent pentru soluție injectabilă

#### *Combi-nație*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este COCARNIT și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați COCARNIT
3. Cum să luați COCARNIT
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează COCARNIT
6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### **1. Ce este COCARNIT și pentru ce se utilizează**

COCARNIT conține un complex echilibrat de substanțe metabolice și vitamine.

- *Nicotinamida* este una dintre formele vitaminei PP, implicată în procesele de oxido-reducere în celule, ameliorează metabolismul glucidic și cel azotat.
- *Cocarboxilaza* este o coenzima care este produsă în organism din tiamină (vitamina B1). Stimulează indirect sinteza acizilor nucleici, a proteinelor și lipidelor. Reduce nivelurile de acid lactic și piroracemic, contribuie la absorbția glucozei și ameliorează troficitatea țesutului nervos.
- *Cianocobalamina* (vitamina B12) se transformă în organism în forma activă, care posedă activitate biologică ridicată. Stimulează sinteza proteinelor din organism și contribuie la acumularea acesteia. Activează metabolismul glucidelor și lipidelor. Reduce nivelul colesterolului din sânge și previne infiltrarea grasă a ficatului. Contribuie la funcționarea normală a organelor hematopoietice și stimulează acumularea eritrocitelor, a compușilor care conțin grupe sulfhidrilice, crescând astfel rezistența lor la hemoliză. Îmbunătățește capacitatea țesuturilor de regenerare. Are o acțiune benefică față de funcțiile hepatice și ale sistemului nervos.
- *Adenozintrifosfatul disodic trihidrat* este un derivat adenozinic, care stimulează procesele metabolice. Are acțiune hipotensivă și antiaritmică. Exerciță acțiune vasodilatatoare asupra arterelor coronariene.

COCARNIT se indică în următoarele cazuri:

- afecțiuni ale nervilor periferici (nevrite, neuropatii) în caz de diabet zaharat, anemie pernicioasă etc.;
- durere pe parcursul nervilor (nevralgii);

- durere musculară (mialgii);
- durere cauzată de afectarea nervilor spinali (lumbago, radiculite, sciatică);
- inflamația aparatului articular (bursite, tendinite);
- afecțiuni ale inimii (cardiopatie ischemică, miocardită, miocardiopatie).

## **2. Ce trebuie să știți înainte să luați COCARNIT**

### **Nu luați COCARNIT:**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6);
- dacă suferiți de boli cardiovasculare, inclusiv:
  - infarct miocardic în faza acută,
  - insuficiență cardiacă acută sau cronică,
  - tensiune arterială crescută (hipertensiune arterială) necontrolată,
  - tensiune arterială joasă (hipotensiune arterială),
  - bloc atrioventricular.
- dacă suferiți de boli pulmonare inflamatorii;
- dacă suferiți de eritremie, eritrocitoză, psoriazis;
- dacă sunteți alergic la anestezice de tip amidic;
- dacă suferiți de hipovolemie.

### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați COCARNIT adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă ați suferit de ulcer gastric, gastrită, gută, sângerare, leziuni hepatice și ale tractului biliar.

### **COCARNIT împreună cu alte medicamente**

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripție medicală.

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră dacă luați:

- medicamente antiepileptice – utilizate în tratamentul epilepsiei,
- glicozide cardiace – utilizate pentru stimularea lucrului inimii,

### **Fertilitatea, sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

COCARNIT se administrează în timpul sarcinii numai dacă beneficiul pentru mama depășește riscul potențial pentru făt.

Se recomandă întreruperea alimentației la sân în perioada tratamentului cu acest medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor.**

Nu sunt date disponibile.

### **Informații importante privind unele componente ale COCARNIT**

Acest medicament conține metilparahidroxibenzoat (E218) și propilparahidroxibenzoat (E216), pot provoca reacții alergice (chiar întârziate) și, în mod excepțional, bronhospasm.

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol (23 mg) sodiu per doză, adică practic "nu conține sodiu".

### 3. Cum să luați COCARNIT

COCARNIT se administrează intramuscular câte 1-2 flacoane o dată pe zi.

Durata tratamentului și a tratamentului repetat depinde de severitatea și natura maladiei.

#### *Grupuri speciale de pacienți:*

##### Insuficiență renală/hepatică

Nu este necesară modificarea dozei la pacienții cu insuficiență renală/hepatică.

##### Copii și adolescenți

Nu sunt date disponibile referitor la administrarea COCARNIT la copii și adolescenți.

##### Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții vârstnici.

#### **Modul de administrare**

Înainte de administrare pulberea liofilizată trebuie dizolvată cu 2 ml solvent (solventul anexat).

Soluția preparată se administrează intramuscular.

#### **Dacă luați mai mult COCARNIT decât trebuie**

Deoarece COCARNIT va fi administrat de către un medic sau o asistentă medicală, este puțin probabil că va fi administrat prea puțin sau prea mult. Cu toate acestea, dacă aveți această problemă, vă rugăm să contactați medicul sau asistenta medicală.

#### **Dacă uitați să luați COCARNIT**

Este puțin probabil să se omită o doză, deoarece COCARNIT va fi administrat de către un medic sau asistentă medicală. Dacă suspectați că nu vi s-a administrat o doză, comunicați medicului dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### 4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Unele reacții adverse pot fi **grave**. Vă rugăm să opriți utilizarea medicamentului și să comunicați imediat medicului dumneavoastră dacă prezentați următoarele reacții adverse:

*Reacții adverse cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată reieșind din datele disponibile)*

- reacții alergice (inclusiv șoc anafilactic). Înainte de administrarea medicamentului, pacienților cu hipersensibilitate suspectată la componentele medicamentului li se recomandă efectuarea unui test intradermic;
- edem pulmonar la începutul tratamentului, dispnee;
- insuficiență cardiacă congestivă la începutul tratamentului, palpitații;
- tromboză vasculară periferică, bufeuri, hipotensiune;

- policitemie vera;
- amețeli;
- diaree (tranzitorie ușoară), greață, disconfort epigastric;
- prurit, erupții cutanate tranzitorii, dermatită alergică, urticarie, angioedem, hiperhidroză;
- poliurie;
- astenie, stare de rău, pirexie, frisoane, reacții la locul injectării, inclusiv durere și necroză la locul injectării.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează COCARNIT**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține COCARNIT**

- *Substanțele active sunt:* nicotinamidă, cocarboxilază, cianocobalamină, adenosintrifosfat disodic trihidrat. Fiecare flacon cu pulbere conține: cocarboxilază 50 mg, nicotinamidă 20 mg, adozintrifosfat disodic trihidrat 10 mg, cianocobalamină 0,5 mg.
- *Celelalte componente sunt:* glicină, metilparahidroxibenzoat (E218), propilparahidroxibenzoat (E216).

Fiecare fiolă (2 ml) cu solvent conține: clorhidrat de lidocaină 10 mg, hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru injecții.

#### **Cum arată COCARNIT și conținutul ambalajului**

COCARNIT se prezintă sub formă de masă liofilizată de culoare roz.

Solventul: lichid transparent, incolor.

#### **Ambalaj**

Pulbere pentru soluție injectabilă

Flacon din sticlă chihlimbărie, dop din cauciuc bromobutilic etanșat cu capac combinat din aluminiu de tip flip-off.

Solvent pentru soluție injectabilă

Fiolă din sticlă, conținând 2 ml soluție clorhidrat de lidocaină 5 mg/ml.

Câte 3 flacoane cu pulbere și 3 fiole cu solvent în distanțiere din termoplastice însoțite de prospectul pentru pacient plasate în cutie de carton.

**7. Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

**Deținătorul certificatului de înregistrare:**

**WORLD MEDICINE LTD, GEORGIA**

Berbuti No.10/Almasiani No.19-21 office No.26 (Block II), Tbilisi.

**Fabricantul**

World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş., Turcia

ÇOSB G.O. Paşa Mah. 6. Cad. No: 30 Çerkezköy / Tekirdağ.

**Acest prospect a fost revizuit în Octombrie 2025**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>

---

**Informații destinate profesioniștilor din domeniul sănătății**

Soluția preparată trebuie să fie de culoare roz.

Soluția nu se va utiliza în prezența modificărilor de culoare.

Soluția injectabilă trebuie utilizată imediat după preparare!