

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Polymic 200 mg/500 mg comprimate filmate Ofloxacină/Ornidazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Polymic și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Polymic
3. Cum să luați Polymic
4. Reacții adverse posibil
5. Cum se păstrează Polymic
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Polymic și pentru ce se utilizează

Polymic comprimate filmate este un medicament ce conține ca substanțe active ofloxacină (substanță cu proprietăți antibacteriene) și ornidazol (substanță cu proprietăți antibacteriene și antiprotozoice).

Polymic este indicat pentru tratamentul infecțiilor mixte, cauzate de microorganisme (protozoarele și bacterii), sensibile la substanțele active, cum sunt:

- infecții ale sistemului urogenital: pielonefrită acută și cronică, prostatită, cistită, epididimită, infecții ale căilor urinare complicate sau recidivante;
- boli cu transmitere sexuală.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Polymic

Nu luați Polymic:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanțele active sau la oricare dintre excipienții din compoziția medicamentului, enumerați la punctul 6;
- dacă suferiți sau ați suferit în trecut de epilepsie;
- dacă aveți afecțiuni ale sistemului nervos central cu predispoziție de dezvoltare a convulsiilor (după traumatism cranio-cerebral, accident vascular cerebral, procese inflamatorii ale creierului și meningelui);
- dacă aveți o problemă cu globulele roșii din sânge cu numele de deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază;
- dacă ați avut vreodată probleme la nivelul tendoanelor, apărute ca urmare a administrării de medicamente din clasa fluorochinolonelor;
- dacă aveți vârsta sub 18 ani;
- dacă sunteți gravidă sau credeți că ați putea fi gravidă sau dacă alăptați.

Atenționări și precauții

Înainte să luați acest medicament adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Nu trebuie să luați medicamente antibacteriene care conțin fluorochinolone/chinolone, inclusiv Polymic, dacă în trecut ați manifestat vreo reacție adversă gravă atunci când ați luat un medicament care conține chinolone sau fluorochinolone. În această situație, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră cât mai curând posibil.

Înainte să luați acest medicament adresați-vă medicului sau farmacistului:

- dacă utilizați alte medicamente;
- dacă aveți probleme cu rinichii;
- dacă aveți probleme cu ficatul. Dacă apar simptome și semne ale bolii hepatice, precum anorexia, icter, urină închisă la culoare, prurit sau sensibilitate abdominală la palpare, este necesară întreruperea administrării medicamentului;
- dacă aveți diabet zaharat și utilizați, de exemplu, glibenclamidă sau insulină;;
- dacă ați fost diagnosticat cu o lărgire sau „umflare” a unui vas mare de sânge (anevrism aortic sau anevrism al unui vas periferic mare);
- dacă ați avut un episod anterior de disecție de aortă (o ruptură în peretele aortei);
- dacă aveți antecedente familiale de anevrism aortic sau de disecție de aortă sau alți factori de risc sau afecțiuni predispozante (de exemplu, tulburări ale țesutului conjunctiv, cum ar fi sindromul Marfan sau sindromul Ehlers-Danlos – forma vasculară, sau tulburări vasculare, cum ar fi arterita Takayasu, arterita cu celule gigante, boala Behcet, tensiune arterială mare sau ateroscleroză cunoscută);
- dacă ați avut vreodată o criză convulsivă (convulsie);
- dacă ați avut leziuni ale creierului determinate de un accident vascular cerebral sau alte leziuni ale creierului sau alte afecțiuni ale sistemului nervos;
- dacă v-ați născut cu, sau aveți antecedente în familie de prelungire a intervalului QT (observat pe ECG, înregistrarea activității electrice a inimii);
- dacă aveți miastenia gravis (o boală în care apare slăbiciune musculară și oboseală musculară foarte accentuată);
- dacă aveți o afecțiune cunoscută sub denumirea „deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază”

Dacă simțiți brusc dureri severe în abdomen, în piept sau în spate, mergeți imediat la un serviciu de urgență. Dacă nu sunteți sigur că vă aflați în oricare dintre situațiile enumerate mai sus, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte să utilizați acest medicament.

Rareori pot să apară durere și umflare la nivelul articulațiilor și inflamația sau ruptura tendoanelor. Riscul dumneavoastră este crescut dacă sunteți în vârstă (peste 60 de ani), ați primit un transplant de organe, aveți probleme cu rinichii sau dacă sunteți tratat cu corticosteroizi. Inflamația și ruptura tendoanelor poate să apară în primele 48 de ore de tratament și chiar până la câteva luni după oprirea tratamentului cu ofloxacină. La primul semn de durere sau inflamație a unui tendon (de exemplu la gleznă, încheietură, cot, umăr sau genunchi), încetați să luați ofloxacină, contactați medicul și odihniți zona dureroasă. Evitați orice activități fizice ce nu sunt necesare, deoarece acest lucru poate crește riscul ruperii tendonului.

Medicamentele antibacteriene care conțin fluorochinolone/chinolone, au fost asociate cu reacții adverse foarte rare, dar grave, dintre care unele de lungă durată (care au continuat luni sau ani), invalidante și posibil ireversibile. Acestea includ dureri ale tendoanelor, mușchilor și articulațiilor la nivelul membrelor superioare și inferioare, dificultăți la mers, senzații anormale, de exemplu înțepături, furnicături, gâdilături, amorțeală sau senzație de arsură (parestezie), tulburări ale

simțurilor, inclusiv afectarea vederii, gustului, mirosului și auzului, depresie, afectare a memoriei, oboseală severă și tulburări severe ale somnului.

La utilizarea ofloxacinei au fost raportate reacții grave la nivelul pielii, incluzând sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică și reacție indusă medicamentos însoțită de eozinofilie și simptome sistemice (DRESS):

- SJS/TEN se poate manifesta inițial sub formă de pete de culoare roșie sau zone circulare, adesea cu vezicule situate central, la nivelul trunchiului. De asemenea, pot apărea ulcere la nivelul cavității bucale, gâtului, nasului, organelor genitale și ochilor (ochi roșii și umflați). Aceste erupții cutanate grave sunt adesea precedate de febră și/sau simptome asemănătoare gripei. Este posibil ca erupțiile cutanate să progreseze până la descuamare extinsă a pielii și apariția de complicații care amenință viața sau sunt letale;
- DRESS se manifestă inițial ca simptome asemănătoare gripei și o erupție la nivelul feței, apoi o erupție prelungită la nivelul pielii, însoțită de temperatură corporală ridicată, niveluri crescute ale enzimelor hepatice observate la testele de sânge și o creștere a unui tip de celule sanguine albe (eozinofilie), precum și ganglioni limfatici măriți.

Dacă apare o erupție gravă pe piele sau un alt simptom la nivelul pielii, întrerupeți administrarea medicamentului și adresați-vă medicului dumneavoastră sau solicitați imediat asistență medicală.

Uneori, puteți manifesta simptome de deteriorare a unor nervi (neuropatie), de exemplu durere, senzație de arsură, furnicături, amorțeală și/sau slăbiciune, mai ales la nivelul labelor picioarelor și picioarelor sau la nivelul mâinilor și brațelor. Dacă se întâmplă acest lucru, încetați să luați acest medicament și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră, pentru a preveni dezvoltarea unei afecțiuni posibil ireversibile.

Dacă în timpul tratamentului cu Polymic apare o inflamație a intestinului, care poate provoca diaree apoasă severă, care poate avea sânge, posibil cu crampe stomacale și o temperatură ridicată trebuie să mergeți imediat la unitatea de primiri urgențe a celui mai apropiat spital.

În timpul tratamentului cu Polymic este posibilă dezvoltarea reacțiilor de fotosensibilitate (sensibilitate excesivă la lumina solară), prin urmare este necesară evitarea expunerii la razele solare directe, iradierea cu razele ultraviolete (lampă de cuarț cu vapori de mercur, solar).

Evitați administrarea prelungită a medicamentului Polymic deoarece acesta poate duce la dezvoltarea rezistenței microorganismelor la medicament.

În timpul tratamentului cu Polymic nu trebuie consumate băuturi alcoolice.

Polymic împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

În special, informați-l pe medicul dumneavoastră dacă utilizați oricare dintre următoarele medicamente:

- antiacide care conțin magneziu sau aluminiu, utilizate pentru indigestie;
- sucralfat, utilizat pentru tratamentul ulcerului;
- medicamente care conțin fier (pentru anemie) sau zinc;
- teofilină, utilizată pentru tratamentul dificultăților de respirație;
- medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), utilizate pentru ameliorarea durerii și inflamației (cum sunt ibuprofen, diclofenac sau indometacin);
- probenecid, utilizat pentru tratamentul gutei;
- cimetidină, utilizată pentru tratamentul ulcerului și indigestiei;

- medicamente pentru eliminarea apei din organism (diuretice) cum este furosemide;
- metotrexat, utilizat pentru reumatism sau cancer;
- medicamente despre care se știe că modifică modul în care bate inima dumneavoastră. Acestea includ medicamentele utilizate în tratamentul ritmului anormal al băților inimii (medicamente antiaritmice, cum sunt chinidina, hidrochinidina, disopiramida, sotalolul, dofetilida, ibutilida și amiodarona), depresiei (medicamente antidepresive triciclice, cum sunt amitriptilina și imipramina), tulburărilor psihice (medicamente antipsihotice) și infecțiilor bacteriene (antibiotice „macrolide”, cum sunt eritromicina, azitromicina și claritromicina);
- warfarină, utilizată pentru fluidificarea sângelui. Sunteți mai predispuși să aveți o sângerare. Poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să vă efectueze periodic teste de sânge, pentru a verifica cât de bine se coagulează sângele dumneavoastră;
- litiu, medicament utilizat în anumite boli psihice;
- antiepileptice, medicamente utilizate în tratamentul epilepsiei cum ar fi fenitoina sau fenobarbitalul;
- dacă urmează să vi se administreze bromură de vecuroniu, medicament relaxant muscular, ca parte a anesteziei generale.

Polymic împreună cu alimente, băuturi și alcool

Polymic poate fi administrat înainte sau după mese. Trebuie evitat consumul de băuturi alcoolice în timpul tratamentului cu acest medicament.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți însărcinată sau alăptați, credeți că ați putea fi însărcinată sau intenționați să rămâneți însărcinată, adresați-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament. Administrarea Polymic este contraindicată în sarcină și perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Unele reacții adverse (de exemplu, amețeli/vertij, somnolență, tulburări vizuale etc.) care pot apărea atunci când utilizați acest medicament, vă pot afecta capacitatea de a vă concentra și de a reacționa și, prin urmare, pot constitui un risc în situațiile în care aceste abilități sunt de o importanță deosebită (de exemplu, conducerea unei mașini sau folosirea utilajelor).

Informații importante privind unii excipienți

Polymic conține colorant azoic Sunset yellow FCF (E110) care poate determina reacții alergice.

3. Cum să luați Polymic

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a indicat medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Medicul dumneavoastră vă va informa care este doza potrivită pentru dumneavoastră, în funcție de tipul și localizarea infecției în organismul dumneavoastră și severitatea acesteia. Durata tratamentului va depinde de cât de gravă este infecția dumneavoastră.

Adulți

În general, doza zilnică pentru adulți este de 1 comprimat filmat, administrat de 2 ori pe zi timp de 5 zile, iar apoi tratamentul trebuie continuat timp de 2-5 zile cu ofloxacină. Tratamentul trebuie continuat timp de cel puțin 3 zile după dispariția simptomelor clinice.

Pacienți pediatrici

Polymic nu se administrează la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

Mod de administrare

Comprimatele filmate Polymic trebuie înghițit fără a fi zdrobite și cu o cantitate suficientă de lichid. Medicamentul poate fi administrat înainte și după mese.

Dacă luați mai mult Polymic decât trebuie

Dacă ați luat sau credeți că ați luat mai mult Polymic decât trebuie (supradozaj), spuneți imediat medicului dumneavoastră sau prezentați-vă la cea mai apropiată unitate medicală. Aduceți medicamentele rămase cu dumneavoastră. Trebuie să faceți acest lucru pentru ca medicul să știe ce ați luat. Următoarele simptome pot să apară: stare de confuzie sau amețală, pierderea conștienței, convulsii, greață sau sânge în scaun.

Dacă uitați să luați Polymic

Dacă uitați să luați medicamentul sau ați luat o doză mai mică decât cea recomandată de medicul dumneavoastră nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată; așteptați momentul stabilit pentru administrarea următoarei doze și continuați tratamentul așa cum v-a prescris medicul dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă încetați să luați Polymic

Este important să respectați durata tratamentului chiar dacă începeți să vă simțiți mai bine după câteva zile. Dacă tratamentul este oprit prea devreme, starea dumneavoastră se poate înrăutăți sau bacteriile care au determinat infecția pot deveni rezistente la acest medicament.

Dacă aveți orice alte întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Întrerupeți administrarea acestui medicament și adresați-vă imediat unui medic sau la camera de primiri urgențe a celui mai apropiat spital:

- dacă aveți o reacție alergică. Semnele includ erupție trecătoare pe piele, probleme la înghițit sau respirat, umflarea buzelor, a feței, gâtului sau limbii.

Întrerupeți tratamentul cu acest medicament și mergeți imediat la medic, dacă observați oricare dintre următoarele reacții adverse grave - este posibil să aveți nevoie de tratament de urgență:

- o reacție anafilactică generalizată (semnele includ stare de rău sau slăbiciune, șoc, colaps sau stare de inconștiență apărută ca urmare a scăderii tensiunii arteriale cu semne de colaps circulator, dificultăți la respirație, umflare, vărsături, diaree, ritm de bătaie a inimii anormal de rapid, respirații anormal de rapide, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, culoare albăstruie a mâinilor și picioarelor, transpirații reci);
- neuropatie (senzație de amorțală trecătoare, furnicături și înțepături, sensibilitate crescută la atingere, slăbiciune a mușchilor, tremurături etc.);
- diaree severă care poate conține sânge, febră și durere la nivelul stomacului;
- reacțiile grave pe piele, frecvent precedate de febră, dureri de cap, dureri în corp (simptome asemănătoare gripei). Erupții grave pe piele care pot implica ulcerări ale gurii, gâtului, nasului, organelor genitale și conjunctivă (ochi roșii și umflați). Erupția pe piele poate să evolueze către formarea de vezicule și descuamarea pielii (Sindrom Stevens-Johnson (SJS), pustuloză exantematoasă generalizată acută (PAGE), erupție fixă medicamentoasă);

- durere la nivelul tendoanelor cauzată de inflamație sau ruptură (în special a tendonului lui Achile);
- inflamația ficatului (poate fi gravă) cu semne care includ pierderea apetitului, icter, durere abdominală, febră, urină închisă la culoare, iritație pe piele;
- agranulocitoză (o tulburare severă, foarte rară a sângelui, însoțită de febră, durere severă în gât, ulcere la nivelul gurii).

În timpul utilizării acestui medicament pot să apară următoarele reacții adverse, acestea fiind clasificate în funcție de frecvența de apariție:

Este posibil ca acest medicament să determine un atac de porfirie (o boală rară care afectează metabolismul) la unii pacienți.

Alte reacții adverse care pot apărea la utilizarea acestui medicament sunt:

Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):

- probleme cu somnul;
- dureri de cap, amețeli;
- senzație de rău (greață, vărsături) și diaree;
- creștere a valorilor unor enzime ale ficatului în sânge.

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):

- infecții cu ciuperci (fungice);
- existență a bacteriilor care produc infecția;
- modificări ale numărului celulelor albe din sânge, apărute în rezultatele unor analize de sânge (leucopenie, eozinofilie);
- modificările ale gustului, pierdere a poftei de mâncare, uscăciune a gurii;
- stare de stres (anxietate), confuzie, nervozitate, somnolență, tremurături, senzație de învârtire (vertij);
- senzație de lipsă de aer (dispnee);
- disconfort la nivelul stomacului sau indigestie (dispepsie), dureri în zona stomacului, senzație de balonare (flatulență) sau constipație;
- testele de sânge pot avea rezultate anormale, din cauza problemelor cu ficatul (creștere a bilirubinei) sau cu rinichii (creștere a creatininei);
- mâncărimi și erupții pe piele, mâncărimi severe sau blânde (urticarie), transpirație abundentă (hiperhidroză);
- dureri la nivelul articulațiilor sau la nivelul mușchilor;
- stare generală de slăbiciune.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):

- apariție cu ușurință de vânătăi sau sângerare, din cauza scăderii numărului de plachete din sânge (trombocitopenie)
- număr scăzut de celule albe în sânge (neutropenie);
- răspuns imun exagerat (hipersensibilitate);
- o reacție alergică severă cu umflare a feței, buzelor, limbii sau gâtului, cu dificultăți la înghițire sau respirație (angioedem);
- scădere a valorilor zahărului din sângele dumneavoastră (hipoglicemie). Aceasta este important de știut pentru persoanele cu diabet zaharat;
- schimbări de opinie și de gândire (reacții psihotice);
- vedere sau auzire a unor lucruri care nu există în realitate (halucinații, paranoia);
- depresii, agitație, visuri anormale, coșmaruri;
- convulsii;

- senzație de furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor (parestezii);
- probleme cu auzul (tinitus) sau cu vederea (vedere încețoșată);
- bătăi ale inimii anormal de rapide (tahicardie), resimțirea bătăilor inimii (palpitații) sau tensiune arterială mică (hipotensiune arterială);
- erupție răspândită pe piele, temperatură corporală ridicată, creșteri ale enzimelor hepatice, anomalii ale sângelui (eozinofilie), ganglioni limfatici măriți și alte afectări ale organelor (Reacție medicamentoasă cu eozinofilie și simptome sistemice, cunoscută și sub numele de DRESS sau sindrom de hipersensibilitate la medicament);
- durere și inflamare a tendoanelor sau ligamentelor, care poate duce la ruptură. Tendonul lui Ahile este afectat de cele mai multe ori;
- slăbiciune musculară;
- afectarea funcției rinichilor;
- febră.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10.000 persoane):

- rigiditate;
- tulburări de coordonare;
- pierderea conștienței;
- senzație de furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor (parestezii).

Reacții adverse cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

- agranucitoză (o tulburare severă rară a sângelui însoțită de febră, durere severă în gât, ulcere la nivelul gurii), scădere a numărului de celule roșii din sânge (anemie), care poate să vă facă pielea palidă sau galbenă din cauza distrugerii celulelor roșii din sânge; scădere a numărului tuturor tipurilor de celule din sânge (pancitopenie);
- șoc anafilactic, șoc asemănător celui anafilactic;
- creștere a valorilor zahărului din sânge (hiperglicemie) sau scădere a valorilor zahărului din sânge, care duce la apariția comei (comă hipoglicemică);
- depresie severă sau boli psihice, însoțite de comportament care pune viața în pericol, incluzând gânduri și comportament de sinucidere;
- senzație de arsură, furnicături, durere sau amorțeală. Acestea pot fi semne ale unei afecțiuni numită „neuropatie”;
- tremurături, mișcări involuntare anormale, probleme de mișcare și mers (dischinezie, tulburări extrapiramidale), tulburare sau pierderea simțului olfactiv (mirosului), pierdere a gustului, leșin;
- dureri de cap persistente, cu sau fără afectare a vederii (hipertensiune intracraniană benignă);
- pierdere temporară a vederii;
- afectare sau pierdere a auzului;
- ritm anormal de rapid al bătăilor inimii, ritm neregulat al bătăilor inimii care pune viața în pericol, inclusiv stop cardiac, afectare a ritmului inimii (denumită „prelungirea intervalului QT”, observată pe ECG, o înregistrare a activității electrice a inimii);
- dificultate în respirație sau respirație șuierătoare (bronhospasm);
- reacții alergice pulmonare;
- diaree severă care poate conține sânge, febră și durere la nivelul stomacului;
- inflamarea pancreasului;
- icter, leziuni ale ficatului, inflamare a ficatului (hepatită);
- erupții grave pe piele, incluzând sindrom Stevens-Johnson și necroliză epidermică toxică. Acestea pot apărea ca niște pete roșii sau zone circulare, adesea cu vezicule situate central, la nivelul trunchiului, descuamare la nivelul pielii, ulcerații la nivelul gurii, gâtului, nasului, organelor genitale și ochilor și pot fi precedate de febră și simptome asemănătoare gripei;
- eritem multiform;
- creștere a sensibilității pielii dumneavoastră la soare și la lumina ultravioletă (fotosensibilitate);

- inflamație a vaselor care transportă sângele prin organismul dumneavoastră, din cauza unei reacții alergice (vasculită);
- inflamație a țesuturilor din interiorul gurii (stomatită);
- ruptură a mușchilor sau distrugere a mușchilor (rabdmioliză);
- ruptură a ligamentelor și tendoanelor;
- înroșire și umflare la nivelul articulațiilor (artrită);
- durere, inclusiv dureri de spate, în piept și la nivelul extremităților.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Polymic

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Polymic

Substanțele active sunt: ofloxacină și ornidazol. Fiecare comprimat filmat conține ofloxacină - 200 mg și ornidazol - 500 mg.

Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină (PH102), amidon glicolat de sodiu (tip A), povidonă K-30, stearat de magneziu, Opadry 03B53217 portocaliu (hipromeloză, dioxid de titan (E171), colorant Sunset yellow FCF (E110), macrogol).

Cum arată Polymic și conținutul ambalajului

Polymic se prezintă sub formă de comprimate filmate de culoare portocalie, formă ovală, cu incizie pe o parte a comprimatului.

Polymic comprimate filmate este disponibil în cutii de carton ce conțin 1 blister cu 10 comprimate filmate și prospectul pentru utilizator/pacient.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.

SP-289(A), RIICO Industrial Area,

Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan),

India

Fabricantul

Kusum Healthcare Pvt. Ltd.
SP-289(A), RIICO Industrial Area,
Chopanki, Bhiwadi, Dist. Alwar (Rajasthan),
India

Acest prospect a fost revizuit în martie 2024

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>