

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

**Urorec 8 mg capsule**  
**Urorec 4 mg capsule**  
Silodosin

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Urorec și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Urorec
3. Cum să luați Urorec
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Urorec
6. Conținutul ambalajului și alte informații

### **1. Ce este Urorec și pentru ce se utilizează**

#### **Ce este Urorec**

Urorec aparține unui grup de medicamente numite blocante ale receptorilor adrenergici alfa<sub>1A</sub>. Urorec este selectiv pentru receptorii localizați la nivelul prostatei, vezicii urinare și uretrei. Prin blocarea acestor receptori, medicamentul produce relaxarea musculaturii netede de la nivelul acestor țesuturi. Aceasta vă ajută să urinați și vă ameliorează simptomele.

#### **Pentru ce se utilizează Urorec**

Urorec este utilizat la pacienți de sex masculin, pentru tratamentul simptomelor urinare asociate cu mărirea benignă a prostatei (hiperplazie prostatică), cum sunt:

- dificultatea de a începe urinarea,
- senzația de golire incompletă a vezicii urinare,
- nevoia de a urina mai frecvent, chiar și în timpul nopții.

### **2. Ce trebuie să știți înainte să luați Urorec**

#### **NU luați Urorec**

- Nu trebuie să luați Urorec dacă sunteți alergic la silodosin sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

## Atenționări și precauții

Înainte să luați Urorec, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Dacă sunteți supus unei operații la nivelul ochiului, din cauza opacității cristalinului (**intervenție chirurgicală pentru cataractă**), este important să vă informați imediat medicul oftalmolog că utilizați sau ați utilizat anterior Urorec. Unii pacienți cărora li se administrează acest tip de medicament prezintă o pierdere a tonusului muscular al irisului (partea circulară colorată a ochiului) în timpul unei asemenea intervenții chirurgicale. Medicul specialist poate lua măsuri de precauție corespunzătoare cu privire la medicament și la tehnicile chirurgicale care trebuie utilizate. Întrebați-vă medicul dacă puteți sau nu amâna sau opri temporar administrarea Urorec în timpul intervenției chirurgicale pentru cataractă.
- Înainte să luați Urorec, informați-vă medicul dacă ați leșinat vreodată sau ați prezentat amețeli la ridicarea în picioare.  
În timpul administrării Urorec pot apărea **amețeli** la ridicarea în picioare și, ocazional, **leșin**, în special la începutul tratamentului sau când luați alte medicamente care scad presiunea sângelui. Dacă apar aceste manifestări, așezați-vă imediat pe un scaun sau întindeți-vă pe pat, până la dispariția simptomelor și informați-vă medicul cât mai curând posibil (vezi, de asemenea, “Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor”).
- Nu trebuie să luați Urorec dacă aveți **probleme severe de ficat**, deoarece medicamentul nu a fost testat în cazul prezenței acestor afecțiuni.
- Adresați-vă medicului pentru recomandări dacă aveți **probleme cu rinichii**.  
Dacă aveți probleme moderate cu rinichii, medicul dumneavoastră va începe tratamentul cu Urorec luând măsuri de precauție și va utiliza probabil o doză mai mică (vezi pct. 3 “Doză”).  
Nu trebuie să luați Urorec dacă aveți probleme severe cu rinichii.
- Deoarece mărirea benignă a prostatei și cancerul de prostată pot prezenta aceleași simptome, înaintea începerii tratamentului cu Urorec medicul dumneavoastră vă va controla în vederea excluderii diagnosticului de cancer de prostată. Urorec nu vindecă cancerul de prostată.
- Tratamentul cu Urorec poate duce la ejaculare anormală (scăderea cantității de spermă ejaculată în timpul actului sexual), ceea ce poate afecta temporar, fertilitatea masculină. Acest efect dispare după întreruperea administrării Urorec. Vă rugăm să vă informați medicul dacă intenționați să aveți copii.
- Urorec nu este recomandat pentru utilizare la pacienți cu vârsta sub 18 ani, deoarece nu există nicio indicație relevantă pentru această grupă de vârstă.

## Urorec împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

În special, spuneți medicului dumneavoastră dacă luați:

- **medicamente care scad presiunea sângelui** (în special medicamente numite blocante alfa<sub>1</sub>, cum sunt prazosin sau doxazosin), deoarece există un risc potențial ca efectul acestor medicamente să fie crescut în timp ce luați Urorec.

- **medicamente antifungice** (cum sunt ketoconazol sau itraconazol), **medicamente utilizate în infecția cu HIV/SIDA** (cum este ritonavir) sau **medicamente utilizate după un transplant pentru a preveni rejecția de organ** (cum este ciclosporina), deoarece aceste medicamente pot crește concentrația sanguină a Urorec.
- **medicamente utilizate în tratamentul problemelor de obținere sau de menținere a unei erecții** (cum sunt sildenafil sau tadalafil), deoarece utilizarea concomitentă cu Urorec ar putea duce la o ușoară scădere a presiunii sângelui.
- **medicamente pentru tratamentul epilepsiei sau rifampicină** (un medicament utilizat pentru tratamentul tuberculozei), deoarece efectul Urorec poate fi scăzut.

### **Urorec împreună cu alimente și băuturi**

Luați întotdeauna Urorec împreună cu alimente (vezi pct. 3 “Când și cum să luați Urorec”).

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje dacă aveți senzația de leșin, vă simțiți amețit sau somnoros sau dacă aveți vederea încețoșată.

### **3. Cum să luați Urorec**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

#### **Doza**

**Doza recomandată** este de o capsulă de Urorec 8 mg pe zi administrat pe cale orală.

#### **Pacienți cu probleme cu rinichii**

Dacă aveți probleme moderate cu rinichii, este posibil ca medicul dumneavoastră să vă prescrie o doză diferită. În acest scop este disponibil Urorec 4 mg capsule.

#### **Când și cum să luați Urorec**

Luați întotdeauna capsula împreună cu alimente, de preferință la aceeași oră în fiecare zi. Nu sfărâmați și nu mestecați capsula, ci înghițiți-o întreagă, de preferință cu un pahar cu apă.

#### **Dacă luați mai mult Urorec decât trebuie**

Dacă ați luat mai mult de o capsulă, informați-vă medicul cât mai curând posibil. Dacă vă simțiți amețit sau slăbit, spuneți imediat medicului dumneavoastră.

#### **Dacă uitați să luați Urorec**

Puteți lua capsula mai târziu în cursul aceleiași zile, dacă ați uitat să o luați mai devreme. Săriți peste doza uitată dacă se apropie momentul în care trebuie să luați doza următoare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa capsula uitată.

#### **Dacă încetați să luați Urorec**

Dacă încetați tratamentul este posibil ca simptomele dumneavoastră să reapară.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### 4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Adresați-vă imediat medicului dacă observați vreuna dintre următoarele reacții alergice: umflarea feței sau a gâtului, dificultăți de respirație, senzație de leșin, mâncărimi la nivelul pielii sau urticarie, deoarece consecințele pot deveni grave.

Reacția adversă cea mai frecventă este scăderea cantității de spermă ejaculată în timpul actului sexual. Acest efect dispare după întreruperea tratamentului cu Urorec. Vă rugăm să vă informați medicul dacă intenționați să aveți copii.

Pot apărea **amețeli**, incluzând amețelile la ridicarea în picioare și, ocazional, **leșinul**.

Dacă vă simțiți slăbit sau amețit, așezați-vă imediat pe un scaun sau întindeți-vă pe un pat până la dispariția simptomelor. Dacă apar amețeli la ridicarea în picioare sau senzația de leșin, informați-vă medicul cât mai curând posibil.

Urorec poate provoca complicații în timpul **intervenției chirurgicale pentru cataractă** (operație la ochi din cauza opacității cristalinului, vezi pct. “Atenționări și precauții”). Este important să vă informați imediat medicul oftalmolog dacă utilizați sau ați utilizat anterior Urorec.

*Frecvența reacțiilor adverse posibile enumerată mai jos este definită folosind următoarea convenție:*

<i>Foarte frecvente</i>	<i>pot afecta mai mult de 1 persoană din 10</i>
<i>Frecvente</i>	<i>pot afecta până la 1 persoană din 10</i>
<i>Mai puțin frecvente</i>	<i>pot afecta până la 1 persoană din 100</i>
<i>Rare</i>	<i>pot afecta până la 1 persoană din 1000</i>
<i>Foarte rare</i>	<i>pot afecta până la 1 persoană din 10000</i>
<i>Cu frecvență necunoscută</i>	<i>frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile</i>

#### **Reacții adverse foarte frecvente**

- Ejaculare anormală (ejacularea mai puțină sau inobservabilă de spermă în timpul actului sexual, vezi punctul “Atenționări și precauții”)

#### **Reacții adverse frecvente**

- Amețeli, incluzând amețeli la ridicarea în picioare (vezi, de asemenea, mai sus, la acest punct)
- Secreție nazală abundentă sau nas înfundat
- Diaree

#### **Reacții adverse mai puțin frecvente**

- Scăderea libidoului
- Greață
- Gură uscată
- Dificultăți în obținerea și menținerea erecției
- Puls mai rapid

- Simptome de reacție alergică la nivelul pielii, cum sunt erupție trecătoare pe piele, mâncărimi, urticarie și erupție trecătoare pe piele cauzată de un medicament
- Valori anormale ale testelor funcției ficatului
- Tensiune arterială scăzută

#### ***Reacții adverse rare***

- Bătăi rapide sau neregulate ale inimii (numite palpitații)
- Leșin/ Pierdere a conștienței

#### ***Reacții adverse foarte rare***

- Alte reacții alergice însoțite de umflarea feței sau a gâtului

#### ***Cu frecvență necunoscută***

- Pupilă flască în timpul intervenției chirurgicale pentru cataractă (vezi, de asemenea, mai sus, la acest punct)

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Dacă considerați că viața dumneavoastră sexuală este afectată, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amed.md](http://www.amed.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amed.md](mailto:farmacovigilenta@amed.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Urorec**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

Nu utilizați acest medicament dacă observați că ambalajul este deteriorat sau prezintă semne de falsificare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Urorec**

#### ***Urorec 8 mg***

- Substanța activă este silodosin. Fiecare capsulă conține silodosin 8 mg.
- Celelalte componente sunt: amidon pregelatinizat de porumb, manitol (E421), stearat de magneziu, laurilsulfat de sodiu, gelatină, dioxid de titan (E171).

#### ***Urorec 4 mg***

- Substanța activă este silodosin. Fiecare capsulă conține silodosin 4 mg.
- Celelalte componente sunt: amidon pregelatinizat de porumb, manitol (E421), stearat de magneziu, laurilsulfat de sodiu, gelatină, dioxid de titan (E171), oxid galben de fier (E172).

### **Cum arată Urorec și conținutul ambalajului**

Capsulele de Urorec 8 mg sunt albe, opace, din gelatină.

Capsulele de Urorec 4 mg sunt galbene, opace, din gelatină.

Urorec este disponibil în ambalaje conținând 10 sau 30 capsule.

### **Deținătorul Certificatului de Înregistrare și Fabricantul**

#### **Deținătorul Certificatului de Înregistrare**

Recordati Ireland Ltd.  
Raheens East  
Ringaskiddy Co. Cork  
Irlanda

#### **Fabricantul**

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.  
Via Matteo Civitali 1  
I-20148 Milan  
Italia

### **Acest prospect a fost revizuit în Septembrie 2019.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>

#### **Alte surse de informații**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Europene a Medicamentului <http://www.ema.europa.eu>.

