

Prospect: Informații pentru utilizator

STREPSILS MENTOL pastile
Amilmetacrezol/Alcool 2,4 diclorbenzilic/Levomentol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Strepsils Mentol și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Strepsils Mentol
3. Cum să utilizați Strepsils Mentol
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Strepsils Mentol
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Strepsils Mentol și pentru ce se utilizează

Strepsils Mentol aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.

Strepsils Mentol se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene atunci când există și fenomene de congestie nazală, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.

Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.

Efect antibacterian, antifungic și antiviral.

Descongestionează căile respiratorii.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Strepsils Mentol

Nu luați Strepsils Mentol

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la amilmetacrezol, alcool 2,4-diclorbenzilic și levomentol sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului (enumerat la pct 6).

Atenționări și precauții

Înainte să luați Strepsils Mentol, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:

- dacă aveți diabet zaharat

Strepsils Mentol împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre medicamentele eliberate fără prescripție medicală.

Nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Utilizarea Strepsils Mentol cu alimente, băuturi și alcool

Strepsils Mentol nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi ci între mese.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Strepsils Mentol nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Strepsils Mentol conține glucoză și zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Strepsils Mentol conține 1497 mg zahăr și 1013 mg glucoză/pastilă. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

Acest medicament conține cantități foarte scăzute de gluten (din amidon de grâu). Este considerat „fără gluten” și este foarte puțin probabil să provoace probleme dacă aveți boală celiacă. O pastilă nu conține mai mult de 20,26 micrograme de gluten. Dacă aveți alergii la grâu (diferită de boala celiacă), nu trebuie să luați acest medicament.

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu conține sodiu”

Acest medicament conține arome cu d-limonen. D-limonen poate determina reacții alergice.

Dioxidul de sulf (E220) poate provoca rar reacții de hipersensibilitate grave și bronhospasm

3. Cum să luați Strepsils Mentol

Luați întotdeauna Strepsils Mentol exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Reacțiile adverse pot fi minimizate prin utilizarea celei mai mici doze eficiente necesare pentru a controla simptomele, pentru cea mai scurtă durată posibilă.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile deoarece pot apărea dezechilibre ale florei microbiene de la nivelul cavității bucale cu risc de producere a unor infecții bacteriene sau fungice.

Adulți

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Mentol la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un interval de 24 de ore.

Populația pediatrică

Copii cu vârsta peste 6 ani: doza recomandată este similară cu cea pentru adulți.

Copii cu vârsta sub 6 ani

Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de pacienți.

Mod de administrare

Pentru administrare bucofaringiană.

Pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.

La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariției iritațiilor locale, trebuie să schimbați poziția pastilei în gură până la dizolvare.

Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils Mentol va fi administrat numai copiilor care pot păstra pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheați.

Dacă ați luat mai mult Strepsils Mentol decât trebuie

Poate apărea disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul și se iau măsurile de tratament simptomatice – pentru aceasta adresați-vă medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgențe.

Dacă ați uitat să luați Strepsils Mentol

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Strepsils Mentol

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

- reacții de hipersensibilitate (se pot manifesta sub formă de erupții cutanate, angioedem, urticarie, bronhospasm și hipotensiune cu sincopă), greață, disconfort oral, diaree.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Strepsils Mentol

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Strepsils Mentol după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Strepsils Mentol

- Substanțele active sunt amilmetacrezol 0,6 mg, alcool 2,4-diclorbenzilic 1,2 mg și levomentol 8 mg.
- Celelalte componente sunt: acid tartric, ulei de eucalipt, indigotină (E 132) (conține sodiu), zahăr, glucoză (conține amidon de grâu și dioxid de sulf (E220)).

Cum arată Strepsils Mentol și conținutul ambalajului

Strepsils Mentol se prezintă sub formă de pastile rotunde, de culoare albastră, cu miros de mentol și gust caracteristic acid.

Este disponibil în

Cutie cu un blister din PVC-PVdC/Al cu 12 pastile.

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 12 pastile

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 8 pastile

Cutie cu 3 blistere din PVC-PVdC/Al a câte 12 pastile

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr.48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11,
Sectorul 1, București, România

Fabricantul

RB NL Brands B.V.

Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol,

Olanda

Acest prospect a fost aprobat Iulie 2023