

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

PEROXID DE HIDROGEN 30 mg/ml soluție cutanată

Hydrogenii peroxydum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Peroxid de hidrogen și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Peroxid de hidrogen
3. Cum să luați Peroxid de hidrogen
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Peroxid de hidrogen
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Peroxid de hidrogen și pentru ce se utilizează

Peroxidul de hidrogen este o substanță din grupul antisepticelor cu acțiune oxidantă. Sub influența unor enzime se descompune în apă și oxigen atomic cu putere oxidativă mare, care acționează negativ asupra dezvoltării microbilor. La pătrunderea soluției în rană oxigenul degajat are și efect mecanic, înlăturând puroiul și corpii străini din rană în urma formării unei spume abundente. Această spumă contribuie la formarea cheagurilor de sânge și oprirea sângerărilor mici.

Peroxid de hidrogen se utilizează pentru prelucrarea rănilor superficiale, oprirea sângerărilor din vasele mici de sânge (capilare) în rănile superficiale, în sângerări nazale; gargarisme în stomatite, tonsilite; spălături în boli ginecologice.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Peroxid de hidrogen

Nu luați Peroxid de hidrogen

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la peroxid de hidrogen sau la alte componente ale acestui medicament enumerate la pct. 6.

Atenționări și precauții

A se evita contactul preparatului cu mucoasa ochiului.

Nu se utilizează pentru spălarea cavităților.

Lumina și căldura reduc activitatea preparatului.

Ușor iritant al pielii, ochilor și mucoaselor.

Peroxid de hidrogen împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Efectul tratamentului poate fi modificat dacă peroxidul de hidrogen este utilizat în același timp cu alte medicamente.

Acțiunea antiseptică scade în mediul alcalin. Sărurile metalelor, radicalii compușilor unor oxidanți reduc acțiunea peroxidului de hidrogen.

Peroxid de hidrogen împreună cu alimente și băuturi

Peroxid de hidrogen se utilizează cutanat.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Medicamentul poate fi utilizat în sarcină și în perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Preparatul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

3. Cum să luați Peroxid de hidrogen

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Administrare cutanată.

Porțiunile afectate (ale pielii, mucoaselor) se prelucrează cu un tampon de vată sau tifon, îmbibat în soluție de 10-30 mg/ml.

Pentru gargarisme și prelucrarea mucoaselor se utilizează soluție 2,5 mg/ml.

Dacă luați mai mult Peroxid de hidrogen decât trebuie

Nu sunt relatate cazuri de supradozare la utilizare cutanată.

Dacă uitați să luați Peroxid de hidrogen

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 utilizatori)

Senzație de usturime în timpul prelucrării răni.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 utilizatori)

Reacții alergice.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii

sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Peroxid de hidrogen

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină și umiditate.

Nu utilizați Peroxid de hidrogen după data de expirare înscrisă pe cutie după “Exp.:”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

1 ml soluție cutanată conține 100 mg peroxid de hidrogen 30%.

100 ml soluție cutanată conțin 10,00** g peroxid de hidrogen (soluție 30-40%*).

1000 ml soluție cutanată conțin 100,00** g peroxid de hidrogen (soluție 30-40%*).

* se face recalcul în dependență de concentrația materiei prime

** calcul efectuat cu concentrația materiei prime Peroxid de hidrogen 30%.

Celelalte componente sunt: acid fosforic, apă purificată.

Cum arată Peroxid de hidrogen

Soluție incoloră și limpede.

Câte 100 ml în flacoane de sticlă, de culoare brună etanșate cu capac din polietilenă.

Câte 100 ml sau 1000 ml în flacon din polietilenă de culoare brună, închis cu căpăcel din polietilenă.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

ÎCS Eurofarmaco SA,
MD-6826, șos. Chișinău-Hîncești, 10,
s. Sociteni, r-nul Ialoveni,
Republica Moldova,
tel./fax: (+373) 26 87 60 63

Fabricantul

ÎCS Eurofarmaco SA,
MD-6826, șos. Chișinău-Hîncești, 10,
s. Sociteni, r-nul Ialoveni,
Republica Moldova.

Acest prospect a fost aprobat în mai 2024

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>