

## Prospect: Informații pentru consumator/pacient

### Farington 5 mg/50 mg comprimate de supt

*Clorhexidină / Acid ascorbic*

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Farington și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Farington
3. Cum să utilizați Farington
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Farington
6. Conținutul ambalajului și alte informații

### **1. CE ESTE FARINGTON ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Farington este un medicament combinat, care constă din două componente: clorhexidină și acid ascorbic.

*Clorhexidină* posedă efect antibacterian puternic asupra bacteriilor care sunt agenți cauzali ale unor boli ale mucoasei faringelui și laringelui.

*Acidul ascorbic* reduce inflamația și edemul mucoasei gurii și nazofaringelui, mărește răspunsul imunitar și acționează ca un cofactor în sinteza de colagen și regenerarea țesuturilor.

Farington este un medicament utilizat pentru tratamentul local al simptomelor de inflamație a mucoasei faringelui și laringelui.

### **2. CE TREBUIE SA ȘTIȚI ÎNAINTE SA UTILIZAȚI FARINGTON**

#### **Nu utilizați Farington dacă:**

- sunteți alergic (hipersensibil) la clorhexidină, acid ascorbic sau la oricare dintre celelalte componente ale medicamentului (enumerat la pct. 6)

#### **Atenționări și precauții**

Înainte să luați utilizați Farington, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În special, spuneți-i medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă suferiți de diabet zaharat sau sunteți predispus la apariția cariilor dentare.

Utilizarea Farington poate modifica temporar simțul gustativ, însă acesta se restabilește complet timp de 4 ore după utilizarea medicamentului. Se recomandă să luați medicamentul după masă.

Farington nu se va administra mai mult de 14 zile.

Utilizarea îndelungată a Farington poate provoca o ușoară colorație temporară a dinților și a limbii,

dar aceste efecte dispar după întreruperea utilizării medicamentului sau, pentru a le elimina, poate fi necesară consultarea unui medic.

Dacă suferiți de boli digestive și/sau ale ficatului, ocazional puteți semna greață, vărsături și eructații. La apariția acestor simptome utilizarea medicamentului trebuie întreruptă și se va consulta medicul.

### **Copii și adolescenți**

Medicamentul nu se va utiliza la copii cu vârsta sub 12 ani.

### **Farington împreună cu alte medicamente**

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau intenționați să luați alte medicamente, inclusiv eliberate fără prescripție medicală.

### **Farington împreună cu alimente și băuturi**

Vă rugăm să utilizați Farington după masă. Nu se recomandă consumul abundent de lichide timp de 2 ore după utilizarea comprimatului.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să deveniți gravidă sau dacă alăptați, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Dacă sunteți gravidă sau alăptați vă rugăm să consultați medicul înainte de a utiliza Farington.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Farington nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Farington conține zahăr**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Poate dăuna dinților.

### **Farington conține colorantul Ponceau 4R (E124)**

Poate provoca reacții alergice.

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI FARINGTON**

Utilizați întotdeauna Farington exact așa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Trebuie să discutați cu medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulților și copiilor cu vârsta peste 12 ani se indică câte 1 comprimat de 4 ori pe zi (fiecare 6 ore).

### **Mod de utilizare**

Administrare bucofaringiană.

Comprimatul trebuie dizolvat lent în cavitatea bucală după masă și spălarea dinților. Nu se recomandă clătirea gurii sau consumul abundent de lichide timp de 2 ore după utilizarea comprimatului.

### **Dacă luați mai mult Farington decât trebuie**

Dacă ați utilizat mai multe comprimate decât vi s-a prescris sau dacă altcineva a luat accidental

medicamentul dumneavoastră, vă rugăm să anunțați de urgență medicul.

### **Dacă uitați să luați Farington**

Dacă ați uitat să luați o doză, luați medicamentul imediat ce vă amintiți. Totuși, dacă este timpul pentru următoarea doză, luați-o doar pe aceasta. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să luați Farington**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, Farington poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

*Rare (care afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți)*

- sunt posibile reacții alergice, incluzând nas înfundat, erupții pe piele, descumarea mucoasei gurii și edemul glandelor parotidiene);
- iritații sau inflamații ale mucoasei gurii, iritația mucoasei stomacului și diaree;
- utilizarea mai mult de 7 zile poate provoca colorarea temporară a rădăcinii limbii, a suprafețelor dinților și a obturațiilor din acrilat.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Farington**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Farington după data de expirare înscrisă pe cutie sau blister. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Farington**

*Substanțele active sunt* clorhexidina și acidul ascorbic.

- Fiecare comprimat de supt conține diclorhidrat de clorhexidină de 5 mg și acid ascorbic 50 mg.

- *Celelalte componente sunt:* zahăr, metilceluloză, stearat de magneziu, talc, colorant Ponceau 4R (E 124), colorant galben de chinolină (E 104), aromă de portocală.

### **Cum arată Farington și conținutul ambalajului**

Farington se prezintă sub formă de comprimate plat-cilindrice, cu margini teșite, de culoare portocaliu-deschis. Se admite prezența incluziunilor pe suprafața comprimatelor.

Farington este disponibil în cutii cu 2 blistere a câte 10 comprimate de supt.

### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

#### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

SA Uzina de vitamine din Kiev,

str. Kopîlovskaya 38,

04073, or. Kiev, Ucraina,

Tel.: (044) 461-03-08,

Fax: (044) 461-03-01

#### **Fabricantul**

SA Uzina de vitamine din Kiev,

str. Kopîlovskaya 38,

04073, or. Kiev Ucraina.

**Acest prospect a fost revizuit în octombrie 2023.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>