

Prospect: Informații pentru consumator / pacient

MAGNICUM 470 mg/5 mg comprimate gastrorezistente

Magnesii lactas / Pyridoxinum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- *Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.*
- *Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.*
- *Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.*
- *Dacă după câteva zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.*

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este MAGNICUM și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați MAGNICUM
3. Cum să luați MAGNICUM
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează MAGNICUM
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este MAGNICUM și pentru ce se utilizează

MAGNICUM conține lactat de magneziu dihidrat și clorhidrat de piridoxină pentru profilaxia complicațiilor, asociate cu deficitul magneziului și/sau vitaminei B6.

MAGNICUM este utilizat pentru:

- tratamentul deficienței de magneziu în organism: oboseala fizică și intelectuală cronică, stres, depresii, tulburări de somn, mialgie, profilaxia arterosclerozei și infarctului miocardic;
- hipomagneziemia cauzată de tabacism și alcoolism, de administrarea îndelungată a laxativelor, contraceptivelor, unor diuretice sau a diurezei osmotice la pacienții cu diabet zaharat;
- în cadrul tratamentului complex al afecțiunilor cardiovasculare, cum ar fi hipertensiunea arterială, insuficiența cardiacă congestivă.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați MAGNICUM

Nu luați MAGNICUM

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă aveți probleme serioase cu rinichii (insuficiență renală severă);
- dacă aveți exces de magneziu, exces de vitamină B₆;
- dacă aveți tulburări de conducere cardiacă (bloc atrio-ventricular);
- dacă aveți tensiune arterială joasă;
- dacă aveți miastenie gravă (oboseală anormală și rapidă, până la epuizare, la cele mai mici eforturi);
- dacă suferiți de boala Parkinson (tremor și rigiditate musculară);
- dacă aveți diaree (scaun lichid).

Atenționări și precauții

Înainte să luați MAGNICUM, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Spuneți medicului dumneavoastră, dacă:

- aveți probleme cu rinichii (insuficiență renală moderată);
- aveți probleme cu inima (insuficiență cardiacă);
- aveți deficiență concomitentă de calciu.

Nu depășiți doza recomandată de medicul dumneavoastră.

Copii

MAGNICUM nu se indică la copii sub 12 ani, deoarece nu există experiență clinică suficientă la această categorie de vârstă.

MAGNICUM împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripție medicală.

Spuneți medicului dumneavoastră, dacă luați în special:

- medicamente, care conțin fosfați și săruri de calciu;
- diuretice (medicamente, care contribuie la eliminarea apei din organism);
- antibiotice (utilizate în tratamentul infecțiilor), de exemplu tetraciclină, aminoglicozide, colistină;
- relaxante musculare;
- cisplatină (utilizată în tratamentul cancerului);
- cicloserină, izoniazidă (utilizate în tratamentul tuberculozei);
- mineralocorticoizi;
- teofilină (utilizată în tratamentul astmului bronșic);
- suplimente de fier, fluor;
- anticoagulante orale, de exemplu warfarină (medicamente care previn formarea cheagurilor de sânge);
- hidralizină (medicament pentru scăderea tensiunii arteriale);
- penicilamină (pentru intoxicații cu metale sau artrită reumatoidă);
- contraceptive orale;
- levodopa (medicament pentru tratamentul bolii Parkinson).

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea deveni gravidă sau intenționați să deveniți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a utiliza orice medicament.

Trebuie să luați Magnicum doar după ce ați discutat cu medicul dumneavoastră beneficiile potențiale și riscurile potențiale pentru copilul dumneavoastră încă nenăscut. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează capacitatea de conducere a autovehiculelor și de manevrare a utilajelor.

3. Cum să luați MAGNICUM

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

În scop profilactic: la adulți și copii cu vârsta peste 12 ani - 2 comprimate 1 dată pe zi, sau 1-2 comprimate de 2 ori pe zi.

Pentru tratament: doar conform indicației medicului. Durata tratamentului o determină medicul.

Comprimatul se va înghiți întreg cu un pahar de apă.

Copii cu vârsta sub 12 ani

Medicamentul nu se administrează copiilor cu vârsta sub 12 ani.

Mod de administrare

Administrare orală, comprimatul se va înghiți întreg cu un pahar de apă.

Dacă luați mai mult MAGNICUM decât trebuie

Dacă ați luat în mod accidental prea mult din medicamentul dumneavoastră, contactați medicul dumneavoastră sau farmacistul, cât mai curând posibil.

Dacă luați o cantitate mai mare decât doza zilnică recomandată și aveți probleme cu rinichii, pot apărea grețuri, vomă, scăderea tensiunii arteriale, slăbiciune musculară, respirație dificilă, dureri în extremități, scăderea reflexelor tendinoase.

Dacă uitați să luați MAGNICUM

Nu luați o doză dublă pentru a compensa o doză uitată.

Dacă încetați să luați MAGNICUM

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane):

- dureri abdominale, constipații, diaree, grețuri, vomă)
- manifestări ale reacțiilor alergice (mâncărime, urticarie, erupții cutanate).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail: farmacovigilenta@amed.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează MAGNICUM

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține MAGNICUM

- Substanțe active

1 comprimat conține lactat de magneziu dihidrat – 470 mg, echivalent cu magneziu – 48 mg și clorhidrat de piridoxina – 5 mg.

- Celelalte componente sunt: celuloză microcristalină, alcool polivinilic, dioxid de siliciu coloidal anhidru, talc, stearat de magneziu.

Filmul: amestec de acoperire pentru peliculă enterică acrilică-EZE albă (copolimer de acid metacrilic, dioxid de siliciu coloidal anhidru, bicarbonat de sodiu, laurilsulfat de sodiu, talc, dioxid de titan (E 171), trietil citrat).

Cum arată MAGNICUM și conținutul ambalajului

MAGNICUM se prezintă sub formă de comprimate gastrorezistente de formă alungită, biconvexe, de culoare albă sau aproape albă.

Cutie cu 5 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina.

04073, or. Kiev, str. Kopîlovskaya, 38.

Tel. (044) 461-03-08, fax (044) 461-03-01

Fabricantul

Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina.

04073, or. Kiev, str. Kopîlovskaya, 38.

Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2019.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>