

**Prospect: informații pentru consumator/pacient**  
**Antigripal FORTE cu gust de lămâie pulbere pentru soluție orală**  
**Antigripal FORTE cu gust de portocale pulbere pentru soluție orală**  
Paracetamol / Acid ascorbic / Cafeină / Clorhidrat de fenilefrină / Maleat de feniramină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Antigripal FORTE și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Antigripal FORTE
3. Cum să luați Antigripal FORTE
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Antigripal FORTE
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Antigripal FORTE și pentru ce se utilizează**

Antigripal Forte este un medicament combinat, care conține câteva substanțe active, destinate să combată simptomele răcelii și gripei: paracetamol, cafeină, fenilefrină, feniramină și acid ascorbic (vitamina C). Paracetamolul ameliorează durerea care apare în stări de răceală (durerea de gât, dureri de cap, dureri musculare și articulare) și reduce febra.

Cafeina crește efectul analgezic (de reducere a durerii) al paracetamolului și reduce senzația de oboseală. Maleatul de feniramină este un antihistaminic, care reduce permeabilitatea vaselor de sânge, înlăturând lăcrimarea, mâncărimea ochilor și a nasului.

Clorhidratul de fenilefrină este un decongestionant, care vă desfundă nasul și sinusurile, ajutându-vă să respirați mai ușor.

Acidul ascorbic (vitamina C) contribuie la creșterea rezistenței organismului la infecții.

Antigripal Forte este indicat la adulți pentru:

Tratamentul simptomatic (înlăturarea simptomelor) al răcelii, IRVA (infecțiilor respiratorii virale acute, însoțite de febră, durere, guturai) și gripei.

**2. Ce trebuie să știți înainte să luați Antigripal FORTE**

**Nu utilizați Antigripal Forte dacă:**

- sunteți alergic (hipersensibil) la cafeină, paracetamol, fenilefrină, feniramină, vitamina C sau la oricare dintre componentele acestui medicament, enumerate la punctul 6
- dacă utilizați alte medicamente, care conțin substanțe active similare celor din Antigripal Forte

- aveți probleme serioase cu ficatul (insuficiență hepatică ușoară sau moderată sau severă)
- suferiți de anumite boli ale ficatului- hiperbilirubinemii congenitale (sindromul Gilbert, Dubin-Johnson și Rotor): ficatul nu procesează eficient bilirubina din cauza unei anomalii genetice
- aveți hepatită acută (inflamație acută a ficatului)
- aveți deficit de glucozo-6- fosfatdehidrogenază (boală ereditară, în care la om lipsește enzima glucozo-6-fosfatdehidrogenază)
- consumați alcool în exces
- aveți probleme serioase cu rinichii (insuficiență renală moderată sau severă)
- aveți o boală a vaselor de sânge ale inimii, manifestată prin dureri în regiunea inimii (cardiopatie ischemică sau boala coronariană) sau o boală a inimii (de exemplu, tulburări severe ale ritmului inimii)
- aveți tensiune arterială înaltă
- aveți diabet zaharat
- aveți funcția crescută a glandei tiroide (hipertiroidism)
- aveți tensiune intraoculară crescută (glaucom)
- aveți mărire a prostatei (adenom de prostată) cu probleme la urinare
- suferiți de îngustarea segmentului stomacului în apropiere de duoden (stenoză piloro-duodenală)
- aveți feocromocitom (tumoare a suprarenalei)
- dacă utilizați antidepresive triciclice, inhibitori ai monoaminooxidazei (MAO) (medicamente administrate în depresie) sau le-ați întrerupt în mai puțin de 2 săptămâni, beta-adrenoblocante (medicamente utilizate în tratamentul aritmiilor și tensiunii mărite)
- dacă sunteți gravidă; dacă alăptați

Antigripal Forte nu se administrează la copii și adolescenți (vârsta sub 18 ani).

### **Atenționări și precauții**

Nu depășiți dozele recomandate!

Nu administrați concomitent cu alte medicamente, destinate pentru tratamentul simptomatic al răcelii și guturaiului (remedii care desfundă nasul, remedii cu conținut de paracetamol), precum și cu alte medicamente pentru răceală și gripă.

Antigripal Forte conține paracetamol. Utilizarea concomitentă cu alte produse care conțin paracetamol poate duce la supradozaj. Supradozajul paracetamolului poate afecta grav ficatul (insuficiență hepatică) și poate necesita transplant de ficat sau poate duce la deces.

Au fost raportate cazuri de disfuncție/insuficiență hepatică la pacienți grav subnutriți, cu masa corpului foarte scăzută, slăbiți sau care sunt consumatori cronici de alcool.

Riscul de supradozaj este mai mare în caz de boli ale ficatului.

**Spuneți medicului dacă ați avut sau aveți orice boală a ficatului sau dacă consumați alcool.** S-ar putea ca medicul să vă indice anumite analize de laborator sau să vă aleagă un medicament cu doză mai mică de paracetamol.

Înainte de a folosi acest medicament discutați cu medicul dvs. dacă aveți:

- boli ale plămânilor, precum astm bronșic, boala pulmonară obstructivă cronică, emfizem, bronșită cronică

- epilepsie
- mărirea volumului prostatei (adenom de prostată)
- afecțiuni ale vaselor de sânge (de exemplu, boala Raynaud: ca urmare a frigului sau stresului degetele de la mâini și picioare amorțesc, devin reci, inițial albe, apoi vineții)
- afecțiuni cardiovasculare
- aveți boli de sânge (hipercoagulare - sângele vi se încheagă prea repede, anemie hemolitică- aveți o cantitate redusă de globule roșii din cauza distrugerii lor)
- aveți boli ale rinichilor. În caz de insuficiență renală, forma ușoară, puteți lua Antigripal Forte numai sub supraveghere medicală. În caz de insuficiență renală, forma moderată și severă, Antigripal Forte este contraindicat.

Dacă sunteți persoană vârstnică, vă rugăm să consultați medicul înainte de a lua acest medicament deoarece ați putea manifesta o excitație paradoxală cauzată de prezența feniraminei (cum ar fi energie crescută, neliniște, nervozitate).

În timpul tratamentului cu Antigripal Forte, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: dacă aveți boli severe, inclusiv insuficiență renală severă sau septicemie (când în sânge circulă bacterii și toxine care duc la leziuni ale organelor), dacă sunteți malnutrit, aveți alcoolism cronic sau dacă luați și flucloxacilină (un antibiotic). O afecțiune gravă numită acidoză metabolică (tulburări ale sângelui și lichidelor) a fost raportată la pacienții aflați în aceste situații, în cazul în care paracetamolul se utilizează în doze regulate pentru o perioadă lungă sau când paracetamolul este administrat concomitent cu flucloxacilină. Simptomele acidozei metabolice pot fi: dificultăți la respirație grave, cu respirație rapidă profundă, somnolență, greață și vărsături.

Medicamentul conține acid ascorbic (vitamina C) care în doze mari are un efect ușor stimulant. Nu luați Antigripal Forte concomitent cu alte medicamente cu conținut de vitamina C.

Fenilefrina din compoziția medicamentului poate provoca accese de dureri în regiunea inimii. După utilizarea de fenilefrină au fost înregistrate cazuri de criză hipertensivă (mărire importantă a tensiunii arteriale), care au dus la sângerări la nivelul creierului. **Nu depășiți doza recomandată! Adresați-vă imediat medicului sau la urgență în aceste cazuri.**

Acest medicament poate duce la somnolență și concentrare redusă, care pot fi agravate de consumul simultan de alcool sau alte substanțe cu acțiune depresivă asupra sistemului nervos central. Nu conduceți autovehicule, nu lucrați cu utilaje periculoase, nu îndepliniți sarcini potențial periculoase, deoarece ar putea duce la accidente.

Nu se recomandă să luați acest medicament la sfârșitul zilei, deoarece acidul ascorbic în doze mari și cafeina au un efect stimulant (risc de apariție a insomniei).

Antigripal Forte conține cafeină. Dacă suferiți de boli ale inimii, discutați cu medicul dvs. înainte de a lua acest medicament.

Nu luați Antigripal Forte dacă aveți tensiune arterială mărită.

Adresați-vă la medic în caz că febra și alte simptome persistă sau observați agravare a stării.

Pe durata tratamentului cu Antigripal Forte nu luați medicamente pentru insomnie și pentru liniștire.

Copii și adolescenți

Antigripal Forte nu se administrează la copii și adolescenți (vârsta sub 18 ani).

### **Antigripal Forte împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv cele eliberate fără prescripție medicală.

Substanțele active din compoziția Antigripal Forte pot influența acțiunea altor medicamente. De asemenea alte medicamente pot influența acțiunea Antigripal Forte.

#### Nu luați Antigripal Forte împreună cu:

- alte medicamente care conțin aceleași substanțe active;
- barbiturice, de exemplu fenobarbital, alte somnifere (utilizate în tulburări de somn) și medicamente pentru liniștire (tranchilizante, anxiolitice);
- inhibitorii MAO, precum isocarboxazid, fenelzina; antidepressivele triciclice, precum amitriptilina (medicamente utilizate pentru tratamentul depresiei); guanetidina; digoxina sau alte glicozide cardiace (medicamente utilizate în boli de inimă). Toate acestea pot provoca o creștere bruscă a tensiunii arteriale sau alte probleme ale inimii;
- rezerpina, metildopa, debrisochina;
- ciclosporina

Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați:

- flucloxacilină (antibiotic), din cauza unui risc grav de tulburare a sângelui și lichidelor (numită acidoză metabolică) care necesită tratament de urgență (vezi pct. 2),

Spuneți medicului sau farmacistului, dacă utilizați, în special:

- metoclopramidă și domperidon (utilizate în afecțiunile tractului digestiv, însoțite de așa simptome ca grețuri și vărsături);
- colestiramină (medicament utilizat pentru reducerea nivelului de colesterol);
- heparină, warfarină și alte anticoagulante (medicamente, care previn formarea chiagurilor de sânge);
- remedii anticonvulsivante, inclusiv fenitoina, carbamazepina, lamotrigină (medicamente utilizate în epilepsie);
- medicamente pentru boala Parkinson (de ex. levodopa, selegilină)
- litiu (utilizat pentru tulburări psihiatrice)
- contraceptive orale (utilizate pentru prevenirea unei sarcini nedorite);
- riscul de afectare a ficatului poate crește la asocierea cu:
  - \*antifungice (medicamente pentru tratamentul infecțiilor fungice) - derivați de imidazol, precum miconazol, ketoconazol;
  - \*carmustina și înrudite (utilizate în chimioterapia tumorilor);
  - \*doxorubicina și înrudite;
  - \*mercaptipurina, metotrexat, săruri de aur;
  - \*rifampicină, izoniazidă (utilizată în tratamentul tuberculozei);
  - \*diflunisal.

- salicilați (aspirina, salicilamida) sau alte antiinflamatoare nesteroidiene (diclofenac, nimesulid, ketoprofen). Pe termen lung și la doze mari, crește riscul de afectare a rinichilor. Asocierea paracetamol-salicilați trebuie administrată pe termen scurt.
- cisaprida (utilizată în tulburări ale tractului digestiv)
- cloramfenicol (pentru tratamentul infecțiilor)
- interferon
- zidovudină, indinavir (utilizată în infecția cu HIV)
- morfina, codeina, oxicodona, meperidina, fentanil, medicamente utilizate în anestezie (de ex. halotan). Dacă urmează să aveți o anestezie, informați medicul anesteziolog că luați Antigripal Forte.
- antiacide (utilizate pentru a trata arsurile stomacale), cărbune activat
- remedii beta-blocate (labetolol, propranolol) utilizate pentru a scădea tensiunea arterială crescută
- efedrina, metoxamina, salbutamol
- ergotamină și metisergidă, utilizate în migrenă
- atropina
- desferioxamina, utilizată în intoxicațiile cu preparate de fier
- disulfiram (pentru tratamentul alcoolismului)

Antigripal Forte poate modifica rezultatele anumitor teste de laborator, inclusiv zahărul în sânge. Informați personalul de laborator că luați Antigripal Forte.

### **Antigripal Forte împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Utilizarea cafelei, ceaiului sau a unor băuturi energizante îmbuteliate, concomitent cu tratamentul cu Antigripal Forte poate determina stare de nervozitate și iritabilitate sau poate mări tensiunea arterială, deaceea nu este recomandată.

Nu consumați alcool în timpul tratamentului cu Antigripal Forte.

### **Sarcina și alăptarea**

Antigripal Forte este contraindicat în sarcină și perioada de alăptare.

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Antigripal Forte poate cauza somnolență, amețeli și vedere încețoșată. Pe durata tratamentului evitați conducerea autovehiculelor și efectuarea altor activități potențial periculoase, care necesită concentrare sporită a atenției și reacții rapide.

Antigripal Forte conține 3,13 g zahăr/doză. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Antigripal Forte conține sodiu < 1 mmol (23 mg) pe doză, adică practic "nu conține sodiu".

### **3. Cum să luați Antigripal FORTE**

Utilizați întotdeauna Antigripal FORTE exact așa cum este descris în acest prospect sau cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Înainte de administrare pulberea trebuie dizolvată în apă.

Conținutul unui plic se va turna într-un pahar, care se va umple apoi până la jumătate cu apă fierbinte. Se amestecă bine. La nevoie, se va adăuga apă rece.

### Adulți

Trebuie utilizată doza minimă eficace.

Se administrează un plic cu pulbere pentru soluție orală de 1-2 ori pe zi, în funcție de necesitate.

Nu trebuie depășită doza de 2 plicuri în 24 ore.

Intervalul minim între administrări trebuie să fie de 8 ore.

Dacă sunteți vârstnic, slăbit și aveți boli concomitente, vă rugăm să discutați cu medicul sau farmacistul înainte de a lua acest medicament. S-ar putea să vi se indice o altă formă cu doze mai mici.

### Copii și adolescenți

Nu este recomandat copiilor și adolescenților cu vârsta mai mică de 18 ani.

### Insuficiență hepatică

Antigripal Forte nu se recomandă pacienților cu insuficiență hepatică, din cauza conținutului în paracetamol al produsului. Paracetamolul în doze unice de 750 mg nu trebuie utilizat de către pacienții cu insuficiență hepatică; în aceste cazuri este necesară o doză redusă.

Sunt disponibile pentru utilizare forme farmaceutice și doze adecvate pentru acești pacienți. Discutați cu medicul sau farmacistul.

### Insuficiență renală

Antigripal Forte trebuie utilizat cu precauție și sub supraveghere medicală la pacienții cu insuficiență renală ușoară.

Paracetamolul în doze unice de 750 mg nu trebuie utilizat de către pacienții cu insuficiență renală moderată și severă; în aceste cazuri este necesară o doză redusă.

Sunt disponibile pentru utilizare forme farmaceutice și doze adecvate pentru acești pacienți. Discutați cu medicul sau farmacistul.

Antigripal Forte nu trebuie utilizat mai mult de 5 zile fără recomandarea medicului.

### **Dacă luați mai mult Antigripal Forte decât trebuie**

În caz de supradozare adresați-vă imediat la medic sau sunați la urgență. Acordarea rapidă a ajutorului medical este critic important, chiar dacă nu se observă nici un semn sau simptom.

Ingestia unei supradoze de paracetamol de 7,5 g sau mai mult la adulți, sau de 140 mg/kg corp la copii poate avea o evoluție fatală prin afectarea gravă și ireversibilă a rinichilor și a ficatului.

### Simptome:

Greață, vărsături, durere în abdomen, durere în spate, lipsa poftei de mâncare, paloare, indispoziție și transpirație abundentă, sânge în urină, durere de cap, agitație, insomnie, amețeli, somnolență, tulburări ale conștienței, tulburări de vedere, aritmii, tremor, convulsii, creșterea presiunii intraoculare, tensiune arterială înaltă, psihoză, comă; somnolență care poate fi urmată de agitație (în special la copii).

### Tratament:

Tratamentul imediat este esențial în cazul supradozajului, chiar și în cazul în care simptomele supradozării nu sunt prezente. Este necesară spitalizare pentru o supraveghere medicală atentă. Trebuie internat în spital orice pacient care a ingerat 5 g sau mai mult de paracetamol în ultimele 4 ore.

Tratamentul cu cărbune activ trebuie avut în vedere dacă supradozajul a avut loc cu maximum 1 oră în urmă. Se recomandă efectuarea imediată a lavajului gastric, dacă medicamentul a fost ingerat în ultimele 4 ore.

Antidoți prin neutralizarea paracetamolului sunt: metionina și N-acetilcisteina.

Pe lângă administrarea antidotului se instituie tratament în funcție de simptome și de susținere a funcțiilor vitale.

### **Dacă uitați să utilizați Antigripal Forte**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Antigripal Forte**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

**Dacă apar aceste reacții adverse grave, opriți utilizarea medicamentului și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la cel mai apropiat spital:**

Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10 000 persoane:

- Febra, frisoane, dureri în gât sau ulceratii la nivelul gurii. Aceste simptome pot fi asociate cu agranulocitoza (scăderea numărului sau dispariția completă a unui tip de celule albe din sânge, numite granulocite, în sânge).
- Slăbiciune generală, infecție, febră persistentă, vânătăi, sângerare, paloare. Acestea pot fi semne de pancitopenie (o scădere a tuturor tipurilor de celule sanguine).
- Eruptii pe piele (urticarie), mâncărime a întregului corp, umflare bruscă a ochilor, senzație de strângere în piept asociată cu dificultăți de respirație sau înghițire, transpirații reci, amețeli, stare confuzională, modificarea culorii pielii, leșin. Acesta poate fi un șoc anafilactic, o reacție anafilactică / anafilactoidă (reacție alergică care pune în pericol viața).
- Reacții severe ale pielii, însoțite de febră și alterarea stării generale, de exemplu: agravarea erupției cutanate cu vezicule și leziuni ale mucoaselor nasului, gurii, oranelor genitale și descuamări ale pielii (sindrom Stevens-Johnson); exfoliere extinsă a pielii (pe mai mult de 30 % din suprafața corpului - necroliză epidermică toxică); erupție solzoasă, cu înroșire a pielii, noduli sub piele și vezicule (pustuloză exantematoasă).
- Bătăi anormale ale inimii, creșterea bruscă a tensiunii arteriale. Dureri în regiunea inimii (frecvența necunsocută)

Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane

- Umflarea (edemul) feței și gâtului cu dificultăți de respirație și înghițire (edem angioneurotic).
- Îngălbenirea pielii și mucoaselor/ochilor, dureri în abdomen, stare de rău, greață: acestea pot fi semne de afectare a ficatului.

Alte reacții adverse

**Rare:** pot afecta până la 1 din 1000 persoane

- durere de cap, amețeli
- vedere încețoșată, vedere dublă
- uscăciunea gurii, nasului, gâtului,

- bronhospasm (spasmul bronhiilor cu senzație de lipsă de aer)
- lipsa poftei de mâncare, greață, vomă, dureri de stomac, diaree, indigestie, constipație
- creșterea nivelului enzimelor ficatului în sânge, funcție anormală a ficatului, insuficiență hepatică, necroză hepatică, icter (îngălbenirea pielii și mucoaselor)
- erupții cutanate, mâncărime, urticarie

**Foarte rare:** pot afecta până la 1 din 10 000 persoane

- anemie (scăderea numărului de celule roșii în sânge), trombocitopenie (scăderea numărului de plachete în sânge), anemie hemolitică (distrugerea sporită a celulelor roșii în sânge), anemie aplastică (scăderea producerii de către măduva osoasă a tuturor tipurilor de celule sanguine), methemoglobinemie (creșterea cantității de methemoglobină în sânge), leucopenie (scăderea numărului celulelor albe în sânge)
- reacții alergice (hipersensibilitate)
- tremor, somnolență, tulburări de adormire, hiperexcitabilitate, insomnie, anxietate (frică, atacurile de panica). În cazuri unice – comă, convulsii, mișcări anormale.
- midriază (dilatarea pupilei), pareza acomodatiei (imposibilitatea de a focusa privirea pe obiecte mărunte îndeaproape), creșterea tensiunii intraoculare
- tahicardie (accelerarea frecvenței contracțiilor cardiace), bătăi de inimă rapide și puternice
- afectare toxică a rinichilor, inflamația / necroza țesutului rinichilor.

**Cu frecvență „necunoscută”** (care nu poate fi estimată din datele disponibile):

- afecțiune gravă care poate face sângele mai acid (numită acidoză metabolică), la pacienții cu boală severă care utilizează paracetamol (vezi pct. 2)

#### Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe website-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amdm.gov.md](http://www.amdm.gov.md) sau e-mail: [farmacovigilenta@amdm.gov.md](mailto:farmacovigilenta@amdm.gov.md)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Antigripal FORTE**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la loc protejat de lumină și temperaturi sub 25 °C.

Nu utilizați Antigripal Forte după data de expirare înscrisă pe ambalaj după „EXP”.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a rezidurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

#### **Ce conține Antigripal FORTE**

1 plic (4,97 g) conține:

Substanțe active:

Paracetamol 750 mg  
Acid ascorbic 200 mg  
Cafeină anhidră 30 mg  
Clorhidrat de fenilefrină 10 mg  
Maleat de feniramină 20 mg

Celelalte componente sunt:

Acid citric  
Zaharinat de sodiu  
Citrat de sodiu  
Sucroză  
Aromă de lămâie (pentru Antigripal FORTE Cu aroma de lămâie)  
Aromă de portocale (pentru Antigripal FORTE Cu aroma de portocale)

**Cum arată Antigripal Forte și conținutul ambalajului**

Pulbere pentru soluție orală

Pulbere de culoare albă până la ușor gălbuie, cu posibile aglomerări ușor dezagreabile, cu aromă de lămâie sau portocale.

Cutie cu 10 sau 30 plicuri plate termosigilate, a câte 4,97 g pulbere pentru soluție orală.

**Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

**Deținătorul certificatului de înregistrare**

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova

email: [office@balkanpharmaceuticals.com](mailto:office@balkanpharmaceuticals.com)

**Fabricantul**

SC Balkan Pharmaceuticals SRL,

str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova

Acest prospect a fost revizuit în: iulie 2025

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>.