

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

LAXSENNUM-FORTE 140 mg comprimate

Senna glycosides

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este LAXSENNUM-FORTE și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați LAXSENNUM-FORTE
3. Cum să utilizați LAXSENNUM-FORTE
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează LAXSENNUM-FORTE
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. CE ESTE LAXSENNUM-FORTE ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

LAXSENNUM-FORTE este un medicament laxativ de origine vegetală cu influență asupra motilității intestinului gros. Acțiunea farmacologică este determinată de antraglicozide (senozide A și B), de asemenea și alte glicozide, conținute în frunzele de senna (siminichie).

Efectul laxativ se manifestă după 8-12 ore.

LAXSENNUM-FORTE este indicat pe termen scurt în caz de constipații ocazionale.

2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI LAXSENNUM-FORTE

Nu luați LAXSENNUM-FORTE

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la pct. 6);
- dacă suferiți de obstrucții sau stenoze (îngustări) intestinale;
- dacă aveți atonie intestinală (scăderea peristaltismului și pierderea tonusului);
- dacă aveți apendicită;
- dacă aveți o boală inflamatorie intestinală acută (boala Crohn, colită ulcerativă);
- dacă aveți dureri abdominale de origine neclară;
- dacă aveți deshidratare severă cu pierdere de apă și săruri;
- dacă sunteți gravidă sau alăptați;
- la copii cu vârsta sub 12 ani.

Atenționări și precauții

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest medicament:

- dacă aveți necesitate zilnică în laxative – în acest caz medicul trebuie să stabilească cauza constipației;

- dacă aveți dureri abdominale, greață și vărsături de origine neclară, deoarece aceste simptome pot fi semne ale unui blocaj intestinal potențial sau existent;
- dacă utilizați medicamente pentru tratamentul bolilor de inimă și a tulburărilor de ritm cardiac (glicozide cardiace, remedii antiaritmice, medicamente care prelungesc intervalul QT), medicamente pentru eliminarea apei (diuretice), corticosteroizi sau preparate pe bază de rădăcină de lemn dulce;
- dacă aveți probleme cu rinichii.

Evitați utilizarea îndelungată a medicamentului, deoarece utilizarea pe termen lung poate duce la afectarea funcției intestinale și dependență de laxative.

Utilizați LAXSENNUM-FORTE numai dacă nu puteți normaliza scaunul prin schimbarea dietei sau prin administrarea produselor, care cresc volumul bolului fecal (tărâțe, psyllium);

La administrarea de LAXSENNUM-FORTE adulților cu incontinență fecală, scutecele trebuie schimbate mai frecvent, pentru a preveni contactul prelungit a pielii cu masele fecale.

Dacă simptomele se agravează în timpul utilizării de LAXSENNUM-FORTE, consultați medicul sau farmacistul.

LAXSENNUM-FORTE împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

În special, spuneți medicului dumneavoastră dacă luați:

- glicozide cardiace (utilizate în boli de inimă);
- remedii antiaritmice (medicamente utilizate în tulburări de ritm cardiac);
- diuretice (medicamente pentru eliminarea apei din organism);
- corticosteroizi (utilizați în boli alergice, inflamatorii, autoimune);
- preparate pe bază de rădăcini de lemn dulce.

LAXSENNUM-FORTE împreună cu alimente și băuturi

Comprimatele se administrează oral, cu o cantitate mică de lichid, înainte de somn.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

LAXSENNUM-FORTE este contraindicat în sarcină și perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu au fost efectuate studii pentru a determina efectul asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

LAXSENNUM-FORTE conține lactoză monohidrat.

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a utiliza acest medicament.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI LAXSENNUM-FORTE

Utilizați întotdeauna LAXSENNUM-FORTE exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doze

Se administrează oral cu o cantitate mică de lichid.

Adulților, pacienților vârstnici și copiilor cu vârsta peste 12 ani se recomandă administrarea a 1 comprimat, 1 dată pe zi, seara, înainte de somn.

Nu folosiți mai mult de 1 săptămână. De obicei este suficient să luați LAXSENNUM-FORTE de 2-3 ori pe durata unei săptămână.

Dacă simptomele persistă în timpul utilizării medicamentului, consultați medicul sau farmacistul.

Copii și adolescenți

Nu se utilizează la copii cu vârsta sub 12 ani.

Dacă ați utilizat mai mult LAXSENNUM-FORTE decât trebuie

Dacă ați utilizat accidental mai mult LAXSENNUM-FORTE decât vi s-a prescris, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la departamentul de urgențe al celui mai apropiat spital.

Principalele simptome ale supradozajului/abuzului sunt durerea severă și diareea, urmată de pierderea lichidului și sărurilor.

Pe durata tratamentului trebuie să consumați mult lichid.

Dacă ați uitat să utilizați LAXSENNUM-FORTE

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați LAXSENNUM-FORTE

Luați LAXSENNUM-FORTE întreaga perioadă de tratament stabilită de medicul dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacțiilor adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse cu frecvență necunoscută (care nu pot fi estimate din datele disponibile)

- reacții alergice (mâncărime, urticarie, exantem local sau generalizat);
- dureri abdominale, spasme și diaree, în special la pacienții cu colon iritabil (în acest caz e necesar de redus doza);
- pigmentarea mucoasei intestinale (pseudomelanoză intestinală), care de obicei regresează la întreruperea medicamentului;
- la utilizarea îndelungată poate duce la tulburări ale echilibrului apei și sărurilor și apariția de albumine (albuminurie) și a sângelui (hematurie) în urină;
- modificarea culorii urinei (galbenă sau brun-roșietică, în funcție de valorile pH-ului, care este produsă de către metaboliți și nu are semnificație clinică).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: <http://amdm.gov.md> sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. CUM SE PĂSTREAZĂ LAXSENNUM-FORTE

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu utilizați LAXSENNUM-FORTE după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

Ce conține LAXSENNUM-FORTE

Substanța activă este: extract din frunze de siminichie (Senna).

1 comprimat conține suma extractului din frunze de siminichie (săruri de calciu ale senozidelor A și B), în recalcul la conținutul de 20% săruri de calciu ale senozidelor A și B -140 mg (echivalent a 28 mg sumă de săruri de calciu ale senozidelor A și B).

Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de porumb, vanilie, stearat de magneziu, acid stearic, talc.

Cum arată LAXSENNUM-FORTE și conținutul ambalajului

Comprimate cilindrice, cu suprafața superioară și inferioară plată, margini teșite, cu linie mediană, de culoare de la brun-deschis până la brun-închis, cu incluziuni și cu aromă de vanilie.

Câte 10 comprimate în blister din PVC/Al cu plasare în cutie a câte 2 sau 10 blistere.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SA Lubnypharm,
str. Barvinkov 16, or. Lubnî,
37500, reg. Poltava, Ucraina.

Fabricantul

SA Lubnypharm,
str. Barvinkov 16, or. Lubnî,
37500, reg. Poltava, Ucraina.

Acest prospect a fost aprobat în mai 2025.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>