

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

PICĂTURI CARDIACE-MC picături orale, soluție

Valeriana officinalis L., Leonurus cardiaca L., Crataegus monogyna L.

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 14 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Picături cardiace-MC și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Picături cardiace-MC
3. Cum să luați Picături cardiace-MC
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Picături cardiace-MC
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Picături cardiace-MC și pentru ce se utilizează

Picături cardiace-MC este un remediu combinat pe bază de plante, care conține tinctură de odolean, tinctură de talpa-gâștei, tinctură de păducel.

Datorită extractelor de plante din compoziția sa, produsul acționează asupra sistemului nervos central (manifestă acțiune inhibitoare, facilitează instalarea somnului și ameliorează calitatea acestuia) și asupra sistemului cardiovascular (scade tensiunea arterială, reglează ritmul cardiac).

Picături cardiace-MC este indicat:

Ca remediu auxiliar în tratamentul tulburărilor cardiovasculare funcționale.

Ca remediu auxiliar în tratamentul tulburărilor funcționale ale sistemului nervos central (tulburări de somn, neurastenii).

Picături cardiace-MC este un produs tradițional pe bază de plante, utilizarea căruia în indicațiile specificate este bazată exclusiv pe experiența de utilizare îndelungată.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Picături cardiace-MC

Nu luați Picături cardiace-MC

- dacă aveți hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare din excipienții preparatului, enumerați la pct. 6.
- dacă aveți tensiune arterială scăzută
- dacă aveți bătăi prea lente ale inimii (bradicardie)
- dacă aveți ulcer gastric și/sau duodenal
- dacă suferiți de gastrită erozivă în faza de acutizare
- dacă sunteți gravidă sau alăptați
- copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

Atenționări și precauții

Efectul terapeutic se stabilește la administrarea îndelungată și sistematică a preparatului (timp 2-3 săptămâni și mai mult). Din cauza tulburărilor gastrointestinale posibile, cauzate de tinctura de odolean, în caz de utilizare îndelungată se recomandă pauze de 2-3 săptămâni între cure.

La administrarea îndelungată a preparatului în doze majorate este posibilă diminuarea reacțiilor psihomotorii. La apariția simptomelor de deprimare a sistemului nervos central (adinamie, inhibiție psihică) dozele se micșorează sau administrarea se suspendă temporar (pentru 5-7 zile), apoi preparatul se administrează în doze mai mici.

Pe durata tratamentului se recomandă monitorizarea tensiunii arteriale și a ECG.

Dacă pe parcursul tratamentului simptomele persistă sau are loc agravarea stării dumneavoastră, apar edeme la nivelul membrelor inferioare, se recomandă consultarea medicului.

La apariția durerilor în regiunea inimii cu iradiere în umăr, partea superioară a abdomenului, regiunea gâtului sau în caz de apariție a senzației de sufocare, se recomandă instituirea ajutorului medical de urgență.

Din cauza instalării treptate a efectului, nu se va utiliza medicamentul în caz de necesitate urgentă de înlăturare a simptomelor de excitație psihică și a tulburărilor de somn.

Dacă după 2 săptămâni de tratament starea dumneavoastră nu se ameliorează sau se agravează, se recomandă consultarea unui medic.

Informații importante despre unele componente ale medicamentului

Acest medicament conține etanol cel puțin 65% v/v, adică mai mult de 100 mg pentru o doză. Poate fi dăunător persoanelor cu etilism. Acest lucru trebuie avut în vedere la femeile gravide sau care alăptează, copii și grupuri cu risc crescut, cum sunt pacienți cu boli hepatice sau epilepsie.

Picături cardiace-MC împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. Acest lucru este important, în special dacă luați următoarele medicamente:

- unele medicamente care reglează ritmul inimii (antiaritmice din clasa III, cizapridă)
- medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos central, care provoacă liniștire (sedative), reglează somnul (hipnotice), înlătură senzația de tensiune nervoasă (anxiolitice) și alte medicamente cu acțiune inhibantă asupra sistemului nervos central.
- medicamente care stimulează lucrul inimii (cardiotonice), înlătură spasmele musculaturii netede (spasmolitice),
- medicamente contra durerii (analgice)
- medicamente cu conținut de etanol.

Unele medicamente provoacă reacții de tip disulfiram-like la utilizarea concomitentă cu alcool etilic, care se pot manifesta prin senzație de căldură, înroșirea feței, vărsături, bătăi prea rapide ale inimii:

- disulfiram – utilizat pentru tratamentul dependenței alcoolice
- cefamandol, cefoperazonă, latamoxef, cloramfenicol, metronidazol, grizeofulvină, ornidazol, tinidazol, ketoconazol – utilizate în infecții microbiene, protozoice și fungice
- clorpropamidă, glibenclamidă și alte medicamente care scad nivelul de zahăr în sânge
- procarbazină – utilizat în tratamentul unor tipuri de cancer.

Picături cardiace-MC împreună cu alimente și băuturi

Preparatul se administrează cu 30 min înainte de mese.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Preparatul este contraindicat în timpul sarcinii și în perioada alăptării la sân.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Din cauza efectului farmacologic și a conținutului de etanol, pe durata tratamentului se recomandă evitarea conducerii vehiculelor și folosirea utilajelor.

3. Cum să luați Picături cardiace-MC

Utilizați întotdeauna Picături cardiace-MC exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Dozele se stabilesc individual, în funcție de specificul bolii, efectul terapeutic atins și tolerabilitate. Doza recomandată: în primele 3-4 zile se administrează câte 20-30 picături de 3-4 ori pe zi, apoi doza se reduce la 15-20 picături de 2-3 ori pe zi. Doza pentru o administrare se diluează cu o cantitate mică de apă (1/4 pahar). Din cauza conținutului de etanol, nu se recomandă utilizarea îndelungată.

Mod de administrare

Administrare orală.

Preparatul se administrează cu 30 min înainte de mese.

Dacă luați mai mult Picături cardiace-MC decât trebuie

Dacă utilizați mai multe picături de tinctură, decât vi s-a spus să luați sau dacă altcineva a luat accidental medicamentul dumneavoastră, contactați un medic, un farmacist sau mergeți la spital, deoarece poate fi nevoie de supraveghere medicală.

În caz de supradozaj cronic poate apărea stare de inhibiție, dureri de cap, disconfort gastrointestinal, greață, scăderea capacității de muncă, scăderea tensiunii arteriale (hipotensiune arterială), bătăi prea lente ale inimii (bradicardie).

În caz de supradozaj acut pot apărea simptome de intoxicație alcoolică, dureri abdominale cu caracter spastic, senzație de constricție în piept, senzație de învârtire, tremor al mâinilor, dilatarea pupilelor (mioză).

Dacă uitați să luați Picături cardiace-MC

Dacă uitați să utilizați medicamentul o dată, luați-l imediat ce vă amintiți. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Dacă ați omis mai multe doze, informați medicul dumneavoastră și urmați recomandările primite. Nu modificați doza prescrisă decât dacă medicul vă recomandă acest lucru.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Frecvența reacțiilor adverse este necunoscută (nu poate estimată reieșind din datele disponibile).

- reacții alergice cutanate (erupții pe piele, mâncărime (prurit), roșeață (hiperemie), umflare (edem))
- dureri de cap (cefalee), somnolență
- irascibilitate, stare de tensiune nervoasă (anxietate)
- arsuri la stomac (pirozis), grețuri, eructații, dureri abdominale. În urma administrării îndelungate sunt posibile constipații.
- bătăi prea lente ale inimii (bradicardie), tulburări de ritm cardiac (aritmii)
- scăderea tensiunii arteriale (hipotensiune arterială)
- slăbiciune generală, scăderea capacității de muncă.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse posibile nemenționate în acest prospect. Puteți raporta, de asemenea, reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, disponibil pe site-ul AMDM la următoarea adresă web: www.amdm.gov.md sau prin e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Prin raportarea efectelor adverse veți ajuta la furnizarea mai multor informații cu privire la siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Picături cardiace-MC

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați Picături cardiace-MC după data de expirare înscrisă pe ambalaj după "Exp.:".

După deschiderea flaconului conținutul acestuia poate fi utilizat timp de 100 zile.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, în ambalajul original.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Picături cardiace-MC

Substanțele active sunt tinctura de odolean, tinctura de talpa-gâștei, tinctura de păducel.

25 ml soluție conține:

Tinctură de odolean (extract hidroalcoolic din rădăcini și rizomi de odolean (*Valeriana officinalis* L.) 1:5)* - 8,5 ml

Tinctură de talpa-gâștei (extract hidroalcoolic din părți aeriene de talpa-gâștei (*Leonurus cardiaca* L.) 1:5)* - 8,25 ml

Tinctură de păducel (extract hidroalcoolic din fructe de păducel (*Crataegus monogyna* L.) 1:10)* - 8,25 ml.

*Extragent: alcool etilic 70%.

50 ml soluție conține:

Tinctură de odolean (extract hidroalcoolic din rădăcini și rizomi de odolean (*Valeriana officinalis* L.) 1:5)* - 17 ml

Tinctură de talpa-gâștei (extract hidroalcoolic din părți aeriene de talpa-gâștei (*Leonurus cardiaca* L.) 1:5)* - 16,5 ml

Tinctură de păducel (extract hidroalcoolic din fructe de păducel (*Crataegus monogyna* L.) 1:10)* - 16,5 ml.

*Extragent: alcool etilic 70%.

Excipienți cu efect cunoscut: Conține alcool etilic cel puțin 65%.

Cum arată Picături cardiace-MC și conținutul ambalajului

Lichid transparent, de culoare brună-roșetică, cu miros caracteristic aromat, gust dulciu-amar. La depozitare produsul poate forma sediment, care nu influențează calitatea produsului.

Este disponibil:

Câte 25 ml sau 50 ml în flacon din sticlă sau masă plastică de culoare brună, acoperit cu capac cu dop cu picurător, cu sau fără inel de fixare. Câte 1 flacon împreună cu prospectul în cutie de carton. Se admite ambalarea directă a flacoanelor în cutie colectivă, însoțite de prospect, fără ambalare în ambalaj secundar.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

MC Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova

MD-2037, mun. Chisinau, str. Industrială 59/3

Fabricantul

MC Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova

MD-2037, mun. Chisinau, str. Industrială 59/3

Acest prospect a fost aprobat în decembrie 2024

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>