

Prospect: Informații pentru consumator/pacient

Cereglia 400 mg capsule moi

Alfoscerat de colină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Cereglia și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cereglia
3. Cum să utilizați Cereglia
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Cereglia
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Cereglia și pentru ce se utilizează

Substanța activă a medicamentului Cereglia, alfosceratul de colină, este un medicament care aparține grupului de colinomimetice centrale cu efect predominant asupra sistemului nervos central. Cereglia îmbunătățește transmiterea impulsurilor nervoase în neuronii colinergici; acționează pozitiv asupra plasticității membranelor neuronale și funcția receptorilor. Cereglia ameliorează fluxul sanguin cerebral, intensifică procesele metabolice din creier, activează structurile formațiunii reticulare ale creierului și restabilește conștiența în caz de leziuni traumatice ale creierului.

Cereglia are un efect pozitiv asupra memoriei și abilităților cognitive, precum și asupra indicilor stării emoționale și comportamentului, a căror înrăutățire a fost cauzată de dezvoltarea patologiei cerebrale involutive.

Cereglia se utilizează în caz de:

- sindroamele psihoorganice cerebrale degenerativ-involutive sau consecințele secundare ale insuficienței cerebrovasculare, cum ar fi tulburările cognitive primare sau secundare la vârstnici, caracterizate prin tulburări de memorie, confuzie, dezorientare, motivație și inițiativă scăzută, capacitate redusă de concentrare;
- modificări în sfera emoțională și comportamentală: instabilitate emoțională, irascibilitate, scăderea interesului; pseudomelancolie senilă.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Cereglia Nu utilizați Cereglia:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la alfoscerat de colină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- dacă aveți sindrom psihosomatic;
- dacă aveți agitație psihomotorie severă;
- dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Cereglia, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Cereglia împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau intenționați să luați alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripție medicală.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Cereglia este contraindicată în sarcină și perioada de alăptare.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Medicamentul nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Cereglia conține sorbitol (E 420)

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a utiliza acest medicament.

Cereglia conține propilhidroxibenzoat de sodiu (E 217) și metilhidroxibenzoat de sodiu (E 219). Poate provoca reacții alergice (chiar întârziate).

3. Cum să utilizați Cereglia

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Administrare orală.

Adulți: câte 1 capsulă de 2 sau 3 ori pe zi.

Durata tratamentului este determinată de către medic în mod individual.

Copii: lipsește experiența de administrare a medicamentului la copii.

Dacă luați mai mult Cereglia decât trebuie

Dacă ați luat o doză mai mare decât cea prescrisă, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

În caz de supradozare pot apărea grețuri, neliniște, agitație, insomnie.

Dacă uitați să luați Cereglia

Nu luați niciodată o doză dublă pentru a compensa doza omisă. Luați doza următoare la ora stabilită.

Dacă încetați să luați Cereglia

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca și toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă apar aceste reacții adverse grave, opriți utilizarea medicamentului și adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la secția de urgență a celui mai apropiat spital:

- reacții alergice severe cu umflarea feței, buzelor, gurii sau gâtului, care pot provoca dificultăți la înghițire (angioedem).

Alte reacții adverse, care pot apărea pe durata tratamentului:

Reacții adverse mai puțin frecvente (afectează până la 1 din 100 utilizatori):

- în primele zile sau săptămâni de tratament pot apărea: neliniște, agitație, insomnie. Aceste simptome sunt temporare și nu necesită întreruperea tratamentului, dar este posibilă o reducere temporară a dozei;
- grețuri.

Reacții adverse rare (afectează până la 1 din 1000 utilizatori):

- reacții alergice, inclusiv erupție cutanată, mâncărime, urticarie, înroșirea pielii.

Reacții adverse foarte rare (afectează până la 1 din 10 000 utilizatori):

- confuzie de scurtă durată;
- dureri abdominale.

În acest caz e necesar de redus doza medicamentului.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Cereglia

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Cereglia

- *Substanța activă* este alfosceratul de colină.

Fiecare capsulă moale conține alfoscerat de colină – 400 mg.

- *Celelalte componente sunt:* glicerol, apă purificată;

compoziția capsulei: gelatină, sorbitol lichid, parțial deshidratat (E 420), glicerol, metilhidroxibenzoat de sodiu (E 219), propilhidroxibenzoat de sodiu (E 217), dioxid de titan (E 171), oxid galben de fier (E 172).

Cum arată Cereglia și conținutul ambalajului

Cereglia se prezintă sub formă de capsule gelatinoase moi, ovale, cu sutură, opace, de culoare cafeniu-gălbui, care conțin un lichid vâscos transparent, incolor sau ușor gălbui.

Cereglia este disponibil în cutii cu 1 sau 3 blistere din PVC/Al a câte 10 capsule moi.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

«UZINA DE VITAMINE DIN KIEV» SA, Ucraina.
04073, or. Kiev, str. Kopîlovskaya, 38.

Fabricantul

«UZINA DE VITAMINE DIN KIEV» SA, Ucraina.
04073, or. Kiev, str. Kopîlovskaya, 38.

Acest prospect a fost aprobat în ianuarie 2022.

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md/>