

**PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR****ENTEROL 250 mg pulbere orală**  
*Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 liofilizat

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 2 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este *Enterol 250 mg* și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați *Enterol 250 mg*
3. Cum să luați *Enterol 250 mg*
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează *Enterol 250 mg*
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este *Enterol 250 mg* și pentru ce se utilizează**

*Enterol 250 mg* este indicat:

- pentru tratamentul diareei infecțioase acute la adulți și copii;
- pentru prevenirea și tratamentul colitei și diareei determinate de consumul de antibiotice;
- în asociere cu vancomicină/metronidazol, pentru prevenirea recurenței bolilor produse de *Clostridium difficile*;
- pentru prevenirea diareei determinate de nutriția enterală;
- pentru tratamentul sindromului colonului iritabil.

Dacă după 2 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**2. Ce trebuie să știți înainte să luați *Enterol 250 mg***

**Nu luați *Enterol 250 mg*:**

- dacă sunteți alergic la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct.6);
- dacă aveți cateter venos central;
- dacă aveți intoleranță la fructoză, sindrom de malabsorbție al glucozei și galactozei, deficit de sucrază, izomaltază (datorită conținutului în fructoză);
- pacienți imunocompromiși sau spitalizați (din cauza bolilor grave sau a sistemului imunitar modificat sau slăbit).

**Atenționării și precauții**

Înainte să luați *Enterol 250 mg*, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Tratamentul cu *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 nu înlocuiește rehidratarea, când aceasta este necesară. Doza de rehidratare și calea de administrare (orală/ intravenoasă) trebuie adaptate la severitatea diareei, la vârsta și starea de sănătate a pacientului.

*Enterol* 250 mg conține celule vii existând risc de infecții fungice sistemice.

Pacientul trebuie să țină cont de necesitatea consumului abundent de lichide sărate sau îndulcite (zahărul trebuie fiert), pentru a compensa pierderile datorate diareei (la adult, aportul lichidian mediu este de 2 l pe zi). De asemenea, în timpul diareei regimul alimentar trebuie să excludă anumite alimente, în special, crudități, fructe și legume, alimente picante, precum și băuturi reci și să conțină mai ales friptură la grătar și orez.

Dacă, după 2 zile de tratament, diareea persistă, conduita terapeutică trebuie reevaluată și trebuie avută în vedere rehidratarea pe cale intravenoasă.

#### **Enterol 250 mg împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Datorită naturii sale fungice, *Enterol* 250 mg nu trebuie administrat simultan cu medicamente antifungice orale sau sistemice.

#### **Enterol 250 mg împreună cu alimente, băuturi și alcool**

*Enterol* 250 mg conține celule vii. Acest medicament nu trebuie deci combinat cu băuturi sau alimente foarte fierbinți (peste 50°C) sau foarte reci sau cu alcool etilic.

#### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

În studiile efectuate la animale nu s-a evidențiat potențial teratogen. Până în prezent, în clinică nu au fost raportate efecte fetotoxice sau malformative. Datorită datelor insuficiente se recomandă evitarea utilizării acestui medicament în timpul sarcinii și alăptării.

#### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

*Enterol* 250 mg nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

#### **Enterol 250 mg conține lactoză și fructoză.**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

### **3. Cum să luați *Enterol* 250 mg**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este de 1-2 plicuri *Enterol* 250 mg, de 1-2 ori pe zi.

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Se varsă conținutul plicului în puțină apă sau băuturi îndulcite (zahărul trebuie fiert), se amestecă și se bea. De asemenea, pulberea orală se poate combina cu alimente sau se poate turna în biberon.

#### **Dacă luați mai mult *Enterol* 250 mg decât trebuie**

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

#### **Dacă uitați să luați *Enterol* 250 mg**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

#### **Dacă încetați să luați *Enterol* 250 mg**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

*Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 este un organism viu asociat cu risc de infecție fungică sistemică: cazuri rare de fungemie au fost raportate la pacienții cu stare gravă, spitalizați, cel mai adesea pentru boli gastro-intestinale, cu cateter venos central.

Reacții adverse foarte rare:

- Pătrunderea drojdiei în sânge (fungemie).

Reacții adverse cu frecvență necunoscută:

- Constipație

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucuresti 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează *Enterol 250 mg***

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și flacon. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține *Enterol 250 mg***

- Substanța activă este *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 liofilizat.
- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, fructoză, dioxid de siliciu coloidal anhidru, aromă artificială "tutti frutti".

##### **Cum arată *Enterol 250 mg* și conținutul ambalajului**

Cutie cu 10 plicuri cu pulbere orală.

Pulbere de culoare bej cu miros caracteristic.

##### **Deținătorul Autorizației de punere pe piață și fabricantul**

##### **Deținătorul Autorizației de punere pe piață**

BIOCODEX

22 Rue des Aqueducs, 94250 Gentilly, Franța

**Fabricant**

BIOCODEX

1, avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, Franța

**Data ultimei revizuii a prospectului**

August 2024

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>