

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR/PACIENT

Allergosan 10 mg/g unguent Chloropyraminum

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5-7 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Allergosan unguent și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Allergosan unguent
3. Cum să utilizați Allergosan unguent
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Allergosan unguent
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Allergosan unguent și pentru ce se utilizează

Allergosan unguent conține substanța activă numită clorhidrat de cloropiramină, care aparține grupului de medicamente denumit antihistaminice. Clorhidratul de cloropiramină posedă acțiune antialergică bine pronunțată. La aplicarea pe piele, calmează mâncărimea, înlătură roșeața, edemul și erupțiile cutanate.

Allergosan unguent este utilizat în caz de înțepături de insecte, dermatită de contact și alte dermatoze pruriginoase (inflamația pielii), erupții cutanate și mâncărime în diverse stări alergice, care nu afectează suprafețe mari de piele.

Dacă după 5-7 zile starea dumneavoastră nu se ameliorează sau se agravează, trebuie să vă adresați unui medic.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Allergosan unguent

Nu utilizați Allergosan unguent:

- dacă sunteți alergic la substanța activă sau la oricare dintre excipienții din compoziția acestui medicament (enumerati la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Allergosan unguent, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Dacă aveți reacții cutanate acute cu formare de exudat (secreții, lichid inflamator), mai preferabilă este utilizarea unei alte forme farmaceutice a medicamentului - cremă pentru uz extern.
- Nu se recomandă aplicarea medicamentului pe plăgi deschise sau arsuri.
- În timpul utilizării trebuie evitată pătrunderea medicamentului în ochi, pe membrana mucoasă a nasului sau în cavitatea orală.

Allergosan unguent împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Nu există date privind interacțiunile cu alte medicamente.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți însărcinată sau alăptați, sau intenționați să rămâneți însărcinată, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza acest medicament.

Medicul va evalua dacă este posibil să utilizați Allergosan unguent.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Allergosan unguent nu afectează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Allergosan conține excipienții lanolină și alcool cetilic, care pot provoca reacții adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact).

3. Cum să utilizați Allergosan unguent

Utilizați întotdeauna acest medicament, urmând indicațiile din această prospect sau indicațiile medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Mod de administrare

Administrare cutanată.

Allergosan unguent este destinat numai pentru administrare locală pe piele. Se recomandă utilizarea acestuia în dermatoze cronice cu hipercheratoză (întărirea, îngroșarea stratului superficial al pielii).

Poate fi aplicat sub un pansament ocluziv sau în timpul procedurilor fizioterapeutice cu scopul de a îmbunătăți penetrarea în piele și obținerea unui efect terapeutic rapid.

Doze recomandate

Adulți și copii (sugari și copii cu vârsta până la 18 ani): o cantitate mică de unguent se aplică pe suprafața afectată de 2-3 ori pe zi, masând ușor pielea.

Durata tratamentului: 5-7 zile.

Dacă ați utilizat Allergosan unguent mai mult decât trebuie

Cazurile de supradozaj sunt puțin probabile.

Dacă ați uitat să utilizați Allergosan unguent

Nu utilizați o cantitate mai mare de medicament pentru a compensa doza omisă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate celelalte medicamente, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Foarte rar, Allergosan unguent poate provoca mâncărime sau iritație a pielii.

În cazuri particulare, la utilizarea de Allergosan unguent pot apărea reacții de hipersensibilitate (de exemplu, dermatită de contact), care pot fi cauzate de excipienții din compoziția medicamentului - lanolină și alcool cetilic.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md sau e-mail: farmacovigilenta@amdm.gov.md. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Allergosan unguent

A se păstra în ambalajul original.
A se păstra la temperaturi sub 25°C.
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Termenul de valabilitate după prima deschidere a tubului: 1 lună.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Allergosan unguent

Substanța activă este: clorhidratul de cloropiramină.
1 g unguent conține clorhidrat de cloropiramină 10 mg.
Celelalte componente: alcool cetilic, lanolină, parafină albă moale.

Cum arată Allergosan unguent și conținutul ambalajului

Masă uleioasă, de culoare galben-pal, fără aromă.

Câte 18 g unguent în tub din aluminiu cu membrană, cu capac din polipropilenă. Câte 1 tub și prospectul pentru consumator/pacient în cutie de carton.

Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul

Deținătorul certificatului de înregistrare

SOPHARMA AD
16 Iliensko Shosse Str., Sofia, 1220, Bulgaria

Fabricantul

SOPHARMA AD
16 Iliensko Shosse Str., Sofia, 1220, Bulgaria

Acest prospect a fost revizuit în Mai 2023

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amdm.gov.md>